

Chapter 6 Lab

coop711

2015-11-21

6.4

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}, a_1 \vec{u} + a_2 \vec{v} + a_3 \vec{w} = \vec{b} \text{ 를 만족하는 } a_1, a_2, a_3 ?$$

(a) $\vec{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 9 \\ 5 \end{bmatrix}$

```
source("./adjoint.R")
(u <- c(2, 1, 4))
```

```
## [1] 2 1 4
```

```
(v <- c(1, -1, 3))
```

```
## [1] 1 -1 3
```

```
(w <- c(3, 2, 5))
```

```
## [1] 3 2 5
```

```
(X <- cbind(u, v, w))
```

```
##      u  v w
## [1,] 2  1 3
## [2,] 1 -1 2
## [3,] 4  3 5
```

```
det(X)
```

```
## [1] 2
```

```
adjoint(X)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,] -11   4   5
## [2,]   3  -2  -1
## [3,]   7  -2  -3
```

```
adjoint(X)/det(X)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,] -5.5   2  2.5
## [2,]  1.5  -1 -0.5
## [3,]  3.5  -1 -1.5
```

```
solve(X)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## u -5.5   2  2.5
## v  1.5  -1 -0.5
## w  3.5  -1 -1.5
```

```
(b1 <- c(5, 9, 5))
```

```
## [1] 5 9 5
```

```
(adjoint(X)/det(X)) %*% b1
```

```
##      [,1]
## [1,]   3
## [2,]  -4
## [3,]   1
```

```
solve(X, b1)
```

```
##   u   v   w
##  3  -4   1
```

```
solve(X, b1)[1]*u + solve(X, b1)[2]*v + solve(X, b1)[3]*w
```

```
## [1] 5 9 5
```

$$(b) \vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

```
(b2 <- c(2, 0, 6))
```

```
## [1] 2 0 6
```

```
(adjoint(X)/det(X)) %*% b2
```

```
##           [,1]  
## [1,] 4.000000e+00  
## [2,] -8.881784e-16  
## [3,] -2.000000e+00
```

```
round((adjoint(X)/det(X)) %*% b2, digits = 2)
```

```
##           [,1]  
## [1,] 4  
## [2,] 0  
## [3,] -2
```

```
solve(X, b2)
```

```
## u v w  
## 4 0 -2
```

```
solve(X, b2)[1]*u + solve(X, b2)[2]*v + solve(X, b2)[3]*w
```

```
## [1] 2 0 6
```

(c) $\vec{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

```
(b3 <- c(0, 0, 0))
```

```
## [1] 0 0 0
```

```
(adjoint(X)/det(X)) %*% b3
```

```
##           [,1]  
## [1,] 0  
## [2,] 0  
## [3,] 0
```

```
solve(X, b3)
```

```
## u v w  
## 0 0 0
```

```
solve(X, b3)[1]*u + solve(X, b3)[2]*v + solve(X, b3)[3]*w
```

```
## [1] 0 0 0
```

6.6 R^3 를 생성할 수 있는 집합은?

(a)

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

선형독립인 벡터 집합을 찾아내는 문제. 세개의 벡터인 경우는 선형독립 여부만 판단하면 됨. 정방행렬들이므로 행렬식의 존재여부로 판단.

```
(u2 <- c(1, 1, 1))
```

```
## [1] 1 1 1
```

```
(v2 <- c(2, 2, 0))
```

```
## [1] 2 2 0
```

```
(w2 <- c(3, 0, 0))
```

```
## [1] 3 0 0
```

```
(X2 <- cbind(u2, v2, w2))
```

```
##      u2 v2 w2  
## [1,]  1  2  3  
## [2,]  1  2  0  
## [3,]  1  0  0
```

```
det(X2)
```

```
## [1] -6
```

```
(u3 <- c(2, -1, 3))
```

```
## [1] 2 -1 3
```

```
(v3 <- c(4, 1, 2))
```

```
## [1] 4 1 2
```

```
(w3 <- c(8, -1, 8))
```

```
## [1] 8 -1 8
```

```
(X3 <- cbind(u3, v3, w3))
```

```
##      u3 v3 w3  
## [1,]  2  4  8  
## [2,] -1  1 -1  
## [3,]  3  2  8
```

```
det(X3)
```

```
## [1] 0
```

```
2*u3 + v3
```

```
## [1] 8 -1 8
```

4 개의 벡터 중 1, 2개로는 R^3 를 생성할 수 없으므로 3개일 때 집중. 3개씩은 모두 선형독립이므로 R^3 생성 가능.
`solve(X,)` 의 결과는 나머지 한 벡터가 다른 세 개의 벡터의 선형결합으로 나타날 때 계수를 찾아준 것임.

```
(u4 <- c(1, 3, 3))
```

```
## [1] 1 3 3
```

```
(v4 <- c(1, 3, 4))
```

```
## [1] 1 3 4
```

```
(w4 <- c(1, 4, 3))
```

```
## [1] 1 4 3
```

```
(t4 <- c(6, 2, 1))
```

```
## [1] 6 2 1
```

```
(X4 <- cbind(u4, v4, w4))
```

```
##      u4 v4 w4
## [1,]  1  1  1
## [2,]  3  3  4
## [3,]  3  4  3
```

```
det(X4)
```

```
## [1] -1
```

```
adjoint(X4)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]   -7    1    1
## [2,]    3    0   -1
## [3,]    3   -1    0
```

```
adjoint(X4)/det(X4)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    7   -1   -1
## [2,]   -3    0    1
## [3,]   -3    1    0
```

```
solve(X4)
```

```
##      [,1]      [,2] [,3]
## u4      7 -1.000000e+00 -1
## v4     -3  2.220446e-16  1
## w4     -3  1.000000e+00  0
```

```
round(solve(X4), digits = 2)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## u4      7   -1   -1
## v4     -3    0    1
## w4     -3    1    0
```

```
(adjoint(X4)/det(X4)) %*% t4
```

```
##      [,1]  
## [1,]   39  
## [2,]  -17  
## [3,]  -16
```

```
solve(X4, t4)
```

```
##  u4  v4  w4  
##  39 -17 -16
```

```
adjoint(X4) %*% t4
```

```
##      [,1]  
## [1,]  -39  
## [2,]   17  
## [3,]   16
```

```
solve(X4, t4)[1]*u4 + solve(X4, t4)[2]*v4 + solve(X4, t4)[3]*w4
```

```
## [1] 6 2 1
```

```
(X5 <- cbind(u4, v4, t4))
```

```
##      u4 v4 t4  
## [1,]  1  1  6  
## [2,]  3  3  2  
## [3,]  3  4  1
```

```
det(X5)
```

```
## [1] 16
```

```
adjoint(X5)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]  
## [1,]   -5   23  -16  
## [2,]    3  -17   16  
## [3,]    3   -1    0
```

```
adjoint(X5)/det(X5)
```

```
##          [,1]      [,2] [,3]
## [1,] -0.3125  1.4375  -1
## [2,]  0.1875 -1.0625   1
## [3,]  0.1875 -0.0625   0
```

```
solve(X5)
```

```
##          [,1]      [,2] [,3]
## u4 -0.3125  1.4375  -1
## v4  0.1875 -1.0625   1
## t4  0.1875 -0.0625   0
```

```
(adjoint(X5)/det(X5)) %*% w4
```

```
##          [,1]
## [1,]  2.4375
## [2,] -1.0625
## [3,] -0.0625
```

```
solve(X5, w4)
```

```
##          u4          v4          t4
##  2.4375 -1.0625 -0.0625
```

```
adjoint(X5) %*% w4
```

```
##          [,1]
## [1,]    39
## [2,]   -17
## [3,]    -1
```

```
solve(X5, w4)[1]*u4 + solve(X5, w4)[2]*v4 + solve(X5, w4)[3]*t4
```

```
## [1] 1 4 3
```

```
(X6 <- cbind(u4, w4, t4))
```

```
##          u4 w4 t4
## [1,]    1  1  6
## [2,]    3  4  2
## [3,]    3  3  1
```

```
det(X6)
```



```
## [1] -17
```

```
adjoint(X6)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]  -2   17 -22
## [2,]   3  -17  16
## [3,]  -3   0   1
```

```
adjoint(X6)/det(X6)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,] 0.1176471 -1  1.29411765
## [2,] -0.1764706  1 -0.94117647
## [3,] 0.1764706  0 -0.05882353
```

```
solve(X6)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## u4 0.1176471 -1.000000e+00  1.29411765
## w4 -0.1764706  1.000000e+00 -0.94117647
## t4  0.1764706 -9.796086e-18 -0.05882353
```

```
(adjoint(X6)/det(X6)) %*% v4
```

```
##      [,1]
## [1,] 2.29411765
## [2,] -0.94117647
## [3,] -0.05882353
```

```
solve(X6, v4)
```

```
##      u4      w4      t4
## 2.29411765 -0.94117647 -0.05882353
```

```
adjoint(X6) %*% v4
```

```
##      [,1]
## [1,] -39
## [2,] 16
## [3,] 1
```

```
solve(X6, v4)[1]*u4 + solve(X6, v4)[2]*w4 + solve(X6, v4)[3]*t4
```

```
## [1] 1 3 4
```

```
(X7 <- cbind(v4, w4, t4))
```

```
##      v4 w4 t4
## [1,]  1  1  6
## [2,]  3  4  2
## [3,]  4  3  1
```

```
det(X7)
```

```
## [1] -39
```

```
adjoint(X7)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]   -2   17  -22
## [2,]    5  -23   16
## [3,]   -7    1    1
```

```
adjoint(X7)/det(X7)
```

```
##      [,1]      [,2]      [,3]
## [1,] 0.05128205 -0.43589744 0.56410256
## [2,] -0.12820513 0.58974359 -0.41025641
## [3,] 0.17948718 -0.02564103 -0.02564103
```

```
solve(X7)
```

```
##      [,1]      [,2]      [,3]
## v4 0.05128205 -0.43589744 0.56410256
## w4 -0.12820513 0.58974359 -0.41025641
## t4 0.17948718 -0.02564103 -0.02564103
```

```
(adjoint(X7)/det(X7)) %*% u4
```

```
##      [,1]
## [1,] 0.43589744
## [2,] 0.41025641
## [3,] 0.02564103
```

```
solve(X7, u4)
```

```
##          v4          w4          t4
## 0.43589744 0.41025641 0.02564103
```

```
adjoint(X7) %*% u4
```

```
##      [,1]
## [1,]  -17
## [2,]  -16
## [3,]   -1
```

```
solve(X7, u4)[1]*v4 + solve(X7, u4)[2]*w4 + solve(X7, u4)[3]*t4
```

```
## [1] 1 3 3
```

6.7

$$\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{bmatrix} -13 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{x}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(a) $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$ 는 선형종속

```
(u8 <- c(1, 2, 1))
```

```
## [1] 1 2 1
```

```
(v8 <- c(-1, 3, 2))
```

```
## [1] -1 3 2
```

```
(w8 <- c(-13, -1, 2))
```

```
## [1] -13 -1 2
```

```
(t8 <- c(1, 1, 0))
```

```
## [1] 1 1 0
```

```
x8 <- cbind(u8, v8, w8)
det(X8)
```

```
## [1] 0
```

$a_1 \vec{x}_1 + a_2 \vec{x}_2 = \vec{x}_3$ 를 풀어주면 $a_1 = -8, a_2 = 5$ 임을 쉽게 파악.

(b) $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_4$ 는 선형독립

```
(X9 <- cbind(u8, v8, t8))
```

```
##      u8 v8 t8
## [1,]  1 -1  1
## [2,]  2  3  1
## [3,]  1  2  0
```

```
det(X9)
```

```
## [1] -2
```

```
adjoint(X9)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]  -2    2   -4
## [2,]   1   -1    1
## [3,]   1   -3    5
```

```
adjoint(X9)/det(X9)
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]  1.0 -1.0  2.0
## [2,] -0.5  0.5 -0.5
## [3,] -0.5  1.5 -2.5
```

$$a_1 \vec{x}_1 + a_2 \vec{x}_2 + a_3 \vec{x}_4 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ 를 정리하면}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{ 를 풀어주면,}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = (-1/2) \begin{bmatrix} -2 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a - b + 2c \\ -a/2 + b/2 - c/2 \\ -a/2 + 3b/2 - 5c/2 \end{bmatrix}$$

6.10

(a)

```
(X10 <- cbind(c(2, -1, 4), c(3, 6, 2), c(2, 10, -4)))
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    2    3    2
## [2,]   -1    6   10
## [3,]    4    2   -4
```

```
det(X10)
```

```
## [1] -32
```

(b)

```
(X11 <- cbind(c(3, 1, 1), c(2, -1, 5), c(4, 0, -3)))
```

```
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    3    2    4
## [2,]    1   -1    0
## [3,]    1    5   -3
```

```
det(X11)
```

```
## [1] 39
```

(c) $a_1 \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \vec{0}$ 을 만족시키는 $a_1 = a_2 = 0$ 임을 보이면 나머지 한 식은 당연히 만족된다. 미지수는 두개이고, 식은 세 개이므로 두 개를 풀어서 $a_1 = a_2 = 0$ 임을 보인다. 어느 두 식을 풀기 위하여 2×2 행렬을 만들어도 행렬식이 존재하므로 역행렬을 만들어 $\vec{0}$ 벡터와 곱해주면 $a_1 = a_2 = 0$ 이기 때문에 두 벡터는 선형독립이다.

```
(u10 <- c(6, 0, -1))
```

```
## [1] 6 0 -1
```

```
(v10 <- c(1, 1, 4))
```

```
## [1] 1 1 4
```

```
(X12 <- cbind(u10, v10))
```

```
##      u10 v10
## [1,]    6    1
## [2,]    0    1
## [3,]   -1    4
```

위의 R 코드는 $\vec{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $X = [\vec{u} \ \vec{v}]$ 라고 설정하는 과정이다. 여기서 $\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ 했을 때,

$$a_1 \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = X\vec{a} \text{이므로, } X\vec{a} = \vec{0} \text{의 해가 } \vec{a} = \vec{0} \text{임을 보이면 된다. 이를 위하여 } X \text{의 어느 } 2 \times 2 \text{ 서브}$$

매트릭스, $X_{2 \times 2}$ 라 하자, 를 택하더라도 역행렬이 존재하여 $\vec{a} = X_{2 \times 2}^{-1} \vec{0} = \vec{0}$ 이고, 이 $\vec{a} = 0$ 은 나머지 한 식도 만족시키기 때문에 결국 $\vec{a} = 0$ 이고, \vec{u} 와 \vec{v} 는 선형독립이다.

```
det(X12[1:2, ])
```

```
## [1] 6
```

```
adjoint(X12[1:2, ])
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    1  -1
## [2,]    0   6
```

```
solve(X12[1:2, ])
```

```
##      [,1]      [,2]
## u10 0.1666667 -0.1666667
## v10 0.0000000  1.0000000
```

```
det(X12[c(1, 3), ])
```

```
## [1] 25
```

```
adjoint(X12[c(1, 3), ])
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    4  -1
## [2,]    1   6
```

```
solve(X12[c(1, 3), ])
```

```
##      [,1] [,2]
## u10 0.16 -0.04
## v10 0.04  0.24
```

```
det(X12[2:3, ])
```

```
## [1] 1
```

```
adjoint(X12[2:3, ])
```

```
##      [,1] [,2]  
## [1,]    4  -1  
## [2,]    1   0
```

```
solve(X12[2:3, ])
```

```
##      [,1] [,2]  
## u10     4  -1  
## v10     1   0
```

(d) (c)와는 달리 이번에는 차원에 비하여 벡터가 하나 더 많으므로 반드시 하나 이상의 벡터가 다른 벡터들의 선형결합으로 나타나게 되어 있다. 따라서, 네 개의 벡터 중 세 개로 행렬을 구성하고, 그 벡터들의 선형결합으로 나머지 벡터가 표현되는지 파악하면 된다.

$\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \vec{w} = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{t} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, X = [\vec{u} \ \vec{v} \ \vec{w} \ \vec{t}]$ 라 하고, $\vec{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ 라 하여
 $a_1 \vec{u} + a_2 \vec{v} + a_3 \vec{w} = \vec{t}$, 즉 $X_{[,1:3]} \vec{a} = \vec{t}$ 등을 풀어보면 된다. (단, $X_{[,1:3]}$ 는 X 의 1, 2, 3번째 열로 구성된 행렬)

```
(u11 <- c(1, 3, 3))
```

```
## [1] 1 3 3
```

```
(v11 <- c(0, 1, 4))
```

```
## [1] 0 1 4
```

```
(w11 <- c(5, 6, 3))
```

```
## [1] 5 6 3
```

```
(t11 <- c(7, 2, -1))
```

```
## [1] 7 2 -1
```

```
(X13 <- cbind(u11, v11, w11, t11))
```

```
##          u11 v11 w11 t11
## [1,]      1   0   5   7
## [2,]      3   1   6   2
## [3,]      3   4   3  -1
```

위의 코드는 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{t}$ 와 행렬 $X = \begin{bmatrix} \vec{u} & \vec{v} & \vec{w} & \vec{t} \end{bmatrix}$ 를 설정하는 과정.

```
det(X13[, 1:3])
```

```
## [1] 24
```

$X_{[,1:3]}$ 의 행렬식이 0이 아니므로, 역행렬이 존재하고 $X_{[,1:3]} \vec{a} = \vec{t}$ 의 해가 존재한다. 다음은, 이 해를 구하는 과정.

```
solve(X13[, 1:3], t11)
```

```
##      u11      v11      w11
## -4.25    1.25    2.25
```

소숫점의 정체를 파악하기 위하여 행렬식을 곱해보면,

```
solve(X13[, 1:3], t11)*det(X13[, 1:3])
```

```
##      u11      v11      w11
## -102     30      54
```

위에서 구한 \vec{a} 의 원소들이 $a_1 \vec{u} + a_2 \vec{v} + a_3 \vec{w} = \vec{t}$ 를 만족하는지 살펴보자.

```
solve(X13[, 1:3], t11)[1]*u11 + solve(X13[, 1:3], t11)[2]*v11 + solve(X13[, 1:3], t11)[3]*w11
```

```
## [1] 7 2 -1
```

위의 계산 결과로부터 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 는 선형독립이고, $\vec{t} = \frac{-102}{24} \vec{u} + \frac{30}{24} \vec{v} + \frac{54}{24} \vec{w} = -\frac{17}{4} \vec{u} + \frac{5}{4} \vec{v} + \frac{9}{4} \vec{w}$ 의 선형결합으로 나타난다는 것을 알 수 있다.

```
det(X13[, c(1, 2, 4)])
```

```
## [1] 54
```

```
solve(X13[, c(1, 2, 4)], w11)
```

```
##          u11          v11          t11
## 1.88888889 -0.55555556 0.44444444
```



```
solve(X13[, c(1, 2, 4)], w11)*det(X13[, c(1, 2, 4)])
```

```
## u11 v11 t11  
## 102 -30 24
```

```
solve(X13[, c(1, 2, 4)], w11)[1]*u11 + solve(X13[, c(1, 2, 4)], w11)[2]*v11 + s  
olve(X13[, c(1, 2, 4)], w11)[3]*t11
```

```
## [1] 5 6 3
```

$$\vec{w} = \frac{102}{54}\vec{u} + \frac{-30}{54}\vec{v} + \frac{24}{54}\vec{t} = \frac{17}{9}\vec{u} - \frac{5}{9}\vec{v} + \frac{4}{9}\vec{t}$$

```
det(X13[, c(1, 3, 4)])
```

```
## [1] -30
```

```
solve(X13[, c(1, 3, 4)], v11)
```

```
## u11 w11 t11  
## 3.4 -1.8 0.8
```

```
solve(X13[, c(1, 3, 4)], v11)*det(X13[, c(1, 3, 4)])
```

```
## u11 w11 t11  
## -102 54 -24
```

```
solve(X13[, c(1, 3, 4)], v11)[1]*u11 + solve(X13[, c(1, 3, 4)], v11)[2]*w11 + s  
olve(X13[, c(1, 3, 4)], v11)[3]*t11
```

```
## [1] 8.881784e-16 1.000000e+00 4.000000e+00
```

```
round(solve(X13[, c(1, 3, 4)], v11)[1]*u11 + solve(X13[, c(1, 3, 4)], v11)[2]*w  
11 + solve(X13[, c(1, 3, 4)], v11)[3]*t11, digits = 2)
```

```
## [1] 0 1 4
```

$$\vec{v} = \frac{-102}{-30}\vec{u} + \frac{54}{-30}\vec{w} + \frac{-24}{-30}\vec{t} = \frac{17}{5}\vec{u} - \frac{9}{5}\vec{w} + \frac{4}{5}\vec{t}$$

```
det(X13[, 2:4])
```

```
## [1] -102
```

```
solve(X13[, 2:4], u11)
```

```
##          v11          w11          t11
## 0.2941176 0.5294118 -0.2352941
```

```
solve(X13[, 2:4], u11)*det(X13[, 2:4])
```

```
## v11 w11 t11
## -30 -54 24
```

```
solve(X13[, 2:4], u11)[1]*v11 + solve(X13[, 2:4], u11)[2]*w11 + solve(X13[,
2:4], u11)[3]*t11
```

```
## [1] 1 3 3
```

$$\vec{u} = \frac{-30}{-102}\vec{v} + \frac{-54}{-102}\vec{w} - \frac{24}{-102}\vec{t} = \frac{10}{51}\vec{v} + \frac{9}{17}\vec{w} - \frac{4}{17}\vec{t}$$

6.14

$$\vec{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{x}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{x}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

(a) $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$ 는 선형종속

```
(u14 <- c(1, 2, 1))
```

```
## [1] 1 2 1
```

```
(v14 <- c(-1, 3, 2))
```

```
## [1] -1 3 2
```

```
(w14 <- c(3, 1, 0))
```

```
## [1] 3 1 0
```

```
(t14 <- c(3, 1, 1))
```

```
## [1] 3 1 1
```

```
X14 <- cbind(u14, v14, w14)
det(X14)
```

```
## [1] 0
```

$a_1 \vec{x}_1 + a_2 \vec{x}_2 = \vec{x}_3$ 를 풀어주면 $a_1 = 2, a_2 = -1$ 임을 쉽게 파악.

(b) $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_4$ 는 선형독립

```
(x15 <- cbind(u14, v14, t14))
```

```
##          u14 v14 t14
## [1,]      1  -1   3
## [2,]      2   3   1
## [3,]      1   2   1
```

```
det(x15)
```

```
## [1] 5
```

```
adjoint(x15)
```

```
##          [,1] [,2] [,3]
## [1,]      1   7 -10
## [2,]     -1  -2   5
## [3,]      1  -3   5
```

```
adjoint(x15)/det(x15)
```

```
##          [,1] [,2] [,3]
## [1,]  0.2  1.4  -2
## [2,] -0.2 -0.4   1
## [3,]  0.2 -0.6   1
```

$$a_1 \vec{x}_1 + a_2 \vec{x}_2 + a_3 \vec{x}_4 = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{를 정리하면}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \text{를 풀어주면,}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = (1/5) \begin{bmatrix} 1 & 7 & -10 \\ -1 & -2 & 5 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a/5 + 7b/5 - 2c \\ -a/5 - 2b/5 + c \\ a/5 - 3b/5 + c \end{bmatrix}$$

자료 저장

```
save.image("chapter_6_lab.rda")
```