

<b>ANTIBIÓTICOS</b>	
AMOXICILINA 250mg/5ml	Peso ÷ 3 = dose em ml 8/8hs 7 a 14 dias (máx.:10ml/dose)
AMOXICILINA + CLAVULANATO 250 + 62,5mg/5ml	Peso ÷ 3 = dose em ml 8/8hs 7 a 14 dias (máx.: 10ml/dose)
AZITROMICINA 200mg/5ml pó susp(Azi <sup>®</sup> , Astro <sup>®</sup> )	Peso ÷ 4 = dose em ml 1x/dia 3-5 dias (20-30mg/kg/dia)
CEFALEXINA 250mg/5ml (Keflex <sup>®</sup> )	Peso ÷ 4 = dose em ml 6/6hs 7-14 dias (50-100mg/kg/dia - máx.:10ml/dose)
CEFTRIAXONE 250mg, 500mg e 1g (Rocefin <sup>®</sup> )	50mg/Kg/dose 1x/dia IM 3 a 7dias (máx.:1g/dose)
SULFAMETOXAZOL-TRIMETOPRIM 200+80MG/5ML	Peso /4 = dose em ml 12/12hrs 7-14 dias (3-5mg/kg)
METRONIDAZOL Suspensão Oral 4% (Flagyl <sup>®</sup> )	0,5ml/Kg/dia ÷ 2 ou 3x/dia. (máx.:10ml/dose)
SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPRIM sups(Bactrin)	Peso ÷ 2 = dose em ml 12/12 hs 10 a 14 dias (máx.:10ml/dose)
PENICILINA BENZATINA 600.000UI e 1.200.000UI	11 - 25Kg: 600.000UI / > 25Kg: 1.200.000UI IM Dose Única
<b>ANALGÉSICOS/ANTITÉRMICOS</b>	
DIPIRONA Gotas 500mg/ml (Novalgina <sup>®</sup> )	5-8kg:2-5 gotas/9-15kg: 3-10 gotas/ 16-23kg:5-15gotas/ 24-30kg: 8-20gotas/ 32-45kg: 10-30gotas/ 46-53kg: 15-35 gotas de 6/6 hs se febre/dor (>3m)
DIPIRONA susp 50mg/ml (Novalgina <sup>®</sup> Infantil)	5-8kg:1,25-2,5ml/9-15kg: 2,5-5ml/ 16-23kg:3,75-7,5ml/ 24-30kg: 5-10ml/ 32-45kg: 7,5-10ml/ 46-53kg: 8,75-17,5ml de 6/6 hs se febre/dor (>3m)
DIPIRONA Injetável (1000mg/2ml)	Peso ÷ 25 = dose em ml IM/EV (máx.:2ml) diluir p 10ml AD lento 5-8kg:0,1-0,25ml/9-15kg: 0,25-0,5ml/ 16-23kg:0,4-0,8ml/ 24-30kg: 0,5-1ml/ 32-45kg: 0,75-1,5ml/ 46-53kg: 0,9-1,8ml de 6/6hs se febre/dor (>3m)
IBUPROFENO Gotas 100mg/ml (Alivium <sup>®</sup> )	1gota/Kg/dose de 6-8hs se febre/dor (máx.:200mg/40gts/dose) (>6m)
IBUPROFENO Gotas 50mg/ml (Alivium <sup>®</sup> Infantil)	2gotas/Kg/dose até de 6/6hs se (>6meses) Max:200mg
IBUPROFENO susp 30mg/ml (Alivium <sup>®</sup> Infantil)	5-8kg=2ml/9-12kg=3ml/13-16kg=4ml de 6/6h (> 6meses)
PARACETAMOL Gotas 200mg/ml (Tylenol <sup>®</sup> )	1gota/Kg/dose 4/4 ou 6/6hs se febre/dor (máx.:50gts/dose)
PARACETAMOL Susp 200mg/ml (Tylenol <sup>®</sup> Criança)	11-15kg=5ml/16-21kg=7,5ml/22-26kg=10ml (<3meses)
PARACETAMOL Susp 100mg/ml (Tylenol <sup>®</sup> Bebe)	Peso x 0,13 = dose em ml VO 4/4 ou 6/6hs se febre/dor(<3meses)
<b>ANTIINFLAMATÓRIOS</b>	
CETOPROFENO Gotas 20mg/ml (Profenid <sup>®</sup> )	1 gota/Kg/dose 8/8hs 2 a 5 dias (máx.:50gotas/dose) > 1 ano 7-11anos: 25 gotas / >11 anos: 50 gotas.
DICLOFENACO Gotas 15mg/ml (Cataflan <sup>®</sup> )	1 gota/Kg/dose 8/8hs 2 a 5 dias (máx.:40gotas/dose) > 1 ano
NIMESULIDA 50mg/ml Gotas (Scaflam <sup>®</sup> )	1 gota/Kg/dose 12/12hs 2 a 5 dias (máx.:200mg/40gotas/dose) > 12 anos
IBUPROFENO Gotas 100mg/ml (Alivium <sup>®</sup> )	30-40mg/kg de 6/8 horas se dor Max:200mg/dose (>6m)
<b>ANTIALÉRGICOS</b>	
DESLORETADINA susp 0,5mg/ml(Desalex)	6-11meses: 2ml (1mg)/ 105anos:2,5ml(1,25mg)/ 6-11ª: 5ml(2,5mg)/ >12ª:10ml(5mg) de 24/24hrs 3 a 5 dias . (máx.:15ml/dose) (>6m)
DEXCLORFENIRAMINA 2mg/5ml (Polaramine <sup>®</sup> )	2-6a: 1,25ml/ 2-12a: 2,5ml/ >12a: 5ml 8/8hs por 5 dias (máx.:5ml/dose) >2a
HIDROXIZINA susp 10mg/5ml (Hixizine)	0-2ª: Peso ÷ 4 ml/ >2ª: 5ml 6/6hs 5 dias (> 6kg)
LEVOCETIRIZINASusp 5mg/ml e comp 5mg( Zina/Zyxem)	2-6anos= 0,25ml /6-12 anos=1ml 1x/dia/ ou >6anos 1 comp 1x/dia
LORATADINA susp 1mg/ml (Loralerg)	2-6 anos =5ml / >6 anos = 10ml VO 1x/dia
PROMETAZINA Injetável 50mg/2ml (Fenergan <sup>®</sup> )	Peso x 0,02 = dose em ml Ou Peso ÷ 50 = dose em ml IM(máx.:2ml) (>2anos)
<b>CORTICÓIDES / ALERGIA / ASMA / LARINGITE</b>	
DEXAMETASONA Elixir (Decadron <sup>®</sup> )	Peso ÷ 3 = ml/dose 8/8hs 3 a 5 dias . (máx.:15ml/dose)
DEXAMETASONA 4mg/ml (Decadron <sup>®</sup> )	0,3mg/kg/dose IM ou EV (máx.:4mg/dose)
HIDROCORTISONA 100 e 500 mg (Solucortef <sup>®</sup> )	5mg/kg (ASMA) e 10mg/kg (ALERGIA I.V). Infundir em SG5% lento
PREDINISOLONA susp 3mg/ml (Prelone <sup>®</sup> )	Peso ÷ 3 = dose em ml ao dia por 5 dias. (máx.: 20ml/dia)
PREDINISONA comp 5mg	6-12kg = 1 comp/dia / >12kg = 1 comp 12/12h
BECLOMETASONA (Clenil A)	1/2 flaconete 2x/dia inal.
MOMETASONA (Nasonex)	>2-5 anos= 50mcg 1x /dia dose/ 6 -11 anos=50mcg 2x/dia dose
<b>BRONCODILADORES</b>	
ACEBROFILINA Xarope 25mg/5ml (Filinar <sup>®</sup> )	Peso ÷ 5 = dose em ml 12/12hs 5 dias (máx.:10ml/dose) > 1 ano
BROMETO DE IPATRÓPIO sol 0,25mg/ml (Atrovent)	2 gotas/3kg/dose Inal.:3x /dia /crise aguda: Inal. 3x de 20/ 20 min
FENOTEROL (Berotec)	1 gota/3kg/dose Inal.: 3x/ dia /crise aguda: Inal.3x de 20 / 20 min
FORMOTEROL 12mcg(Fluir)	1capsula(12mcg)/jato 1x /dia ou 15min antes de exercícios > 5 anos
SALBUTAMOL Xarope 2mg/5ml (Aerolin <sup>®</sup> )	0,5 ml p cada 3kg 8/8 h >2 anos
TERBUTALINA Xarope (Bricanyl <sup>®</sup> )	0,25ml/Kg/dose 8/8hs 5 dias (máx.:5ml/dose)
SALMETEROL 50mcg(Serovent)	50mcg/dose 2 x /dia inal. (> 4 anos)

<b>XAROPES / TOSSE / ASMA</b>	
AMBROXOL xarope 3mg/ml	< 2anos= 1,5ml / 2-5anos=2,5ml / > 5anos=5ml de 12/12hs
CARBOCISTEÍNA Xarope Infantil 20mg/ml	2-5anos=2,5ml/6-12 a= 5ml/> 10 anos:=10ml 8/8hs por 5dias ( <b>&gt;2anos</b> )
KÓIDE D® XPE (DEXCLOR. + BETAMETASONA)	2-3 anos: 1,25/ 3-6a: 2/ 6-12a:2,5/ >12a:5 em ml 8/8 por 5 dias (máx.:5ml/dose) ( <b>&gt;2anos</b> )
LEVODROPROPIZINA Xarope 30mg/5ml (Antux® )	0,5 ml p cada 3kg 8/8 h. Tosse seca, irritativa. ( <b>&gt; 2 anos</b> )
MONTELUCASTE sache 4mg(Singular Baby, Montelair, Piemonte) - asma	1 - 5 anos = 1 sache V.O 1x dia
EXPEC XAROPE	5ml de 6/6 horas ( <b>&gt;2 anos</b> )
VICK VAPORUB (descongestionante nasal)	Passar uma camada fina no peito, no pescoço e costas 3x ao dia
<b>ANTIÁCIDOS / RGE</b>	
RANITIDINA Solução Oral 15mg/ml (Label® )	DRGE (1m-16anos): 5-10mg/kg/dia / úlcera péptica: 2-4mg/kg/dose 0,5 ml p cada 3kg 12/12 h
RANITIDINA Injetável 50mg/2ml (Antak® )	Peso ÷ 20 = dose em ml EV (máx.:2ml)
OMEPRAZOL injetável 40mg/10ml	0,2-3,5mg/kg, IV/VO, 12/24 horas.
<b>ANTIEMÉTICOS / VÔMITOS</b>	
BROMOPRIDA gotas 4mg/ml ( Digesan gotas ped)	1gota/kg/dose 6/6hs SN. (máx.:40gotas/dose) ( <b>&gt;2 anos</b> )
BROMOPRIDA susp 4mg/ml (Digesan susp ped)	Peso x 0,03 =ml/dose IM/IV(máx.:1ml/ds) IV diluir p 10ml AD lento
DIMENIDRATO Gotas 25mg/ml (Dramin® )	1gota/kg/dose 6/6hs SN. (máx.:40gotas/dose)
DIMENIDRATO Injetável 50mg/ml IM (Dramin® )	Peso x 0,03 = ml/dose IM (máx.:1ml/dose)
DIMENIDRATO Injetável 30mg/10ml EV (Dramin® )	10Kg = 4ml (máx.:10ml/dose). Ex:SG5%250ml+Dramin4ml EV
DOMPERIDONA susp 1mg/ml (Motilium)	Peso x0,25=ml/dose de 8/8hs SN (máx.:30ml/dia)
METOCLOPRAMIDA Gotas 4mg/ml (PLASIL® )	2/3 PESO = dose em gotas 8/8hs SN (máx.:40gotas/dose)
METOCLOPRAMIDA Injetável 10mg/2ml (PLASIL® )	<6anos: peso/50 / 6-14anos: 2,5-5mg/ >14anos: 10mg IM/EV (máx.:2ml)
ONDANSETRONA (Vonau fash) 4mg – 8mg	< 4 anos: 1-3mg/dose/ 4-12anos: 4mg/dose, 8/8 horas se vômitos
ONDANSETRONA INJETÁVEL 2mg/ml	6m-12anos: 0,15mg/kg, IV, de 8/8 horas, Max:16mg/dose ( <b>&gt;6m</b> )
<b>ANTIESPASMÓDICOS / CÓLICAS / FLATULÊNCIA</b>	
DIMETICONA Gotas (Luftal® )	Lacts: 4 a 6 gts /< 12 anos: 6 a 12 gts 6/6hs se cólicas ou gases (5dias)
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (Buscopam Composto)	1gota/kg/dose 6/6hs SN (máx.:40 gotas/dose)
BUSCOPAM COMPOSTO® EV	Peso ÷ 40 (0,5mg/kg) dose em ml. Infundir diluído no soro lentamente
<b>LAXANTES</b>	
ÓLEO MINERAL (Nujol® )	<5 anos: 5ml/ 5-10anos: 7,5ml/ >10 anos: 15ml de 12/12 horas (máx.:15ml/dose). <b>Evitar &lt; 1 ano</b>
LACTULONA® Xarope (Lactulose)	< 1 ano: 5 ml/dia / 1 a 5 anos: 7,5ml/dia / 6 a 12 anos: 12ml/dia
LEITE DE MAGNÉSIA	1 a 3ml/kg/dia 1 a 2x/dia (máx.:30ml/dia) ( <b>&gt;2anos</b> )
MINILAX	Aplicar um tupo VIA RETAL ( P/ Constipação Aguda)
TAMARINE GELÉIA	1 colher de chá 1x ao dia ( <b>&gt;12 anos</b> )
CLISTER GLICERINADO	10ml/kg na sonda retal
<b>DIARRÉIA</b>	
TIORFAN sache 10mg	3mês - 1 ano: 1 sache/ 1 -3 a: 2 saches/ 4 - 9 a : 3 saches 8/8hs
FLORATIL capsula 200mg	1 caps. em meio copo de água 1x ao dia por 5 dias
FLORAX PEDIÁTRICO	Dar 01 flaconete por via oral de 12/12 horas por 3 dias.
BIOZINC 2MG/0,5ML	Dar 1,5 ml ao dia por 10 a 14 dias. (até 6meses) Dar 3 ml ao dia por 10 a 14 dias. (> 6 meses)
<b>ANTIPARASITÁRIOS</b>	
ANNITA® Susp Oral 20mg/ml (Nitazoxanida) (>1ano)	7,5 x Peso ÷ 20 = dose em ml 12/12hs 3-14 dias (máx.:15ml/dose)
ALBENDAZOL Suspensão Oral 400mg/10ml	10ml Dose Única/ Teníase e Estrongiloidíase: 400mg/dia 3 dias/ Giardiase:10ml/dia 5 dias. <b>Evitar &lt; 2 anos</b>
CETOCONAZOL comp 200mg	>15 -30kg =1/2 comp / >30kg= 1 comp 1x/dia 2-4 semanas ( <b>&gt;2anos</b> )
MEBENDAZOL Suspensão Oral 100mg/5ml	5ml 12/12hs 3-4 dias. <b>Evitar &lt; 2 anos</b>
IVERMECTINA 6mg (Revectina® )	(200mcg/kg/dia) 15-24kg= 1/2 comp / 25-34kg=1 comp /35-50kg= 1 1/2 comp dose única
<b>OFTALMOLÓGICOS</b>	
CROMOGLICATO DISSÓDICO 2% (Cromolerg® )	1 gota 6/6 horas 5 dias
GENTAMICINA COLÍRIO	1 gota 6/6 horas 5 dias
MAXITROL® COLÍRIO (Dexam, Neomicina, PolimixinaB)	1-2 gotas 6/6 horas 5 dias

[illegible]