

LISTA DE MEDICAMENTOS QUE PODE USAR NA GESTAÇÃO

HIPERTENSÃO

DHEG

Metildopa 250mg 01-2 cp VO até de 6/6h

HIPERTENSÃO AGUDA GRAVE

Nifedipino 20mg 01cp VO de 30/30min

Hidralazina 5mg/01 amp EV de 30/30 min

CRISE HIPERTENSIVA

Sulfato de Magnésio:

MgSO₄ 8ml + SF 0,9% 92ml correr em 20 min em BIC (300ml/h)

MgSO₄ 10ml + SG 5% 500ml correr em 100ml/h em BIC

DIABETES

Insulina

ANTIANEMICOS

Profilaxia: 40mg sulfato ferroso + 60 gotas de ácido fólico 0,2mg/mL até o 3º mês de puerpério

Tratamento: ajustar SF conforme hemoglobina

SISTEMA RESPIRATÓRIO

SD GRIPAL

Beclometasona spray nasal 2 jatos em cada narina de 12/12h

Budesonida spray nasal 2 jatos em cada narina de 12/12h

Bromelin S 10ml 12/12h

Loratadina 10mg 1cp VO 1x ao dia

PNEUMONIA/SINUSITE/AMIGDALITE

Amoxicilina 500mg 01 cp VO de 8/8h

Amoxicilina + clavulanato (Clavulin) 875 + 125mg 01cp VO de 12/12h

Azitromicina 500mg 01cp VO 1x ao dia 5 dias

BRONCOESPAMO/CRISE ASMÁTICA

Salbutamol

Crises graves: considerar corticoide, porém avaliar se é PNAR e vai precisar de doppler – corticoide anula a avaliação do ducto venoso.

SISTEMA GASTROINTESTINAL

NÁUSEAS E VÔMITOS

Onasetrona (Vonau, Zofran) 4mg 1cp VO de 8/8h

Meclizina (Meclin) 25mg 01 cp VO de 8/8h

Metoclopramida (Plasil) 4mg 01 cp/01 amp de 8/8h

Dimenidrinato (Dramin) 40gts/01cp/01 amp de 8/8h

Ranitidina 150mg 01 cp VO de 8/8h

EPIGASTRALGIA

Simeco Plus (hidróxido de alumínio + hid de magnésio + simeticona) 10ml VO de 8/8h

LuftaGastroPro (alginate de sódio + bicarbonato de potássio) 10 ml VO de 8/8h

Hidróxido de Alumínio (Mylanta Plus) 10 ml VO de 8/8h

DOR ABDOMINAL

Escopolamina (Buscopan) 10mg 01 cp VO de 8/8h

Escopolamina + paracetamol (Buscoduo) 10+500mg 01 cp VO de 8/8h

Ranitidina 150mg 01 cp VO de 8/8h

CONSTIPAÇÃO

Óleo mineral

Lactulona 10ml VO

Tamarine 01cp VO a noite por 7 dias

Bisacodil (Dulcolax) 5mg 01 cp VO

DIARREIA

Soro de Reidratação Oral

Floratil 200mg 01 cp VO de 8/8h 3d

Enterogermina 5ml VO 8/8h por 3d

DOENÇA HEMORROIDARIA

Diosmina + heperidina (Proctyl, Daflon) tópico aplicar na região de / h

TRATO GENITAL

CANDIDÍASE

Miconazol creme vaginal 1 tubete por noite, por 7 noites.

Se candidíase de repetição ou quando importante: Fluconazol 150mg VO DU

VAGINOSE

Metronidazol 250mg 2cp 12/12h 7 dias
OU

Metronidazol 500mg 2cp 12/12 7 dias

TRICOMONÍASE

Metronidazol 250mg 3cp 8/8h 7 dias
OU

Metronidazol 500mg 2cp 12/12 7 dias

CLAMIDIA/GONORREIA

Azitromicina 500mg 02 cp VO DU + Ceftriaxona 250mg IM du

SISTEMA URINÁRIO

BAC ASSINTOMÁTICA/ITU/CISTITE

<36 sem: Nitrofurantoína 100mg 01cp VO de 6/6h 5dias

>36 sem: Cefalexina 500mg 01cp VO de 6/6h por 7dias

Amoxicilina ou amoxi + clavulanato 8/8h de 4-7dias

PIELONEFRITE

Cefuroxima 750mg EV de 8/8h – ate ficar afebril e trocar por VO, completando 10-14d

Cefepima 2g EV de 8/8h ou de 12/12h

DOR

Paracetamol 500mg VO de 4/4h (pode associar com prednisona 5mg VO de 12/12h se dor intensa)

Miosan 5 mg a noite, por 3 dias, se cefaleia intensa

Dipirona 500mg EV se dor intensa

Decadron 01 amp IM se dor intensa

Tramal 01 amp EV se dor refratária

PELE E ANEXOS

PRURIDO

Levocetirizina (Zina) 5mg 01 cp VO

Loratadina 10mg 01 cp VO

Hidroxizina (Hixizine) 25mg 01 cp VO

Fexofenadina (Allegra) 120mg 01 cp VO

PSIQUIATRIA

ANSIEDADE/DEPRESSÃO

Sertralina 50mg 01 cp VO 1x ao dia

CRISE DE ANSIEDADE

Neozine 40mg/ml 5gts VO

Prometazina 01 amp IM

Diazepam 5mg 01cp VO se na maternidade e refratária a outras medidas

INSÔNIA

Neozine 40mg/ml 5gts VO a noite

SISTEMA NEUROLÓGICO

Na epilepsia: Manter medicação usual, desde que não seja Valproato de Sódio; Aumentar o esquema de ácido fólico no 1º trimestre

Diazepam 5mg 01cp VO se na maternidade e refratária a outras medidas

NÃO FAZER EM GESTANTE

AINES

Sulfametoxazol + timetripima