

PRESCRIÇÕES PARA CASA MARCO AURÉLIO E AURÉLIA

Sumário

ALERGIA / ASMA	4
ALERGIA AO DESODORANTE	5
AMIGDALITES VIRAIS / IVAS	5
AMIGDALITE BACTERIANA LEVE	6
AMIGDALITE BACTERIANA LEVE / ALERGIA À B-LACTÂMICOS	6
AMIGDALITE BACTERIANA MODERADA	7
AMIGDALITE BACTERIANA GRAVE / RECORRENTE	7
AMIGDALITE BACTERIANA GRAVE / RESISTENTE A B-LACTAMICOS	7
ABSCESSO ANAL	8
ABSCESSO CUTÂNEO / FURÚNCULO	8
ABSCESSO DENTÁRIO	8
ANEMIA	9
ANEMIA SEVERA	9
ANSIEDADE / INSONIA	9
CANDIDÍASE OROFARÍNGEA	10
CANDIDÍASE VAGINAL	11
CANDIDÍASE VAGINAL RECORRENTE	11
CEFALEIA	12
CELULITE	12
CELULITE PERIORBITÁRIA	12
CERUME	12
CONJUNTIVITE BACTERIANA	13
CONJUNTIVITE VIRAL / ALÉRGICA	13
CONSTIPAÇÃO	14
DENGUE	14
DERMATITE SEBORREICA (CASPA):	15
DERMATITE ATÓPICA	15
DIVERTICULITE AGUDA	16
DOR INTENSA	16
DOR NEUROPÁTICA	16
DPOC	17
DST'S (TRATAR PARCEIROS):	17
ENXAQUECA	18
ERISPELA / FURUNCULOSE / CELULITE NÃO COMPLICADA	19
ERISPELA / FURUNCULOSE / CELULITE COMPLICADA	19

ECZEMA DE COTATO	20
FERIDAS	20
FISTULA ANAL	20
FURUNCULOSE RECORRENTE (PROFILAXIA):	21
ESCABIOSE (SARNA):	21
GASTRITE CRÔNICA E DRGE	22
GASTROENTERITES BACTERIANAS	22
GASTROENTERITES VIRAIS / ALIMENTÍCIAS	23
GOTA	24
GRIPE (H1N1 – INFLUENZA)	24
HIPERCERATOSE PLANTAR	24
HEMORRAGIA	24
HEMORROIDAS	25
HERPES ORAL / GENITAL	25
HERPES ZOSTER	26
HORDÉOLO (TERÇOL)	26
H.PYLORI	27
IMPETIGO	28
INCONTINÊNCIA URINÁRIA / BEXIGA HIPERATIVA	28
INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA	28
INTOLERÂNCIA A LACTOSE	29
ITU (CISTITE NÃO COMPLICADA) / PROSTATITE	29
ITU COMPLICADA (PIELONEFRITE):	30
ITU EM GESTANTE:	30
ITU DE REPETIÇÃO (PROFILAXIA):	31
LABIRINTITE / SÍNDROME DE MENIERE / TONTURA / VERTIGEM	31
LARVA MIGRANS (BICHO GEOGRÁFICO)	32
LOMBOCIATALGIA / LOMBALGIA / ARTROSE	32
LOMBALGIA SEM AINES	32
LUBRIFICANTE OCULAR	33
NÁUSEAS	33
NEFROLITÍASE	33
ONICOMICOSE	34
OSTEOPOROSE	35
OTITE MÉDIA AGUDA	35
OTITE EXTERNA AGUDA	36
PÉ DIABÉTICO	36
PEDICULOSE (PIOLHO):	37

PEP	37
PNEUMONIA COMUNITÁRIA (< 50 ANOS / SEM COMORBIDADES / SEM FR PARA PNEUMOCOCCO RESISTENTE *):	38
PNEUMONIA COMUNITÁRIA (> 50 ANOS / COMORBIDADES / FR PARA PNEU-MOCOCCO RESISTENTE * / USO ATB ULTIMOS 3 MESES):	39
RINITE ALÉRGICA	40
POLIVITAMINICO	40
PROSTATITE	40
PTIRIASE VERSICOLOR	41
REFLUXO GASTROESOFÁGICO	41
SINDROME GRIPAL (INFLUENZA	42
SINUSITE VIRAL	42
SINUSITE BACTERIANA AGUDA (< 4 SEM) LEVE // OTITE MÉDIA AGUDA	43
SINUSITE BACTERIANA OU OTITE MÉDIA AGUDA (< 4 SEM) COMPLICADA / USO ATB ULTIMOS 3 MESES / CRÔNICA (> 12 SEM):	44
SINUSITE BACTERIANA OU OTITE MÉDIA AGUDA (< 4 SEM) RECORRENTE / RESISTENTE A B-LACTAMICOS	45
SÍNDROME MÃO PÉ BOCA	45
SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL	46
TÍNEA CAPITIS	46
TÍNEA CORPORIS	47
TÍNEA PEDIS (FRIEIRA) / MÃO	47
TOSSE	48
TRANSTORNO RELACIONADOS À NICOTINA / CIGARRO / TABACO (TABAGISMO)	48
TUBERCULOSE PULMONAR	49
VARICELA (CATAPORA):	49
VERMINOSES	50
OBSERVAÇÕES – ANTICONCEPCIONAL	51
VIROSE	52
GINECOLÓGICO	53
BARTHOLINITE e CERVICITE (CLAMIDIA OU GONORREIA) – CORRIMENTO URETRAL e CANCRO MOLE	53
CANDIDÍASE VAGINAL	53
DIP (DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA)	54
DISMENORRÉIA	54
ECTOPIA CERVICAL	55
ITU (CISTITE NÃO COMPLICADA)	55
ITU NA GESTAÇÃO	56
ITU DE REPETIÇÃO (PROFILAXIA)	56

METRORRAGIA	56
SÍFILIS	56
VAGINOSE BACTERIANA (Gardenella)/ TRICOMONIASE	57

ALERGIA / ASMA:

USO INTERNO:

1) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

2) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 5 DIAS

3) SALBUTAMOL (90 MCG/JATO) ----- 01 FRASCO
ADMINISTRAR 02 JATOS POR VIA ORAL, 4 VEZES AO DIA, DURANTE 2 DIAS
QUANDO APRESENTAR CRISE

+

LEVE *

4) BECLOMETASONA (200 MCG) ----- 01 FRASCO
ADMINISTRAR 01 JATO POR VIA ORAL DE 12/12 HORAS

OU

4) BUDESONIDA (200 MCG/SPRAY) ----- 01 FRASCO
ADMINISTRAR 01 JATO POR VIA ORAL ATÉ DE 8/8 HORAS

MODERADO **

4) *

5) FORMOTEROL (12 OU 24 MCG) ----- 01 FRASCO
ADMINISTRAR 01 JATO POR VIA ORAL DE 12/12 HORAS

OU

5) SALMETEROL (50 MCG/JATO) ----- 01 FRASCO
ADMINISTRAR 01 JATO POR VIA ORAL DE 12/12 HORAS

GRAVE

4) BECLOMETASONA (400 MCG) ----- 01 FRASCO
ADMINISTRAR 01 JATO POR VIA ORAL DE 12/12 HORAS (ATÉ 2000 MCG/DIA)

+/-

5) **

+/-

6) PREDNISONA 20 MG ----- CONT
TOMAR 01 A 03 COMPRIMIDOS AO DIA

USO TÓPICO

4) TROK-N ® ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE A ÁREA AFETADA 2 VEZES AO DIA

ALERGIA AO DESODORANTE

USO TÓPICO:

1) HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO ----- 01 FRASCO
PASSAR NA REGIÃO DAS AXILAS QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIA

OU

1) HIDROCORTISONA 1% CREME ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE AS LESÕES, 01 VEZ AO DIA, DURANTE 7 DIAS

RECOMENDAÇÕES:

- USAR ROUPAS DE ALGODÃO, EVITANDO ROUPAS DE NYLON, LYCRA E POLIÉSTER
- USAR CREME HIDRATANTE HIPOALERGÊNICOS
- TROCAR DESODORANTE PARA HIPOALERGÊNICO E SEM PERFUME

AMIGDALITES VIRAIS / IVAS:

USO INTERNO:

1) NIMESULIDA 100 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

2) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($TAX \geq 37,8^{\circ} C$)

3) ACETILCISTEÍNA (40 MG/ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 10 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECRETIVA

OU

3) DEXCLORFENIRAMINA (2MG/5ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 5 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECA

OU

3) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 5 DIAS

USO NASAL:

4) CLORETO DE SÓDIO (9 MG/ML) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, VÁRIAS VEZES AO DIA, PRINCIPALMENTE À NOITE

5) BUDESONIDA (50 OU 100 MCG/DOSE) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, 2 VEZES AO DIA, POR ATÉ 5 DIAS

AMIGDALITE BACTERIANA LEVE:

USO INTERNO:

1) AMOXICILINA 500 MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 10 DIAS

2) NIMESULIDA 100 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

3) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($TAX \geq 37,8^{\circ} C$)

* INDICAÇÃO DE ATB - PRESENÇA DOS 4 CRITÉRIOS DE CENTOR:

- FEBRE
- EXSUDATO TONSILAR
- AUSÊNCIA DE TOSSE E RINORRÉIA
- ADENOPATIA CERVICAL DOLOROSA

AMIGDALITE BACTERIANA LEVE / ALERGIA À B-LACTÂMICOS:

USO INTERNO:

1) AZITROMICINA 500 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 5 DIAS

2) NIMESULIDA 100 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

3) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

AMIGDALITE BACTERIANA MODERADA:

USO INTERNO:

1) PENICILINA BENZATINA 1.200.00UI, VIA IM, DOSE ÚNICA

OU

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO (500 + 125 MG) ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 10 DIAS

2) NIMESULIDA 100 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

3) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

AMIGDALITE BACTERIANA GRAVE / RECORRENTE:

USO INTERNO:

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO (875 + 125 MG) ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 10 DIAS

2) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

3) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

AMIGDALITE BACTERIANA GRAVE / RESISTENTE A B-LACTAMICOS:

USO INTERNO:

1) LEVOFLOXACINO 500 MG ----- 07 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 7 DIAS

OU

1) CEFALEXINA 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 10 DIAS

2) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

3) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

ABSCESSO ANAL

USO INTERNO:

1) CLAVULIN 500/125MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS, POR 7 DIAS.

2) LISADOR DIP 1G ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 6/6 HORAS, SE DOR OU T \geq 37,8°C.

3) IBUPROFENO 400MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 6/6 HORAS POR 3 DIAS.

4) METAMUCIL ----- 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 200ML DE ÁGUA E TOMAR A SOLUÇÃO, VIA ORAL, 01 VEZ AO DIA.

CUIDADOS E ORIENTAÇÕES:

- CURATIVO ATÉ 6 VEZES AO DIA: LIMPEZA EXAUSTIVA COM ÁGUA CORRENTE, COBRIR COM ANALGÉSICO TÓPICO (HIDROCORTISONA/LIDOCAÍNA E GAZE).
- BANHO DE ASSENTO COM ÁGUA MORNAPÓS AS EVACUAÇÕES PELOS PRIMEIROS 7 DIAS APÓS A DRENAGEM.

ABSCESSO CUTÂNEO / FURÚNCULO

USO INTERNO:

1) NOVALGINA 1G ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL DE 06/06H SE DOR OU TEMPERATURA MAIOR OU IGUAL A 37,8°C.

2) BIPROFENID 150MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, UMA VEZ AO DIA, POR 5 DIAS.

3) CEFALEXINA 500MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 6/6 HORAS, POR 7 DIAS.

4) MUPIROCINA POMADA 20MG/G ----- 01 CAIXA
APLICAR EM LESÃO, VIA TÓPICA, DE 8/8 HORAS, POR 7 DIAS.

CUIDADOS E ORIENTAÇÕES:

- COMPRESSA COM CALOR ÚMIDO LOCAL POR 20 MINUTOS POR 7 DIAS PARA COMPLEMENTAR DRENAGEM.
- CURATIVO DIÁRIO ENQUANTO MANTIVER DRENAGEM ATIVA. REAVALIAÇÃO APÓS 2 DIAS.

ABSCESSO DENTÁRIO

USO INTERNO:

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO (875 + 125 MG) ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 10 DIAS

2) METRONIDAZOL 250MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA 8 HORAS POR 7 DIAS

2) DAPIRONA 500MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 12/12 HORAS

3) IBUPROFENO 600 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA 8 HORAS SE DOR OU FEBRE

USO EXTERNO:

1) DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% 1 FRASCO 250 ML
BOCHECHAR 15 ML DA SOLUÇÃO DURANTE 01 MINUTO, MEIA HORA APÓS A
ESCOVAÇÃO E USO DO FIO DENTAL, A CADA 12 HORAS, POR 07 DIAS
OBS: NÃO ENXAGUAR A BOCA E NEM COMER OU BEBER POR MEIA HORA
APÓS O USO.

ANEMIA:**USO INTERNO:**

1) SULFATO FERROSO 40 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO, 1 A 3 VEZES AO DIA, 1 HORA ANTES OU 2 HORAS APÓS
AS REFEIÇÕES

OU

1) NORIPURUM 50MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 30 GOTAS DILUIDA EM ÁGUA

ANEMIA SEVERA:**USO INTERNO:**

1) TRANSAMIN 500 MG ----- 15 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 5 DIAS

USO ENDOVENOSO:

2) NORIPURUM (100MG/5ML) ----- 10 AMPOLAS
DILUIR 2 AMPOLAS EM 500 ML DE SF 0,9%, CORRER LENTO, EM DIAS
ALTERNADOS, ATÉ COMPLETAR 5 DOSES

ANSIEDADE / INSONIA:**USO INTERNO:**

1) SINTOCALMY 300 MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, 2 HORAS ANTES DE SE DEITAR

OU

1) PASALIX 500 MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, 2 HORAS ANTES DE SE DEITAR

OU

1) PAZINE PASSIFLORA INCARNATA 315MG -----30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE, 2 HORAS ANTES DE SE DEITAR

1ª LINHA: ISRS E ISRSN EFEITO PODE DEMORAR 2-4 SEM

1) CLORIDRATO DE SERTRALINA 25 MG (**SUS**) ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA

OU

1) ESCITALOPRAM 10MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA

OU

1) CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA

1) CLORIDRATO DE VENLAFAXINA ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA

ORIENTAÇÕES

ORIENTO ATIVIDADE FÍSICA
ENCAMINHAR PARA A PSICOLOGIA

CANDIDÍASE OROFARÍNGEA:

USO INTERNO:

1) NISTATINA 500.000 UI ----- 40 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H POR 10 DIAS (CASOS LEVES)

OU

1) FLUCONAZOL 200 MG ----- 01 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA NO PRIMEIRO DIA (CASOS GRAVES)

OU

1) FLUCONAZOL 100 MG ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 13 DIAS (CASOS GRAVES)

OU

1) ITRACONAZOL 100 MG ----- 28 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS, 1 VEZ AO DIA, POR 14 DIAS (CASOS GRAVES)

2). ALBICON POMADA ----- 01 TUBO
USO: APLICAR NA LESÃO, DE 08/08 HORAS, APÓS HIGIENE ORAL

OU

2) BISMU-JET 25MG/ML + 25MG/ML + 15MG/ML ----- 01 FRASCO
AGITE ANTES DE USAR. PINGAR UMA OU DUAS GOTAS SOBRE O LOCAL
AFETADO DA BOCA, 3 A 6 VEZES AO DIA

3) NISTATINA 100.000UND/ML ----- 01 TUBO
USO: BOCHECHAR E ENGOLIR 5 ML, DE 06/06 HORAS, APÓS HIGIENE ORAL,
DURANTE 07 DIAS

4) PERIOGARD SEM ÁLCOOL ----- 01FRASCO
USO: BOCHECHAR 01 MEDIDA, DE 08/08 HORAS, APÓS HIGIENE ORAL,
DURANTE 05 DIAS

CANDIDÍASE VAGINAL:

USO INTERNO:

1) FLUCONAZOL 150 MG ----- 01 CP
TOMAR 01 COMPRIMIDO EM DOSE ÚNICA

OU

1) ITRACONAZOL 100 MG ----- 06 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS, 1 VEZ AO DIA, POR 3 DIAS

USO INTRAVAGINAL:

2) MICONAZOL CREME A 2% ----- 01 TUBO
ADMINISTRAR COM AUXILIO DE APLICADOR INTRAVAGINAL CHEIO, À NOITE AO
DEITAR, DURANTE 7 DIAS

3) NISTATINA CREME ----- 01 TUBO
ADMINISTRAR COM AUXILIO DE APLICADOR INTRAVAGINAL CHEIO, À NOITE AO
DEITAR, DURANTE 14 DIAS

CANDIDÍASE VAGINAL RECORRENTE:

USO INTERNO:

1) FLUCONAZOL 150 MG ----- 24 CPS

TOMAR 01 COMPRIMIDO, 1 VEZ POR SEMANA, DURANTE 6 MESES

OU

1) ITRACONAZOL 100 MG ----- 24 CPS
TOMAR 04 COMPRIMIDOS, 1 VEZ AO MÊS, DURANTE 6 MESES

CEFALEIA:

USO INTERNO:

1) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($TAX \geq 37,8^{\circ} C$)

2) NAPROXENO 500 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR NO MÁXIMO 5 DIAS

CELULITE

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO (875 + 125 MG) ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 10 DIAS

ALERGIA A BETALACTÂMICOS:

1) CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG ----- 32 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 HORAS POR 8 DIAS

CELULITE PERIORBITÁRIA

CRIANÇA

USO INTERNO:

1) CLINDAMICINA SUSPENSÃO 75 MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 7,3 ML VIA ORAL A CADA 8 HORAS POR 10 DIAS

2) DIPIRONA GOTAS ----- 01 FRASCO
TOMAR 15 GOTAS VIA ORAL DE 6/6 HORAS SE DOR POR FEBRE

NO ADULTO

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO (500 + 125 MG) ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 HORAS POR 10 DIAS

SE ALERGIA A PENICILINA:

1) MOXIFLOXACINO 400 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO POR DIA POR 10 DIAS

CERUME

USO OTOLÓGICO:

1) CERUMIN ----- 01 FRASCO
APLICAR 03 GOTAS EM OUVIDO AFETADO, DE 8/8 HORAS, POR 5 DIAS.
AGUARDAR 5 MINUTOS A MEDICAÇÃO AGIR E SÓ APÓS APLICAR NO OUTRO
OUVIDO - INICIAR 5 DIAS ANTES DA CONSULTA

2) PROFENID 100MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 5 DIAS

CONJUNTIVITE BACTERIANA:

USO TÓPICO:

1) TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ----- 01 FRASCO
PINGAR 01 GOTA NO OLHO ACOMETIDO DE 6/6 H POR 7 DIAS.

2) LAVAR COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% GELADO 3 VEZES AO DIA

3) COMPRESSA DE ÁGUA GELADA, 4 VEZES AO DIA, DURANTE 15 MINUTOS

USO INTERNO:

4) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 5 DIAS

ORIENTAÇÕES:

- SEMPRE LAVAR AS MÃOS ANTES E APÓS TOCAR NO ROSTO OU NO OLHO
- NÃO COMPARTILHAR TOALHAS DE ROSTO / ÓCULOS / ETC.
- USAR LENÇO DE PAPEL PARA ENXUGAR OS OLHOS.
- EM CASO DE PIORA OU NÃO MELHORA, PROCURAR OFTALMOLOGISTA NA EMERGÊNCIA.

CONJUNTIVITE VIRAL / ALÉRGICA:

USO TÓPICO:

1) LERIN ® ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 GOTAS NO OLHO AFETADO ATÉ DE 2/2 HORAS, POR ATÉ 5 DIAS

2) LAVAR COM SORO FISIOLÓGICO 0,9% GELADO 3 VEZES AO DIA

3) COMPRESSA DE ÁGUA GELADA, 4 VEZES AO DIA, DURANTE 15 MINUTOS

USO INTERNO:

4) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS

TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 5 DIAS

ORIENTAÇÕES:

- SEMPRE LAVAR AS MÃOS ANTES E APÓS TOCAR NO ROSTO OU NO OLHO
- NÃO COMPARTILHAR TOALHAS DE ROSTO / ÓCULOS / ETC.
- USAR LENÇO DE PAPEL PARA ENXUGAR OS OLHOS.
- EM CASO DE PIORA OU NÃO MELHORA, PROCURAR OFTALMOLOGISTA NA EMERGÊNCIA.

CONSTIPAÇÃO:

USO INTERNO:

1) MUVINLAX® (SACHÊ 14 G) ----- 01 CX
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 COPO DE ÁGUA, CHÁ OU SUCO DE 125 ML E INGERIR 01 A 02 SACHÊS PELA MANHÃ (RESPOSTA RÁPIDA = 05 SACHÊS / NOITE)

2) LACTULOSE (667 MG/ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 15 ML DE 12/12H (MÁXIMO 6 VEZES AO DIA)

USO RETAL

3) SUPOSITÓRIO DE GLICERINA (2392 MG/SUP) ----- 01 CX
COLOCAR 01 SUPOSITÓRIO, POR VIA RETAL, SEMPRE QUE NECESSÁRIO

DENGUE:

USO INTERNO:

1) SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL (SACHÊ) ----- 10 SACHÊS
DISSOLVER 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA E INGERIR X LITROS AO DIA, COMPLEMENTANDO COM X LITROS DE LÍQUIDOS CASEIROS (ÁGUA, SUCO, CHÁ E OUTROS). MANTER HIDRATAÇÃO ATÉ 48 HORAS APÓS DESAPARECIMENTO DA FEBRE

* 60 ML/KG/DIA – SENDO 1/3 NA FORMA DE SRO E 2/3 EM LÍQUIDOS CASEIROS

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($T_{ax} \geq 37,8^{\circ} C$)

3) VONAU® 8 MG SUBLINGUAL ----- 01 CX
COLOCAR 01 COMPRIMIDO SUBLINGUAL ATÉ DE 8/8 H, SE ENJÔO OU VÔMITO, POR ATÉ 05 DIAS

ORIENTAÇÕES:

1) RETORNAR PARA REAVALIAÇÃO CLÍNICA NO DIA DE MELHORA DA FEBRE OU NO 5º DIA CASO A FEBRE NÃO DESAPAREÇA

2) RETORNAR EM CASO DE SINAIS DE ALARME: DOR ABDOMINAL INTENSA, VÔMITOS PERSISTENTES, HIPOTENSÃO QUANDO EM PÉ OU DESMAIO, SANGRAMENTOS, DESCONFORTO RESPIRATORIO

3) NÃO INTERROMPER ALIMENTAÇÃO

4) NÃO USAR: AAS OU ANTI-INFLAMATÓRIOS

DERMATITE SEBORREICA (CASPA):

USO INTERNO:

1) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DE PREFERÊNCIA À NOITE, CASO HAJA COCEIRA, POR ATÉ 5 DIAS

USO TÓPICO:

2) CETOCONAZOL 2% SHAMPOO ----- 01 FRASCO
APLICAR NO COURO CABELUDO ÚMIDO ATÉ FAZER ESPUMA E DEIXAR AGIR POR 5 MINUTOS ANTES DE ENXAGUAR. UTILIZAR EM DIAS ALTERNADOS ATÉ CONTROLE DA ESCAMAÇÃO. APÓS, MANTER SEU USO 3 VEZES POR SEMANA

- OUTRAS OPÇÕES DE SHAMPOO: PIRITIONATO DE ZN 2,5% SHAMPOO, DOCTAR SHAMPOO, IONIL T SHAMPOO OU STIPROXAL SHAMPOO

3) HIDROCORTISONA 1% CREME ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE AS LESÕES NA FACE, 1 VEZ AO DIA, DURANTE 7 DIAS

ORIENTAÇÕES:

- EVITAR PRODUTOS OLEOSOS NO CABELO

DERMATITE ATÓPICA

USO INTERNO:

1) LORATADINA XAROPE 1 MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 05 ML VIA ORAL 01 VEZ AO DIA POR 10 DIAS

USO LOCAL:

1) FLUTICASONA CREME 0,05% ----- 01 TUBO
APLICAR NA REGIÃO AFETADA, UMA PEQUENA CAMADA, 02 VEZES AO DIA ATÉ A MELHORA DO ECZEMA.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

- EVITAR CONTATO COM POEIRA, PÓLEN, PELOS DE ANIMAIS, MANTER CASA LIMPA E AREJADO, EVITANDO AMBIENTES FECHADOS COM CARPETES, TAPETES, CORTINAS E ALMOFADAS
- PREFERIR ROUPAS LEVES DE ALGODÃO, QUE PERMITAM A TRANSPIRAÇÃO, EM VEZ DOS SINTÉTICOS.
- MANTER UNHAS CURTAS, PARA EVITAR ESCORIAÇÕES POR COÇADURA
 - HIDRATANTE É A BASE DO TRATAMENTO DA DERMATITE
 - BANHOS RÁPIDOS E EVITAR BANHOS COM ÁGUA QUENTE
 - USAR SABONETES COM PH NEUTRO

EM CASOS GRAVES, ASSOCIAR CORTICOIDE SISTÊMICO E ENCAMINHAR PARA DERMATOLOGIA, PARA AVALIAR POSSÍVEL USO DE TACROLIMO

DIVERTICULITE AGUDA

1) CIPROFLOXACINO 500MG -----01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS POR 10 DIAS.

2) METRONIDAZOL 400MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS POR 10 DIAS.

3) BUSCOPAM COMPOSTO ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS SE DOR.

3) VONAU 4MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORA, DE 8/8 HORAS, SE NÁUSEAS OU VÔMITOS.

CUIDADOS GERAIS:
– REPOUSO E HIDRATAÇÃO ORAL VIGOROSA.

DOR INTENSA:

USO INTERNO:

1) TRAMADOL 50 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 OU 02 COMPRIMIDOS ATÉ DE 6/6 HORAS, CASO DOR INTENSA

OU

1) PACO 30 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO ATÉ DE 6/6 HORAS, CASO DOR INTENSA

2) OLEO MINERAL ----- 01 FRASCO
TOMAR 10 ML DE 12/12 HORAS, ENQUANTO USAR O PACO

DOR NEUROPÁTICA

USO INTERNO:

PREGABALINA 75MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE OU DE 12/12 HORAS E AUMENTAR A
CONFORME RESPOSTA CLÍNICA (DOSE MÁXIMA: 600MG/DIA)

DPOC

USO INTERNO:

1- AMOXICINA 500 MG ----- 30 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8H POR 10 DIAS CONSECUTIVOS
HORÁRIO SUGERIDO (8/8h): 06:00 / 14:00 / 22:00

2- AZITROMICINA 500 MG ----- 07 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 07 DIAS
CONSECUTIVOS

3- PREDNISONA 20 MG ----- 05 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ÀS 8:00 POR 05 DIAS SEGUIDOS

4- DAPIRONA 500 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS SE DOR OU FEBRE, PODENDO REPETIR DE 6/6H

5- OMEPRAZOL 20 MG ----- 10 COMPRIMIDOS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ, EM JEJUM, POR 10 DIAS

USO INALATÓRIO

6- SALBUTAMOL SPRAY AEROSOL 100 MCG ----- 01 FRASCO
INALAR 01 PUFF NO MEIO DA RESPIRAÇÃO PROFUNDA E SEGURAR A
RESPIRAÇÃO POR 10 SEG. REPETIR UMA VEZ APÓS UM MINUTO.
SE NECESSÁRIO, PODE REPETIR AS DUAS INALAÇÕES APÓS 6H DA ÚLTIMA
DOSE.

DST'S (TRATAR PARCEIROS):

DONOVANOSE:

USO INTERNO:

1) DOXICICLINA 100 MG ----- 42 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 21 DIAS

GONORRÉIA / CANCRO MOLE / CLAMIDIASE / SÍFILIS 1ª, 2ª E LATENTE PRECOCE (< 1 ANO DE DOENÇA):

USO INTERNO:

1) AZITROMICINA 500 MG ----- 02 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

LINFOGRANULOMA VENÉREO:

USO INTERNO:

1) AZITROMICINA 500 MG ----- XX CPS
TOMAR XX COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

* 5 – 10 MG/KG/DIA

SÍFILIS:

1ª, 2ª E LATENTE PRECOCE (< 1 ANO DE DOENÇA)

USO INTRAMUSCULAR:

1) PENICILINA G BENZATINA (1,2 MILHÕES UI) ----- 02 AMP
APLICAR 1,2 MILHÕES UI, EM CADA NÁDEGA, EM DOSE ÚNICA

3ª E LATENTE TARDIA (> 1 ANO DE DOENÇA)

USO INTRAMUSCULAR:

1) PENICILINA G BENZATINA (1,2 MILHÕES UI) ----- 06 AMP
APLICAR 1,2 MILHÕES UI, EM CADA NÁDEGA, 1 VEZ POR SEMANA, DURANTE 3 SEMANAS

CONTROLE COM VDRL A CADA 3 MESES

TRICOMONÍASE:

USO INTERNO:

1) METRONIDAZOL 400 MG ----- 05 CPS
TOMAR 05 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

ENXAQUECA:

USO INTERNO:

1) NARAMIG® 2,5 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, PODENDO-SE REPETIR A DOSE 4 HORAS APÓS PRIMEIRO COMPRIMIDO, CASO A DOR DE CABEÇA NÃO PASSE

2) DEOCIL® 10 MG ----- 01 CX
COLOCAR 01 COMPRIMIDO SUBLINGUAL, ATÉ DE 6/6 H, SE DOR DE CABEÇA FORTE, POR ATÉ 5 DIAS

3) VONAU® 8 MG SUBLINGUAL ----- 01 CX
COLOCAR 01 COMPRIMIDO SUBLINGUAL ATÉ DE 8/8 H, SE ENJÔO OU VÔMITO

Profilaxia

4) CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 10MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE

OU

4) TOPIRAMATO 25 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA NOITE

5) MAGNESIO DIMALATO 300MG ----- 30 CP
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ

ERISPELA / FURUNCULOSE / CELULITE NÃO COMPLICADA:

USO INTERNO:

1) CEFALEXINA 500 MG ----- 40 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6H POR 10 DIAS

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($TAX \geq 37,8^{\circ} C$)

USO TÓPICO:

3) NEOMICINA POMADA (20G) ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE A ÁREA 3 VEZES AO DIA

4) COMPRESSA DE ÁGUA MORNIA SOBRE O LOCAL, DURANTE 15 MINUTOS, 3 A 6 VEZES AO DIA

- REPOUSO NO LEITO COM O MEMBRO ELEVADO

ERISPELA / FURUNCULOSE / CELULITE COMPLICADA:

USO INTERNO:

1) LEVOFLOXACINO 750 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 05 DIAS

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($TAX \geq 37,8^{\circ} C$)

USO TÓPICO:

3) NEOMICINA POMADA (20G) ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE A ÁREA 3 VEZES AO DIA

4) COMPRESSA DE ÁGUA MORNIA SOBRE O LOCAL, DURANTE 15 MINUTOS, 3 A 6 VEZES AO DIA

- REPOUSO NO LEITO COM O MEMBRO ELEVADO

ECZEMA DE COTATO

USO TÓPICO

1) BETAMETASONA 0,1% ----- 01 BISNAGA
APLICAR UMA FINA CAMADA SOBRE A ÁREA AFETADA DUAS VEZES AO DIA

OU

CLOBETAZOL CREME 0,5 mg/g ----- 01 BISNAGA
APLICAR UMA FINA CAMADA SOBRE A ÁREA AFETADA DUAS VEZES AO DIA

USO ORAL

2) LORATADINA 25 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, NO MESMO HORÁRIO, POR 05 DIAS
APÓS ESTE PERÍODO, TOMAR 01 COMPRIMIDO SE COCEIRA, PODENDO
REPETIR A DOSE 24/24H SE NECESSÁRIO

FERIDAS

USO TÓPICO

1) RIFOCINA SPRAY ----- 01 FRASCO
APLICAR NA LESÃO DE 12/12 HORAS DURANTE 07 DIAS.

OU

1) NEOMICINA POMADA ----- 01 TUBO
APLICAR NA LESÃO, DE 8/8 HORAS, POR 7 DIAS.

OU

1) TROK POMADA ----- 01 TUBO
APLICAR NO LOCAL DA LESÃO, DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS.

FISTULA ANAL

USO INTERNO:

1) CLAVULIN 500/125MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS, POR 7 DIAS.

OU

CIPROFLOXACINO 500MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS.

+

METRONIDAZOL 400MG ----- 01 CAIXA
TOMAR COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS POR 7 DIAS.

2) LISADOR DIP 1G ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 6/6 HORAS, SE DOR OU $T \geq 37,8^{\circ}\text{C}$.

3) IBUPROFENO 400MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 6/6 HORAS POR 3 DIAS.

4) METAMUCIL ----- 01 CAIXA
DILUIR 01 SACHÊ EM 200ML DE ÁGUA E TOMAR A SOLUÇÃO, VIA ORAL, 01 VEZ AO DIA.

USO TÓPICO:

HIDROCORTISONA 10MG/G POMADA ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE A LESÃO, DURANTE 7 DIAS

CUIDADOS E ORIENTAÇÕES:

- CURATIVO ATÉ 6 VEZES AO DIA: LIMPEZA EXAUSTIVA COM ÁGUA CORRENTE, COBRIR COM ANALGÉSICO TÓPICO (HIDROCORTISONA/LIDOCAÍNA E GAZE).
- BANHO DE ASSENTO COM ÁGUA MORNAPÓS AS EVACUAÇÕES PELOS PRIMEIROS 7 DIAS APÓS A DRENAGEM.
- DIETA ORAL LAXATIVA

FURUNCULOSE RECORRENTE (PROFILAXIA):

USO INTERNO:

1) DOXICICLINA 100 MG ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 7 DIAS

2) RIFAMPICINA 300 MG ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 7 DIAS

USO TÓPICO

3) MUPIROCINA POMADA ----- 01 TUBO
APLICAR NAS NARINAS E ABAIXO DAS UNHAS POR 7 DIAS

4) CLOREXIDINA 4% SABONETE ----- 01 BARRA
BANHO DIÁRIO COM SABONETE POR 7 DIAS

ESCABIOSE (SARNA):

USO INTERNO:

1) IVERMECTINA 6 MG ----- XX CPS

TOMAR X COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA, REPETIR A DOSE EM 7 A 14 DIAS

* 200 MCG/KG/DIA

2) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, CASO HAJA
COCEIRA, POR ATÉ 5 DIAS

USO TÓPICO:

3) PERMETRINA 5% LOÇÃO OU CREME ----- 01 TUBO
APLICAR NO CORPO TODO DURANTE 1 A 3 NOITES SEGUIDAS E LAVAR O
CORPO NA MANHÃ SEGUINTE. REPETIR ESQUEMA EM 7 DIAS.

ORIENTAÇÕES:

- TROCAR ROUPAS DE CAMA DIARIAMENTE DURANTE OS 3 PRIMEIROS DIAS DE TRATAMENTO
- MANTER AS UNHAS CURTAS
- TRATAR CONTACTANTES HABITANTES DE MESMO DOMICILIO

GASTRITE CRÔNICA E DRGE:

USO INTERNO:

1) OMEPRAZOL 20 MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ EM JEJUM, 30 MINUTOS ANTES DA
REFEIÇÃO, USO CONTÍNUO

2) DOMPERIDONA 10 MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ANTES DO CAFÉ, ALMOÇO E/OU JANTAR, POR 30 DIAS

GASTROENTERITES BACTERIANAS:

USO INTERNO:

1) CIPROFLOXACINO 500 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 5 DIAS

E/OU

1) METRONIDAZOL 400 MG ----- 21 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H POR 7 DIAS

2) SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL (SACHÊ) ----- 06 SACHÊS
DISSOLVER 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA E INGERIR AO LONGO DO DIA,
PRINCIPALMENTE, APÓS CADA EVACUAÇÃO OU VÔMITO

4) TIORFAN® 100 MG ----- 15 CPS

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H ANTES DAS REFEIÇÕES POR ATÉ 5 DIAS E PARAR SEU USO ASSIM QUE CESSAR A DIARREIA

5) BUSCOPAM COMPOSTO® ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR DE BARRIGA, POR ATÉ 05 DIAS

6) VONAU® 8 MG SUBLINGUAL ----- 01 CX
COLOCAR 01 COMPRIMIDO SUBLINGUAL ATÉ DE 8/8 H, SE ENJÔO OU VÔMITO, POR ATÉ 05 DIAS

7) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

8) OMEPRAZOL 20 MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ EM JEJUM, 30 MINUTOS ANTES DA REFEIÇÃO, USO CONTÍNUO

ORIENTAÇÕES:

- EVITAR DERIVADOS DE LACTOSE, ALIMENTOS LAXATIVOS, ALIMENTOS RICOS EM FIBRAS OU GORDUROSOS

- COMPLEMENTAR COM LÍQUIDOS CASEIROS (ÁGUA, SUCO, CHÁ E OUTROS)

GASTROENTERITES VIRAIS / ALIMENTÍCIAS:

USO INTERNO:

1) SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL (SACHÊ) ----- 06 SACHÊS
DISSOLVER 01 SACHÊ EM 1 LITRO DE ÁGUA E INGERIR AO LONGO DO DIA, PRINCIPALMENTE, APÓS CADA EVACUAÇÃO OU VÔMITO

2) FLORATIL® 200 MG ----- 06 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 3 DIAS

OU

2) TIOFAN® 100 MG ----- 15 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H ANTES DAS REFEIÇÕES POR ATÉ 5 DIAS E PARAR SEU USO ASSIM QUE CESSAR A DIARREIA

3) BUSCOPAM COMPOSTO® ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR DE BARRIGA, POR ATÉ 05 DIAS

4) VONAU® 8 MG SUBLINGUAL ----- 01 CX
COLOCAR 01 COMPRIMIDO SUBLINGUAL ATÉ DE 8/8 H, SE ENJÔO OU VÔMITO, POR ATÉ 05 DIAS

5) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

ORIENTAÇÕES:

- EVITAR DERIVADOS DE LACTOSE, ALIMENTOS LAXATIVOS, ALIMENTOS RICOS EM FIBRAS OU GORDUROSOS

- COMPLEMENTAR COM LÍQUIDOS CASEIROS (ÁGUA, SUCO, CHÁ E OUTROS)

GOTA:

USO INTERNO:

1) COLCHICINA 0,5 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H, PODENDO SER RETIRADA EM 2 DIAS APÓS O DESAPARECIMENTO DOS SINTOMAS

2) CETOPROFENO 150 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR ATÉ 5 DIAS

3) ALOPURINOL 100 MG ----- CONT
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA. APÓS 2 SEMANAS, TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H E APÓS 2 SEMANAS, TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H

4) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

GRIPE (H1N1 – INFLUENZA)

USO INTERNO:

1) OSELTAMIVIR 75 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA 12 HORAS POR 5 DIAS

2) LORATADINA 10MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA POR 5 DIAS

3) IBUPROFENO 600 MG ----- 1 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA 8 HORAS SE DOR OU FEBRE

HIPERCERATOSE PLANTAR

USO TÓPICO:

DIPROSALIC POMADA-----01TUBO
APLICAR 02 VEZES AO DIA ATÉ MELHORA DOS SINTOMAS

HEMORRAGIA:

USO INTERNO:

1) ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG ----- 01 CX
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 6/6 HORAS POR 4 DIAS

HEMORROIDAS:

USO INTERNO:

1) MUVINLAX® (SACHÊ 14 G) ----- 01 CX
DILUIR 01 SACHÊ EM 1 COPO DE ÁGUA, CHÁ OU SUCO DE 125 ML E INGERIR 01
A 02 SACHÊS PELA MANHÃ (RESPOSTA RÁPIDA = 5 SACHÊS / NOITE)

2) LACTULOSE (667 MG/ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 15 ML DE 12/12 H (MÁXIMO 6 VEZES AO DIA)

3) CETOPROFENO 150 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR ATÉ 5 DIAS

SE TROMBOSE ASSOCIAR:

4) DAFLON® 450 + 50 MG ----- 42 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H POR 14 DIAS

USO RETAL:

5) PROCTYL® POMADA RETAL ----- 01 TUBO
APLICAR NA ÁREA AFETADA, MASSAGEANDO O LOCAL, OU COM BICO DOSADOR
APÓS EVACUAÇÃO PRÉVIA, 3 VEZES AO DIA, ATÉ MELHORA DOS SINTOMAS.
CONTINUAR TRATAMENTO COM UMA APLICAÇÃO AO DIA.

ORIENTAÇÕES

- SE NECESSÁRIO, USAR LAXATIVOS PARA EVITAR CONSTIPAÇÃO E O ENDURECIMENTO DAS FEZES
- BANHO DE ASSENTO COM ÁGUA Morna DE 2 A 3 VEZES AO DIA
- DIETA ORAL LAXATIVA, RICA EM FIBRAS
- AUMENTAR INGESTA HÍDRICA
- EVITAR ESFORÇO EXCESSIVO AO DEFECAR
- EVITAR ALIMENTOS CONDIMENTADOS, PIMENTA, CHOCOLATE E FRITURAS
- FAZER LIMPEZA APÓS DEFECACÃO COM ÁGUA E SABONETE NEUTRO, EVITAR PAPEL HIGIÊNICO.

HERPES ORAL / GENITAL:

USO INTERNO:

1) ACICLOVIR 400 MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H POR 10 DIAS NA PRIMEIRA INFECÇÃO E POR

5 DIAS NA RECORRÊNCIA

2) IBUPROFENO 600 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ATÉ DE 8/8 H, CASO HAJA DOR, POR ATÉ 5 DIAS

HERPES RECORRENTE

1) ACICLOVIR 400 MG ----- 30 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDO PELA MANHÃ E 02 PELA NOITE POR 5 DIAS NA RECORRÊNCIA

USO TÓPICO:

5) PENCICLOVIR CREME A 1% ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE AS LESÕES DE 2/2 H POR 5 DIAS

HERPES ZOSTER:

USO INTERNO:

1) ACICLOVIR 400 MG ----- 100 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 4/4 H, PULANDO A DOSE DA NOITE (5 VEZES AO DIA), POR 10 DIAS

2) DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG ----- 15 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ATÉ DE 8/8 H, CASO HAJA DOR, POR ATÉ 5 DIAS

OU

2) PARACETAMOL + CODEÍNA 500 + 30 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL A CADA 6 HORAS SE DOR

CUIDADOS GERAIS:

REPOUSO E HIDRATAÇÃO ORAL VIGOROSA

SE INFECÇÃO BACTERIANA:

3) CEFALEXINA 500 MG ----- 40 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H POR 10 DIAS.

NEURALGIA POS HERPETICA

CARBAMAZEPINA 200MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS ATÉ O ALÍVIO DA DOR

CREME DE CAPSAICINA 0,025 ----- 01 TUBO
APLICAR NA REGIÃO AFETADA 2 A 3 VEZES AO DIA CONFORME A DOR

HORDÉOLO (TERÇOL)

USO OFTALMOLÓGICO:

1) OFLOXACINO COLÍRIO 0,3% ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 A 02 GOTAS NO OLHO ACOMETIDO DE 6/6 HORAS POR 7 DIAS

2) PREDNISOLONA COLÍRIO 1% ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 GOTA NO OLHO ACOMETIDO DE 6/6 HORAS POR ATÉ 5 DIAS

OU

3) DEXAMETASONA COLÍRIO 0,1% ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 GOTA NO OLHO ACOMETIDO DE 6/6 HORAS POR ATÉ 5 DIAS

- COMPRESSA DE ÁGUA Morna SOBRE O LOCAL, DURANTE 15 MINUTOS, 4 VEZES AO DIA

- LIMPEZA REGULAR COM SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%

H.PYLORI

USO INTERNO:

PYLORIPAC ----- 01CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE LANSOPRAZOL 30MG, 01 COMPRIMIDO DE CLARITROMICINA 500MG, 02 CAPSULAS DE AMOXICILINA 500MG, VIA ORAL DE 12/12 H POR 07 DIAS.

MEDICAMENTOS INDIVIDUAIS:

1º LINHA

USO INTERNO:

1) OMEPRAZOL 20 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 14 DIAS

2) AMOXICILINA 500 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 14 DIAS

3) CLARITROMICINA 500 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 14 DIAS

2º LINHA

USO INTERNO:

1) OMEPRAZOL 20 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 14 DIAS

2) AMOXICILINA 500 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 14 DIAS

3) LEVOFLOXACINO 500 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 14 DIAS

IMPETIGO:

USO INTERNO:

1) CEFALEXINA 500 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H POR 7 DIAS, SE MÚLTIPLAS LESÕES

USO TÓPICO:

2) MUPIROCINA 2% POMADA ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE AS LESÕES, 2 VEZES AO DIA, ATÉ MELHORA DAS MESMAS

3) LIMPEZA DA REGIÃO COM SABONETE ANTISSEPTICO (TRICLOSAN, CLOREXIDINA OU IODOPOVIDONA)

INCONTINÊNCIA URINÁRIA / BEXIGA HIPERATIVA

USO INTERNO

1) SUCCINATO DE SOLIFENACINA 5 MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA.

SE BEM TOLERADO AUMENTAR A DOSE PARA 10 MG POR DIA

OU

1) OXIBUTINA 5 MG ----- 60 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ E OUTRO PELA TARDE

INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA:

USO INTERNO:

1) PENTOXIFILINA 400 MG ----- 60 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H, ATÉ DE 8/8 H, EM USO CONTÍNUO

OU

1) CASTANHA DA ÍNDIA 100 MG ----- 60 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H, ATÉ DE 8/8 H, EM USO CONTÍNUO

OU

1) DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50 MG ----- 60 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHA E OUTRO PELA TARDE

USO TÓPICO

2) DERSANI ® OU DERMAEX ® ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE A PELE 2 VEZES AO DIA

ORIENTAÇÕES:

- ELEVÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES DURANTE 30 MINUTOS POR 3 A 4 VEZES AO DIA
- CAMINHADA DIÁRIA E SIMPLES EXERCÍCIOS DE FLEXÃO DE TORNOZELO ENQUANTO SENTADO
- EVITAR FICAR EM PÉ OU SENTADOS POR MUITO TEMPO
- LIMPEZA DA PELE: LAVAR SUAVEMENTE AS PERNAS DIARIAMENTE COM DETERGENTES NÃO SABÃO (DOVE, CETAPHIL, CARESS, OLAY OU NEUTROGENA) PARA REMOVER BACTERIAS E CROSTAS
- APLICAR EMOLIENTES IMEDIATAMENTE APÓS TOMAR BANHO (QUANDO A PELE ESTÁ ÚMIDA) – EXEMPLOS: DERSANI ® OU DERMAEX ®

INTOLERÂNCIA A LACTOSE

USO INTERNO

PARA MANIPULAÇÃO – 60 CÁPSULAS

1) LACTASE 400MG ----- qsp ----- 1 CÁPSULA

OU

1) LACTOSIL 10.000 FCC ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO 30 MINUTOS ANTES DE INGERIR CONTEÚDO LÁCTEO

ITU (CISTITE NÃO COMPLICADA) / PROSTATITE *:

USO INTERNO:

1) CIPROFLOXACINO 250 MG ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 3 - 7 DIAS (HOMEM)

OU

1) CIPROFLOXACINO 500 MG ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 3 - 7 DIAS (HOMEM) *

OU

1) SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM (800 + 160 MG) ----- 06 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 3 DIAS – 7 DIAS (HOMEM)

OU

1) NITROFURANTOÍNA 100 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H POR 7 DIAS

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

3) PYRIDIUM FENAZOPIRIDINA 200MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 HORAS POR CINCO DIAS

ORIENTAÇÕES:

- AUMENTAR INGESTA HÍDRICA (MÍNIMO DE 2 LITROS DE ÁGUA POR DIA)
- URINAR SEMPRE QUE HOUVER VONTADE E ANTES / APÓS RELAÇÃO SEXUAL
- EVITAR USO DE DUCHAS VAGINAIS E CUIDADO COM HIGIENE ANAL E VAGINAL

* BACTERIÚRIA ASSINTOMÁTICA (> 100.000 UFC/ML) - INDICAÇÃO DE TTO:

- TRANSPLANTADOS;
- NEUTROPÊNICOS;
- GESTANTES;
- PRÉ-OPERATÓRIO DE CIRURGIAS UROLÓGICAS;
- PRÉ-OPERATÓRIO DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESES.

ITU COMPLICADA (PIELONEFRITE):

USO INTERNO:

1) CIPROFLOXACINO 500 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 14 DIAS

OU

1) LEVOFLOXACINO 750 MG ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 14 DIAS

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

ORIENTAÇÕES:

- AUMENTAR INGESTA HÍDRICA (MÍNIMO DE 2 LITROS DE ÁGUA POR DIA)
- URINAR SEMPRE QUE HOUVER VONTADE E ANTES / APÓS RELAÇÃO SEXUAL
- EVITAR USO DE DUCHAS VAGINAIS E CUIDADO COM HIGIENE ANAL E VAGINAL

ITU EM GESTANTE:

USO INTERNO:

1) CEFALEXINA 500 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H POR 7 DIAS.

2) PARACETAMOL 500MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX > 37,8° C)

ORIENTAÇÕES:

- AUMENTAR INGESTA HÍDRICA (MÍNIMO DE 2 LITROS DE ÁGUA POR DIA)
- URINAR SEMPRE QUE HOUVER VONTADE E ANTES / APÓS RELAÇÃO SEXUAL
- EVITAR USO DE DUCHAS VAGINAIS E CUIDADO COM HIGIENE ANAL E VAGINAL

ITU DE REPETIÇÃO (PROFILAXIA):

USO INTERNO:

1) NITROFURANTOÍNA 100 MG ----- 72 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE ANTES DE DEITAR, 3 VEZES POR SEMANA,
DURANTE 6 MESES

OU

1) SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM (800 + 160 MG) ----- 06 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE ANTES DE DEITAR, 3 VEZES POR SEMANA,
DURANTE 6 MESES

ORIENTAÇÕES:

- AUMENTAR INGESTA HÍDRICA (MÍNIMO DE 2 LITROS DE ÁGUA POR DIA)
- URINAR SEMPRE QUE HOUVER VONTADE E ANTES / APÓS RELAÇÃO SEXUAL
- EVITAR USO DE DUCHAS VAGINAIS E CUIDADO COM HIGIENE ANAL E VAGINAL

LABIRINTITE / SÍNDROME DE MENIERE / TONTURA / VERTIGEM:

USO INTERNO:

1) GINKGO BILOBA 40 MG ----- 90 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ATÉ DE 8/8 HORAS

OU

1) BETAISTINA 24 MG ----- 60 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ OU DE 12/12 HORAS, APÓS ONGESTÃO
DE ALIMENTOS

2) CINARIZINA 75 MG ----- 90 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ATE DE 8/8 HORAS, EM CASO DE CRISE INTENSA

3) DRAMIN 50 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO ATE DE 4/4 HORAS, CASO ENJOO/VOMITOS

LARVA MIGRANS (BICHO GEOGRÁFICO)

1) IVERMECTINA 6MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 3 COMPRIMIDOS, VIA ORAL, DOSE ÚNICA.

2) POLARAMINE 2MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8 HORAS, POR 5 DIAS.

LOMBOCIATALGIA / LOMBALGIA / ARTROSE:

USO INTERNO:

1) CICLOBENZAPRINA 10 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE

2) IBUPROFENO 600 MG ----- 15 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H POR ATÉ 5 DIAS

3) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

PARA ARTROSE:

4) ARTROLIVE ® ----- 90 CPS
TOMAR 01 CÁPSULA DE 8/8 H EM USO CONTÍNUO

USO TÓPICO:

5) ACHEFLAN ® ----- 01 TUBO
APLICAR UMA FINA CAMADA DE CREME SOBRE A PELE ÍNTEGRA (SEM FERIDAS),
NO LOCAL DA DOR DE 8/8 H DURANTE 7 DIAS (MÁXIMO DE 28 DIAS)

ORIENTAÇÕES:

- PERDA DE PESO PARA PACIENTES COM SOBREPESO E OBESIDADE
- CORREÇÃO POSTURAL
- PILATES PARA FORTALECIMENTO DA MUSCULATURA E ALONGAMENTO

LOMBALGIA SEM AINES

USO INTERNO:

1) TYLENOL 750MG ----- 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 06/06 HORAS, SE DOR OU FEBRE.

2) MUSCULARE 10MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, A NOITE POR 05 DIAS.

3) NEVRIX ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 08/08H POR 05 DIAS.

CUIDADOS GERAIS:

– REPOUSO E HIDRATAÇÃO ORAL VIGOROSA

LUBRIFICANTE OCULAR

USO OFTALMOLÓGICO:

1) OPTIVE UD COLÍRIO ----- 01
FRASCO
APLICAR 02 GOTAS EM OLHO AFETADO QUANTAS VEZES NECESSÁRIO.

OU

LACRIFILM ----- 01 FRASCO
PINGAR 02 GOTAS EM OLHO AFETADO DE 6/6H POR 07 DIAS

OU

CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA 0,5% ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 GOTA DE 6/6 HORAS

NAFAZOLINA + SULFATO DE ZINCO OFTALMOLÓGICO ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 GOTAS NOS OLHOS AFETADOS ATÉ QUATRO VEZES AO DIA

NÁUSEAS

USO INTERNO:

1) DRAMIN B6, ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL 08/08 HORAS SE NÁUSEAS OU VÔMITOS

VONAU 8MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 8/8H SE NÁUSEAS E VÔMITOS.

2) BUSCOPAM COMPOSTO ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL 8/8H, SE DOR ABDOMINAL.

3) ADIPEPT 40MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, PELA MANHÃ EM JEJUM

NEFROLITÍASE

USO INTERNO:

- 1) LEVOFLOXACINO 750MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA
- 2) CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DUAS VEZES AO DIA
- 3) PARACETAMOL + CODEÍNA 500 + 30 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA 6 HORAS SE DOR
- 4) TROMETAMOL CETOROLACO 10 MG ----- 01 CAIXA
DEIXAR 01 COMPRIMIDO EMBAIXO DA LINGUA DE 6/6 HORAS POR 3 DIAS
- 5) MAXSULID 400MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DUAS VEZES AO DIA
- 6) PYRIDIUM FENAZOPIRIDINA 200MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 HORAS POR CINCO DIAS
- 7) PANTOPRAZOL SÓDICO 40MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ EM JEJUM
- 8) DEXAMETASONA 4MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO UMA VEZ AO DIA

NO PRONTO SOCORRO:

- 1) BUSCOPAN COMPOSTO 01 AMPOLA EV + TRAMADOL 100MG EV +
BROMOPRIDA 10MG EV
CORRER EM SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML

ONICOMICOSE:**USO INTERNO:**

- 1) TERBINAFINA 250 MG ----- 42/84 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 6 SEMANAS (ACOMETE APENAS AS MÃOS) OU POR 12 SEMANAS (ACOMETE OS PÉS)

OU

- 1) FLUCONAZOL 150 MG ----- 24/36 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO, 1 VEZ POR SEMANA, DURANTE 6 MESES (ACOMETE APENAS AS MÃOS) OU POR 9 MESES (ACOMETE OS PÉS)

USO TÓPICO:

- 2) UREIA 30 A 40% CREME (MANIPULADO) ----- 01 TUBO
APLICAR NAS UNHAS E OCLUI-LAS, 1 VEZ POR SEMANA, DURANTE 6 MESES (ACOMETE APENAS AS MÃOS) OU POR 9 MESES (ACOMETE OS PÉS)
- 3) AMOROLFINA 5% EM ESMALTE ----- 01 FRASCO
APLICAR NAS UNHAS 1 A 2 VEZES POR SEMANA (1 A 2 UNHAS COM MENOS DE

50% DA LÂMINA UNGUEAL COMPROMETIDA)

OU

3) CICLOPIROX OLAMINA 8% EM ESMALTE ----- 01 FRASCO
APLICAR NAS UNHAS 3 VEZES POR SEMANA (1 A 2 UNHAS COM MENOS DE 50%
DA LÂMINA UNGUEAL COMPROMETIDA)

OU

3) NITRATO DE OXICONAZOL 10MG/ML ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 CAMADA SOB A UNHA PELA MANHÃ, COM O AUXÍLIO DE COTONETE
OU UM CHUMAÇO DE ALGODÃO, PELA MANHÃ, APÓS LAVAR COM ÁGUA E
SABÃO DURANTE O BANHO, POR 01 A 02 SEMANAS

ORIENTAÇÕES:

- EVITAR UMIDADE NOS DEDOS DAS UNHAS ACOMETIDAS
- LIXAR PARA DESBASTAR AS UNHAS E DESCARTAR A LIXA APÓS USO
- UTILIZAR PRODUTOS FUNGICIDAS NOS SAPATOS E PISO DO BANHEIRO (EX.:
LYSOFORM ®)
- SEPARAR OS OBJETOS DE LIMPEZA PARA CADA UNHA ACOMETIDA E NÃO
UTILIZAR NAS UNHAS SAUDÁVEIS

OSTEOPOROSE:

USO INTERNO:

1) ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG ----- 04 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO EM JEJUM, 1 VEZ POR SEMANA, NÃO INGERINDO COM
ALIMENTOS OU OUTROS MEDICAMENTOS E NÃO DEITAR POR NO MÍNIMO 30
MINUTOS

2) PROSSO ® 250 MG + 2,5 MCG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA

ORIENTAÇÕES:

- DIETA COM INGESTÃO CALÓRICA APROPRIADA E RICA EM PROTEÍNAS E
CÁLCIO, EVITANDO SOBREPESO OU DESNUTRIÇÃO
- PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO DE IMPACTO E PREVENÇÃO DE QUEDAS
- INTERRUPÇÃO DO TABAGISMO E MODERAR ETILISMO

OTITE MÉDIA AGUDA CRIANÇA

USO INTERNO:

1) DAPIRONA 500 MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 11 GOTAS A CADA 6 HORAS SE DOR OU FEBRE

2) AMOXICILINA 250 MG/5ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 10 ML A CADA 12 HORAS POR 10 DIAS

OTITE EXTERNA AGUDA:

USO INTERNO:

1) IBUPROFENO 600 MG ----- 15 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H POR ATÉ 5 DIAS

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

USO OTOLÓGICO:

3) OTO-BETNOVATE ® ----- 01 FRASCO
APLICAR 03 GOTAS NO OUVIDO ACOMETIDO, DE 6/6 H, DURANTE 7 DIAS

OU

3) OTOCIRIAX ® ----- 01 FRASCO
APLICAR 03 GOTAS NO OUVIDO ACOMETIDO, DE 12/12 H, DURANTE 7 DIAS

4) CLOTRIMAZOL 1% SOLUÇÃO TÓPICA ----- 01 FRASCO
APLICAR 4 GOTAS NO OUVIDO ACOMETIDO, DE 6/6 H, POR 7 DIAS SE INFECÇÃO FÚNGICA

PÉ DIABÉTICO:

USO INTERNO:

1) CIPROFLOXACINO 500 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 14 DIAS

2) CLINDAMICINA 300 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H POR 10 DIAS

3) IBUPROFENO 600 MG ----- 15 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H POR ATÉ 5 DIAS

4) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

- ORIENTADO A FAZER ACOMPANHAMENTO NA UBS

ÚLCERAS

2) DERSANI HIDROGEL ----- 01 FRASCO.

APLICAR 02 VEZES AO DIA NO FERIMENTO.

3) COLAGENASE POMADA ----- 01 TUBO
APLICAR NO LOCAL DA LESÃO, APÓS LIMPEZA LOCAL, DE 12/12H, ATÉ 14 DIAS.

PEDICULOSE (PIOLHO):

USO INTERNO:

1) IVERMECTINA 6 MG ----- XX CPS
TOMAR X COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA, REPETIR A DOSE EM 7 A 10 DIAS

* 200 MCG/KG/DIA

2) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, CASO HAJA
COCEIRA POR ATÉ 5 DIAS

USO TÓPICO:

3) PERMETRINA 1% SHAMPOO ----- 01 TUBO
APLICAR NO COURO CABELUDO, DEIXAR AGIR POR 10 MINUTOS E ENXAGUAR.
UTILIZAR 3 A 5 VEZES POR SEMANA

OU

4) PERMETRINA 5% LOÇÃO ----- 01 TUBO
APLICAR NO COURO CABELUDO A NOITE POR 3 DIAS SEGUIDOS E LAVAR NO
DIA SEGUINTE. REPETIR O TRATAMENTO APÓS 7 DIAS

5) SOLUÇÃO COM ÁCIDO ACÉTICO (10ML) + ÁGUA FRIA (10ML) -----
APLICAR NOS FIOS ANTES DE PASSAR O PENTE FINO PARA AUXILIAR NA
REMOÇÃO DAS LÊNDEAS

ORIENTAÇÕES

- MUITO IMPORTANTE A RETIRADA MANUAL DAS LÊNDEAS (HIGIENE E PENTE FINO)
- TOALHAS, PENTES E ESCOVAS DE CABELO DEVEM SER DESINFETADOS COM ÁLCOOL E LIMPOS COM ÁGUA FERVENDO
- TROCA DE ROUPAS DE CAMA FREQUENTE, SE ACOMETER O CORPO

PEP:

USO INTERNO:

1) AZITROMICINA 500 MG ----- 02 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

2) METRONIDAZOL 400 MG ----- 05 CPS
TOMAR 05 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

3) LEVONORGESTREL 0,75 MG ----- 02 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA

4) BIOVIR® (AZT 300MG + 3TC 150 MG) ----- 56 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 28 DIAS

OU

4) DUPLIVIR® (AZT 300MG + 3TC 300 MG) ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 28 DIAS

5) KALETRA® (LPV/r 200 + 50 MG) ----- 112 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 12/12 HORAS POR 28 DIAS

OU

5) REYATAZ® (ATAZANAVIR 300 MG) ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 28 DIAS

+

6) RITONAVIR 100 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 28 DIAS

USO INTRAMUSCULAR:

6) PENICILINA G BENZATINA (1,2 MILHÕES UI) ----- 02 AMP
APLICAR 1,2 MILHÕES UI, EM CADA NÁDEGA, EM DOSE ÚNICA

7) VACINA CONTRA HEPATITE B -----
INICIAR OU COMPLETAR ESQUEMA, CONFORME SITUAÇÃO VACINAL

8) IgHAHB -----
FAZER 0,06 ML/KG EM DOSE ÚNICA, ATÉ 14 DIAS APÓS EXPOSIÇÃO

- ORIENTADA A FAZER ACOMPANHAMENTO EM UBS

PNEUMONIA COMUNITÁRIA (< 50 ANOS / SEM COMORBIDADES / SEM FR PARA PNEUMOCOCO RESISTENTE *):

USO INTERNO:

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO (875 + 125 MG) ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 7 DIAS

OU

1) CLARITROMICINA 500 MG ----- 14 CPS

TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 7 DIAS

2) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

3)

4) ACETILCISTEÍNA (40 MG/ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 10 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECRETIVA

OU

4) DEXCLORFENIRAMINA (2MG/5ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 5 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECA

PNEUMONIA COMUNITÁRIA (> 50 ANOS / COMORBIDADES / FR PARA PNEU-MOCOCO RESISTENTE * / USO ATB ÚLTIMOS 3 MESES):

USO INTERNO:

1) LEVOFLOXACINO 750 MG ----- 07 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 07 DIAS.

OU

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO (500 + 125 MG) ----- 56 CPS
TOMAR 04 COMPRIMIDOS DE 12/12H POR 07 DIAS

2) CLARITROMICINA 500 MG ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 7 DIAS

3) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

4) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

5) ACETILCISTEÍNA (40 MG/ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 10 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECRETIVA

OU

5) DEXCLORFENIRAMINA (2MG/5ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 5 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECA

6) OMEPRAZOL 20MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ EM JEJUM, 30 MINUTOS ANTES DA REFEIÇÃO, USO CONTÍNUO

* FR PARA PNEUMOCOCO RESISTENTE A PENICILINA:

- > 65 ANOS
- USO DE BETA-LACTÂMICO NOS ÚLTIMOS 3 MESES
- ALCOOLISMO

- IMUNOSUPRESSÃO
- MÚLTIPLAS COMORBIDADES

RINITE ALÉRGICA

USO INTERNO:

1) CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 60 MCG (ALLEGRA)----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS, POR 05 DIAS

OU

1) LORATADINA 10 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 05 DIAS

USO INTRANASAL:

1) CICLESONIDA 50 MCG/DOSE ----- 01 FRASCO
APLICAR 02 SPRAYS EM CADA NARINA 01 VEZ AO DIA, USO CONTÍNUO

OU

1) BUDESONIDA (64 OU 100 MCG/DOSE) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, 2 VEZES AO DIA, USO CONTÍNUO

TRATAMENTO REFRATÁRIO

- ASSOCIAR AO ANTIHISTAMINICO E O SPRAY NASAL UM CORTICOIDE SISTÊMICO

1) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

POLIVITAMINICO:

USO INTERNO:

1) COMPLEXO B (EMS) ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO APÓS ALMOÇO DIARIAMENTE

OU

1) CENTRUM ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA JUNTO COM UMA DAS REFEIÇÕES

OU

1) COGMAX® ----- 60 CPS
TOMAR 01 A 02 CAPSULAS AO DIA JUNTO COM UMA DAS REFEIÇÕES

PROSTATITE

USO INTERNO:

1) LEVOFLOXACINO 500 MG -----
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA ATÉ O RETORNO DA CONSULTA

2) IBUPROFENO 600 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA 8 HORAS SE DOR OU FEBRE

PEDIR: HEMOGRAMA – URINA 1 – UROCULTURA – PSA
SE LEUCOCITOSE E BACTERIURIA, PIURIA E PSA AUMENTADO, CORROBORA
AINDA MAIS PARA O DX

PTIRIASE VERSICOLOR

USO TÓPICO

1) CETOCONAZOL 20 MG/G ----- 01 TUBO
APLICAR NA REGIÃO AFETADA 01 VEZ AO DIA APÓS LAVAR E SECAR POR 4
SEMANAS

2) SULFETO DE SELÊNIO – SHAMPOO 2,5% ----- 01 FRASCO
APLIQUE NO COURO CABELUDO E NAS REGIÕES AFETADAS 01 VEZ AO DIA,
DEIXANDO AGIR POR 15 MINUTOS, POR 4 SEMANAS

**RETORNO EM 1 MÊS
SE PERSISTIR**

USO INTERNO

1) FLUCONAZOL 150MG ----- 04 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA SEMANA POR 04 SEMANAS

**PARA ALÉRGICOS À FAMÍLIA “ZOL”
USAR TERBINAFINA**

1) TERBINAFINA 250 MG ----- 42 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 6 SEMANAS

REFLUXO GASTROESOFÁGICO

USO INTERNO:

1) OMEPRAZOL 40MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO CEDO, EM JEJUM, POR 8 SEMANAS

2) MYLANTA PLUS XAROPE ----- 01 FRASCO
TOMAR 2 COLHERES DE CHÁ (10ML) 30 MINUTOS ANTES DAS REFEIÇÕES (CAFÉ
DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) E ANTES DE DORMIR

3) DOMPERIDONA 10 MG ----- 90 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO ANTES DAS REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E
JANTAR), POR 30 DIAS

4) VONAU FLASH 8MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 HORAS SE NÁUSEAS OU VÔMITOS

5) BUSCOPAM COMPOSTO® ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR ABDOMINAL, POR ATÉ 05 DIAS

SINDROME GRIPAL (INFLUENZA):

USO INTERNO:

1) OSELTAMIVIR 75 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 5 DIAS

2) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

3) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($TAX \geq 37,8^{\circ} C$)

4) ACETILCISTEÍNA (40 MG/ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 10 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECRETIVA

OU

4) DEXCLORFENIRAMINA (2MG/5ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 5 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECA

OU

4) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 5 DIAS

USO NASAL:

5) CLORETO DE SÓDIO (9 MG/ML) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, VÁRIAS VEZES AO DIA, PRINCIPALMENTE À NOITE

6) BUDESONIDA (50 OU 100 MCG/DOSE) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, 2 VEZES AO DIA, POR ATÉ 5 DIAS

- GUARGAREJO COM ÁGUA MORNA E SAL, 4 A 6 VEZES AO DIA, PARA ALÍVIO DA DOR DE GARGANTA

SINUSITE VIRAL:

USO INTERNO:

1) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12H POR 5 DIAS

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

USO NASAL:

3) CLORETO DE SÓDIO (9 MG/ML) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, VÁRIAS VEZES AO DIA,
PRINCIPALMENTE À NOITE

4) BUDESONIDA (50 OU 100 MCG/DOSE) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, 2 VEZES AO DIA, POR ATÉ 5
DIAS

SINUSITE BACTERIANA AGUDA (< 4 SEM) LEVE // OTITE MÉDIA AGUDA: (OTORRINOLARINGOLOGISTA)

USO INTERNO:

1) NOVAMOX (AMOXICILINA + CLAVULANATO) 875 + 125 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 10 DIAS

OU

1) AMOXICILINA 500 MG ----- 30 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H POR 10 DIAS

2) PERCOIDE 40 MG (PREDNISOLONA) ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO PELA MANHÃ DURANTE 05 DIAS

OU

2) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 5 DIAS

3) TORANTE 15 MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 6 ML DE 8/8 HORAS DURANTE 5 DIAS

OU

3) CLORIDATO AMBROXOL 6MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 6 ML DE 8/8 HORAS DURANTE 5 DIAS

4) TYLENOL SINUS ----- 24 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 6/6 HORAS SE DOR OU NARIZ ENTUPIDO

OU

4) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

USO NASAL:

4) RINOSORO JET XT (JATO CONTÍNUO 0,9%) ----- 01 FRASCO
APLICAR UM JATO LONGO (3 SEGUNDOS OU MAIS) EM CADA NARINA DE 8/8 HORAS

4) CLORETO DE SÓDIO (9 MG/ML) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, VÁRIAS VEZES AO DIA, PRINCIPALMENTE À NOITE

5) BUDESONIDA (50 MCG/DOSE) ----- 01 FRASCO
APLICAR 02 JATOS EM CADA NARINA, DE 12/12 HORAS, DURANTE 60 DIAS

USO OTOLÓGICO:

6) OTO-BETNOVATE ® ----- 01 FRASCO
APLICAR 03 GOTAS NO OUVIDO ACOMETIDO, DE 6/6 H, DURANTE 7 DIAS

* SINUSITE AGUDA - INDICAÇÕES DE ATB:

- PERSISTÊNCIA DE SINTOMAS POR MAIS DE 10 DIAS
- PIORA DOS SINTOMAS A PARTIR DO 5º DIA
- DOR FACIAL/DENTÁRIA
- SECREÇÃO NASAL PURULENTA
- PRESENÇA DE RINORRÉIA ANTERIOR E /OU POSTERIOR, OBSTRUÇÃO

SINUSITE BACTERIANA OU OTITE MÉDIA AGUDA (< 4 SEM) COMPLICADA / USO ATB ULTIMOS 3 MESES / CRÔNICA (> 12 SEM):

USO INTERNO:

1) AMOXICILINA + CLAVULANATO (875 + 125 MG) ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 14 DIAS

2) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 5 DIAS

3) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX $\geq 37,8^{\circ}$ C)

USO NASAL:

4) CLORETO DE SÓDIO (9 MG/ML) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, VÁRIAS VEZES AO DIA, PRINCIPALMENTE À NOITE

5) BUDESONIDA (50 OU 100 MCG/DOSE) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, 2 VEZES AO DIA, POR ATÉ 5 DIAS

USO OTOLÓGICO:

6) OTO-BETNOVATE® ----- 01 FRASCO
APLICAR 03 GOTAS NO OUVIDO ACOMETIDO, DE 6/6 H, DURANTE 7 DIAS

SINUSITE BACTERIANA OU OTITE MÉDIA AGUDA (< 4 SEM) RECORRENTE / RESISTENTE A B-LACTAMICOS *:

USO INTERNO:

1) CEFUROXIMA 500 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 14 DIAS

OU

1) LEVOFLOXACINO 500 MG ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 14 DIAS *

OU

1) AZITROMICINA 500 MG ----- 07 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 7 DIAS *

2) PREDNISONA 20 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 5 DIAS

3) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

USO NASAL:

4) CLORETO DE SÓDIO (9 MG/ML) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, VÁRIAS VEZES AO DIA, PRINCIPALMENTE À NOITE

5) BUDESONIDA (50 OU 100 MCG/DOSE) ----- 01 FRASCO
APLICAR 01 OU 02 INSTILAÇÕES EM CADA NARINA, 2 VEZES AO DIA, POR ATÉ 5 DIAS

USO OTOLÓGICO:

6) OTO-XILODASE® ----- 01 FRASCO
APLICAR 05 A 10 GOTAS NO OUVIDO ACOMETIDO, ATÉ DE 6/6 HORAS, ATÉ DESAPARECIMENTO DA DOR

SÍNDROME MÃO PÉ BOCA

1) NOVALGINA DIPIRONA 500MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR XX GOTAS VIA ORAL DE ATÉ 06/06H SE DOR OU TEMPERATURA IGUAL OU MAIOR QUE 37,8°C.

OU

1) DAPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR XX GOTAS VIA ORAL DE ATÉ 06/06H SE DOR OU TEMPERATURA IGUAL
OU MAIOR QUE 37,8°C.

2) FLOGORAL SPRAY ----- 01 FRASCO
FAZER 01 APLICAÇÃO, VIA ORAL, DE 4/4 HORAS, ATÉ MELHORA DAS LESÕES
ORAIS.

3) IBUPROFENO 50MG/ML----- 01 FRASCO
TOMAR XX GOTAS, VIA ORAL, 8/8 HORAS, POR 3 DIAS.

ORIENTAÇÕES:

- INGESTA HÍDRICA ABUNDANTE.
- FAZER USO MEDICAMENTOSO CONFORME RECEITA MÉDICA.
- RETORNAR A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MAIS PRÓXIMA EM CASO DE PIORA OU MANUTENÇÃO DOS SINTOMAS.

SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL

USO INTERNO:

1) LOPERAMIDA 2MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL DE 12/12 HORAS, SE DIARREIA

2) BUSCOPAN CONPOSTO ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 HORAS SE DOR

OU

2) BROMETO DE OTILÔNIO 40MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS

3) AMITRIPTILINA 25 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO ANTES DE DORMIR

TÍNEA CAPITIS:

USO INTERNO:

1) TERBINAFINA 250 MG ----- 42 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 6 SEMANAS

OU

1) ITRACONAZOL 100 MG ----- 56 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 8 SEMANAS

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE (TAX \geq 37,8° C)

3) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 5 DIAS

USO TÓPICO:

3) TERBINAFINA 1% CREME ----- 01 TUBO
APLICAR SOBRE AS LESÕES, 2 VEZES AO DIA, ATÉ CURA (MÉDIA DE 28 DIAS)

TÍNEA CORPORIS:

USO INTERNO:

1) TERBINAFINA 250 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 28 DIAS

OU

1) ITRACONAZOL 100 MG ----- 28 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA DURANTE 28 DIAS

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($TAX \geq 37,8^{\circ} C$)

3) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 5 DIAS

USO TÓPICO:

4) CETOCONAZOL 2% SHAMPOO ----- 01 FRASCO
APLICAR NO COURO CABELUDO ÚMIDO ATÉ FAZER ESPUMA E DEIXAR AGIR
POR 10 MINUTOS ANTES DE ENXAGUAR, APLICAR 3 VEZES POR SEMANA,
DURANTE 4 SEMANAS

TÍNEA PEDIS (FRIEIRA) / MÃO:

USO INTERNO:

1) ITRACONAZOL 100 MG ----- 28 CPS
TOMAR 04 COMPRIMIDOS, 1 VEZ AO DIA, DURANTE 7 DIAS, SE INTENSO OU
RECURRENTE

2) DAPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($TAX \geq 37,8^{\circ} C$)

3) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 5 DIAS

USO TÓPICO:

3) ISOCONAZOL 1% CREME ----- 01 TUBO
APLICAR NA REGIÃO, 2 VEZES AO DIA, POR 14 A 28 DIAS

4) UREIA 20 A 25% CREME ----- 01 TUBO
APLICAR NA REGIÃO 2 VEZES AO DIA

ORIENTAÇÕES:

- MANTER OS PÉS SECOS E LIMPOS A MAIOR PARTE DO TEMPO
- LIMPAR OS SAPATOS COM PRODUTOS ANTIFÚNGICOS (EX.: LYSOFORM ®)

TOSSE

1) ACETILCISTEÍNA (40 MG/ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 10 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECRETIVA

OU

1) DEXCLORFENIRAMINA (2MG/5ML) ----- 01 FRASCO
TOMAR 5 ML DE 8/8 HORAS, CASO TOSSE SECA

OPÇÕES:

HYTOS PLUS ----- 01 FRASCO
TOMAR 10ML DE 8/8 HORAS POR 03 DIAS.

KOID D, XAROPE. ----- 01 FRASCO

PERCOF ----- 01 FRASCO
TOMAR 10ML DE 8/8 HORAS POR 5 DIAS

CLORIDATO AMBROXOL 6MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 6 ML DE 8/8 HORAS DURANTE 5 DIAS

DROPROPIZINA 3,0MG/ML ----- 01 FRASCO
TOMAR 6 ML DE 12/12 HORAS DURANTE 3 DIAS

TRANSTORNO RELACIONADOS À NICOTINA / CIGARRO / TABACO (TABAGISMO)

USO INTERNO:

1) BUPROPIONA 150 MG ----- 01 CAIXA
INICIAR O USO AINDA QUANDO ESTIVER FUMANDO, DEIXE DE PARAR DE FUMAR DURANTE A SEGUNDA SEMANA DO ÍNICIO DO MEDICAMENTO. TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 150 MG 01 VEZ AO DIA DURANTE OS 03 PRIMEIROS DIAS, A PARTIR DO QUARTO DIA, TOME UM COMPRIMIDO DE 150 MG DUAS VEZES AO DIA.

USO TRANSDÉRMICO:

1) NICOTINA ADESIVO 21 MG / 14 MG / 07 MG ----- 01 CAIXA
INICIAR USO APÓS PARAR DE FUMAR. USAR DURANTE AS 6 PRIMEIRAS

SEMANAS 21 MG/DIA. 14 MG/DIA NAS DUAS SEMANAS SEGUINTE E 07 MG/DIA NAS DUAS SEMANAS FINAIS. O ADESIVO DEVE SER APLICADO NA PELE TODO DIA PELA MANHÃ, JOGANDO O DO DIA ANTERIOR NO LIXO.

TUBERCULOSE PULMONAR:

USO INTERNO:

1) RHPE (150/75/400/275 MG) ----- 120 CPS
TOMAR 04 COMPRIMIDOS PELA MANHÃ EM JEJUM DURANTE 2 MESES

2) RH (150/75 MG) ----- 120 CPS
TOMAR 04 COMPRIMIDOS PELA MANHÃ EM JEJUM, APÓS TERMINO DO ESQUEMA ACIMA, DURANTE 4 MESES

3) VONAU® 8 MG SUBLINGUAL ----- 01 CX
COLOCAR 01 COMPRIMIDO SUBLINGUAL ATÉ DE 8/8 H, SE ENJÔO OU VÔMITO, POR ATÉ 05 DIAS

- ORIENTAÇÕES:

- FAZER ACOMPANHAMENTO MENSAL NA UBS
- LEVAR RESULTADOS DAS BACILOSCOPIAS MENSAS A CADA MÊS QUANDO DA RENOVAÇÃO DA RECEITA MÉDICA
- COMPARECER A UBS DE SEGUNDA A SEXTA PARA TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO

VARICELA (CATAPORA):

USO INTERNO:

1) ACICLOVIR 400 MG ----- 70 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 4/4 H, PULANDO A DOSE DA NOITE (5 VEZES AO DIA), POR 7 DIAS

2) DIPIRONA OU PARACETAMOL 500 MG ----- 20 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 6/6 H, CASO HAJA DOR OU FEBRE ($TAX \geq 37,8^{\circ} C$)

3) LORATADINA 10 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA, DE PREFERÊNCIA À NOITE, POR ATÉ 5 DIAS

USO TÓPICO:

4) SOAPEX® SABONETE ANTISSEPTICO ----- 01 BARRA
TOMAR BANHO DEIXANDO A ESPUMA SECAR NO CORPO POR 10 A 15 MINUTOS ANTES DE SE ENXAGUAR.

*** INDICAÇÕES DE TRATAMENTO:**

- > 12 ANOS
- PACIENTES EM USO CRÔNICO DE CORTICÓIDE (ORAL OU INALATÓRIO)
- IMUNOSSUPRIMIDOS

- GESTANTES
- NEONATOS
- PACIENTES EM USO DE SALICILATO

VERMINOSES:

USO INTERNO:

1) ANNITA 500 MG ----- 06 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 3 DIAS

Indicação	Dosagem	Duração
Gastroenterites virais causadas por rotavírus e norovírus	um comprimido (500mg), duas vezes por dia (a cada 12 horas)	3 dias consecutivos
Helmintíases, amebíase, giardíase, isosporíase, balantidíase, blastocistose	um comprimido (500mg), duas vezes por dia (a cada 12 horas)	3 dias consecutivos
Criptosporidíase em pacientes sem imunodepressão	um comprimido (500mg), duas vezes por dia (a cada 12 horas)	3 dias consecutivos
Criptosporidíase em pacientes imunodeprimidos, se a contagem de CD4 for superior a 50 células/mm ³	um ou dois comprimidos (500 a 1000mg), duas vezes por dia (a cada 12 horas)	14 dias consecutivos
Criptosporidíase em pacientes imunodeprimidos, se a contagem de CD4 for inferior a 50 células/mm ³	um ou dois comprimidos (500 a 1000mg), duas vezes por dia (a cada 12 horas)	Deve-se manter a medicação por, no mínimo, oito semanas ou até a resolução dos sintomas e negatificação dos oocistos

ANCILOSTOMÍASE / ASCARIDÍASE / TRICURIÁSE / CISTICERCOSE / OXIURÍASE / CLONORQUÍASE / HIDATIDOSE

USO INTERNO:

1) ALBENDAZOL 400 MG ----- 05 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 05 DIAS

2) IVERMECTINA 6 MG ----- 02 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS EM DOSE ÚNICA
OBS: CRIANÇAS TOMAR 01 COMPRIMIDO.

AMEBÍASE

USO INTERNO:

1) METRONIDAZOL 250 MG ----- 40 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS DE 6/6 H POR 5 DIAS

CAPILARÍASE

USO INTERNO:

1) ALBENDAZOL 400 MG ----- 10 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 10 DIAS

**ESQUISTOSSOMOSE / CISTICERCOSE / CLONORQUIÁSE / DIFILOBOTRIÁSE /
DIPILIDIÁSE / EQUINOSTOMÍASE / HIDATIDOSE / HIMENOLEPIÁSE /
OPISTORQUIÁSE / TENÍASE**

USO INTERNO:

1) PRAZIQUANTEL 150 E 500 MG ----- XX CPS
TOMAR XX COMPRIMIDO DE 8/8 H EM UM DIA, REPETIR APÓS 4 A 6 SEMANAS

* 10 – 30 MG/KG/DIA

ESTRONGILOIDÍASE**USO INTERNO:**

1) ALBENDAZOL 400 MG ----- 14 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 12/12 H POR 7 DIAS

GIARDÍASE**USO INTERNO:**

1) METRONIDAZOL 250 MG ----- 15 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 H POR 5 DIAS

**TENÍASE / LARVA MIGRANS CUTÂNEA / LARVA MIGRANS VISCERAL /
TRICOSTRONGILÍASE**

USO INTERNO:

1) ALBENDAZOL 400 MG ----- 03 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO AO DIA POR 3 DIAS

OBSERVAÇÕES – ANTICONCEPCIONAL:

1. **TÂMISA 20 (GESTODENO 75 MCG + ETINILESTRADIOL 20 MCG) – 21 COMPS**
2. **TÂMISA 30 (GESTODENO 75 MCG + ETINILESTRADIOL 30 MCG) – 21 COMPS**
3. **PRIMERA 20 (DESOGESTREL 150 MCG + ETINILESTRADIOL 20 MCG) – 21 COMPS**

4. **CICLOFEMME (LEVONORGESTREL 150 MCG + ETINILESTRADIOL 30 MCG) – 21 COMPS**
5. **GESTRELAN (LEVONORGESTREL 150 MCG + ETINILESTRADIOL 30 MCG) – 21 COMPS**
6. **DEMEDROX (MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML) – 01 AMP IM TRIMESTRALZ*C**
7. **NOREGYNA (NORETISTERONA + ESTRADIOL 50/5 MG/ML) – 01 AMP IM MENSAL**

VIROSE

USO INTERNO

1) LORATADINA 10MG ----- 01CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL AO DIA POR 05 DIAS

DICLORIDRATO DE HIDROXIZINA 25MG ----- 01 FRASCO
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL DE 8/8 HORAS POR 05 DIAS

2) PARACETAMOL 750MG ----- 01CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL DE 6/6 HORAS SE DOR E/OU FEBRE
(TEMPERATURA AXILAR >37,8°C)

DIPIRONA 1G, ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDOS, VIA ORAL, DE 06/06 HORAS, SE APRESENTAR DOR OU FEBRE.

NIMESULIDA 100MG ----- 01 CX
USO: 01 COMPRIMIDO VO 12/12H POR 5 DIAS

RINO SORO JET ----- 01 FRASCO.
APLICAR 02 JATOS EM CADA NARINA DE 6/6 HORAS SE CONGESTÃO NASAL

CUIDADOS GERAIS:

- REPOUSO E HIDRATAÇÃO ORAL VIGOROSA.
- NÃO USAR ANTI-INFLAMATÓRIOS (TANDRILAX, DICLOFENACO, VOLTAREN, PROFENID, NIMESULIDA, IBUPROFENO, AAS).

SINAIS DE ALARME:

- MANCHAS NO CORPO, SANGRAMENTO, SONOLÊNCIA E/OU IRRITABILIDADE, POUCA URINA, DIMINUIÇÃO REPENTINA DA TEMPERATURA CORPÓREA, VÔMITOS PERSISTENTES, DESMAIO, DOR ABDOMINAL INTENSA.

GINECOLÓGICO

BARTHOLINITE e CERVICITE (CLAMIDIA OU GONORREIA) – CORRIMENTO URETRAL e CANCRO MOLE

USO INTERNO:

1) DIPIRONA 1G ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL DE 06/06H SE DOR OU TEMPERATURA \geq 37,8°C.

2) BIPROFENID 150MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, UMA VEZ AO DIA, POR 5 DIAS.

3) CEFTRIAXONE 500MG, IM, DOSE ÚNICA + AZITROMICINA 1G (2CP), VIA ORAL
TOMAR 02 COMPRIMIDOS VIA ORAL DOSE ÚNICA

CUIDADOS E ORIENTAÇÕES:

- COMPRESSA COM CALOR ÚMIDO LOCAL POR 20 MINUTOS POR 7 DIAS PARA COMPLEMENTAR DRENAGEM.
- CURATIVO DIÁRIO ENQUANTO MANTIVER DRENAGEM ATIVA.
- RETORNAR A ESTA UNIDADE EM CASO DE MANUTENÇÃO OU PIORA DOS SINTOMAS.

CANDIDÍASE VAGINAL

USO INTERNO:

1) FLUCONAZOL 150 MG ----- 01 CP
TOMAR 01 COMPRIMIDO EM DOSE ÚNICA

OU

1) ITRACONAZOL 100 MG ----- 06 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDOS, 1 VEZ AO DIA, POR 3 DIAS

USO INTRAVAGINAL:

2) MICONAZOL CREME A 2% ----- 01 TUBO

ADMINISTRAR COM AUXILIO DE APLICADOR INTRAVAGINAL CHEIO, À NOITE AO DEITAR, DURANTE 7 DIAS

3) NISTATINA CREME ----- 01 TUBO
ADMINISTRAR COM AUXILIO DE APLICADOR INTRAVAGINAL CHEIO, À NOITE AO DEITAR, DURANTE 14 DIAS

DIP (DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA)

USO INJETÁVEL:

1) CEFTRIAXONA 500MG ----- 01 CX
APLICAR 01 AMPOLA INTRAMUSCULAR, DOSE ÚNICA

USO INTERNO:

1) DOXICICLINA 100 MG -----
01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL DE 12/12 HORAS, POR 14 DIAS

2) METRONIDAZOL 400 MG -----
01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA 12 HORAS POR 14 DIAS

3) DAPIRONA 1 G -----
01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO A CADA 6 HORAS SE DOR OU FEBRE

TRATAMENTO DO PARCEIRO SEXUAL

USO INJETÁVEL:

1) CEFTRIAXONA 500MG ----- 01 CX
APLICAR 01 AMPOLA INTRAMUSCULAR, DOSE ÚNICA

USO INTERNO:

AZITROMICINA 1 G ----- 01 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO, DOSE ÚNICA

DISMENORRÉIA

USO INTERNO:

1) POSTAN 500MG -----
01CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL DE 8/8 HORAS SE DOR EM CÓLICA

OU

1) PIROXICAM 20 MG ----- 01 CAIXA

TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 12/12H POR ATÉ 05 DIAS

OU

1) MELOXICAM 7,5 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE DOR, PODENDO REPETIR DE 24/24H POR ATÉ 05 DIAS SEGUIDOS

2- METOCLOPRAMIDA 10 MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO SE NÁUSEAS OU VÔMITOS, PODENDO REPETIR DE 8/8H

SE DOR QUE NÃO MELHORE COMO DIPIRONA:

3) PACO 30 ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, 08 EM 08 HORAS

ECTOPIA CERVICAL

USO VAGINAL

1) ALBOCRESIL GEL VAGINAL ----- 01 CAIXA
APLICAR POR 09 DIAS SEGUIDOS OU ALTERNADOS À NOITE, AO DEITAR.
APLICAR UM APLICADOR CHEIO NA VAGINA

ITU (CISTITE NÃO COMPLICADA)

USO INTERNO:

1) NITROFURANTOÍNA 100 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL A CADA 6 HORAS POR 7 DIAS

2) IBUPROFENO 600 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL A CADA 8 HORAS SE DOR

3) PYRIDIUM FENAZOPIRIDINA 200MG ----- 01 CAIXA
TOMAR 01 COMPRIMIDO DE 8/8 HORAS POR CINCO DIAS

SE OPTAR POR FOSFOMICINA:

USO INTERNO:

1) FOSFOMICINA 3G ----- 01 ENVELOPE
DISSOLVER 50 ML DO CONTEÚDO EM 50 ML DE ÁGUA, VIA ORAL, DOSE ÚNICA

ORIENTAÇÕES:

- AUMENTAR INGESTA HÍDRICA (MÍNIMO DE 2 LITROS DE ÁGUA POR DIA)
- URINAR SEMPRE QUE HOUVER VONTADE E ANTES / APÓS RELAÇÃO SEXUAL
- EVITAR USO DE DUCHAS VAGINAIS E CUIDADO COM HIGIENE ANAL E VAGINAL

FLUXOGRAMA:

- SE AUSÊNCIA DE MELHORA CLÍNICA EM 3 DIAS REALIZAR SUMÁRIO DE URINA E UROCULTURA
- SE (+) AGENTE RESISTENTE À DROGA UTILIZADA NOVO TTO POR 3 DIAS DE ACORDO COM ANTIBIOGRAMA
- SE (+) AGENTE SENSÍVEL À DROGA UTILIZADA REAVALIAR O CASO
- SE (-) REPETIR CULTURA EM 48 H (-) CLAMYDIA TRACHOMATIS; UREAPLASMA UREALITYCUM; GARDNERELLA VAGINALIS; MYCOPLASMA HOMINIS DOXICICLINA 100 MG, VO, DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS OU AZITROMICINA 1G, VO, DOSE ÚNICA.

ITU NA GESTAÇÃO**USO INTERNO:**

1) NITROFURANTOÍNA 100 MG ----- 01 CX
TOMAR 01 COMPRIMIDO VIA ORAL A CADA 6 HORAS POR 7 DIAS

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE:

INGERIR BASTANTE LÍQUIDO;
PROCEDER À HIGIENE APÓS EVACUAÇÃO, SEMPRE NA DIREÇÃO VAGINA PARA ÂNUS;
TER CUIDADO COM USO EXCESSIVO DE SABONETES ÍNTIMOS E DUCHAS VAGINAIS;
EVITAR ROUPAS ÍNTIMAS COM TECIDO SINTÉTICO. PREFERIR ALGODÃO;
PROCURAR REALIZAR MICÇÃO E HIGIENE ÍNTIMA APÓS ATO SEXUAL.

ITU DE REPETIÇÃO (PROFILAXIA)**USO INTERNO:**

1) NITROFURANTOÍNA 100 MG ----- 72
CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE ANTES DE DEITAR, 3 VEZES POR SEMANA,
DURANTE 6 MESES

OU

1) SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIM (800 + 160 MG) ----- 06 CPS
TOMAR 01 COMPRIMIDO À NOITE ANTES DE DEITAR, 3 VEZES POR SEMANA,
DURANTE 6 MESES

METRORRAGIA**USO INTERNO:**

TRANSAMIN 250MG ----- 01CX
TOMAR 02 COMPRIMIDOS VIA ORAL DE 8/8 HORAS POR 03 DIAS

SÍFILIS

TESTE TREPONÊMICO + VDRL → 2+ → TRATA
→ 1+ E 1- → PODE OUTRO TESTE TREPONEMICO
→ SE + → TRATA
→ GRAVIDA JÁ TRATA

1ª, 2ª E LATENTE PRECOCE (< 1 ANO DE DOENÇA)

USO INJETÁVEL:

1) PENICILINA G BENZATINA (1,2 MILHÕES UI) ----- 02 AMP
APLICAR 1,2 MILHÕES UI, EM CADA NÁDEGA, EM DOSE ÚNICA

3ª E LATENTE TARDIA (> 1 ANO DE DOENÇA)

USO INJETÁVEL:

1) PENICILINA G BENZATINA (1,2 MILHÕES UI) ----- 06 AMP
APLICAR 1,2 MILHÕES UI, EM CADA NÁDEGA, 1 VEZ POR SEMANA, DURANTE 3 SEMANAS
- CONTROLE GINECOLÓGICO VDRL A CADA 3 MESES
- CONTROLE OBSTÉTRICO VDRL MENSAL

VAGINOSE BACTERIANA (Gardenella)/ TRICOMONIASE

USO INTERNO:

1) METRONIDAZOL 250MG ----- 14 CPS
TOMAR 02 COMPRIMIDO DE 12/12 HORAS POR 7 DIAS.

PROIBIDO BEBIDA ALCOOLICA.

2) METRONIDAZOL CREME VAGINAL ----- 01 CAIXA
APLICAR INTRAVAGINAL POR 10 NOITES

PROIBIDO BEBIDA ALCOOLICA.

SE GRAVIDA:

(NO PRIMEIRO TRIMESTRE): METRONIDAZOL TOPICO
CLINDAMICINA 300MG ----- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, VIA ORAL, DE 12/12H POR 7 DIAS

(OUTROS TRIMESTRES)
METRONIDAZOL 250MG ----- 01 CAIXA
USO: 01 COMPRIMIDO, DE 8/8H POR 7 DIAS.