

Corentin vs David Théret

Corentin Cornou

Contents

I	Légende	2
II	Todos	2
III	Corentin vs Victor Maslov et Johannes Jisse Duistermaat	4
III.1	Indice de Maslov	4
III.1.1	Rappels sur la Grassmannienne Lagrangienne	4
III.1.2	Indice de Maslov Duistermaat	10
III.1.3	Indice de Maslov-Duistermaat pour les fibrés symplectiques sur le cercles	11
III.1.4	GF-time !!	12
IV	Le système hamiltonien	15
IV.1	Faits sur le flot cogéodésique	17
IV.2	Fin de la preuve	20
V	La vraie vie c'est dans $\mathbb{R}^{2n}$	21
VI	Passage à la limite	24
VII	Démo du théorème	25
VII.1	C'est la vraie preuve du théorème let's goooooo !!!	25
VII.2	Oui bonjour serait-il possible d'obtenir un titre pour cette partie	26
VII.3	Cas courbure strictement négative	27
VII.4	Cas d'un produit de sous-variétés de courbure strictement négative	27
VII.5	Cas du tore	28

I Légende

☐	Todo général	
☐	Fait obscur	
☐	À prouver	
☐	À sourcer	
☐	À lier dans le document	
☐	À dessiner	

II Todos

☐	est-ce que S est orienté en $+1$. Est-ce que la Emmanuel interprétation marche ?	5
☐	$\Lambda(n)$ est une variété	6
☐	pas sur de garder la notation	6
☐	blabla on définit le Maslov	7
☐	introduire s	8
☐	par formule reliant machin à chose	9
☐	montrer le lien pour la définition de positivité	9
☐	conjugaison de ces trusc	9
☐	Ce qui se trame à MaslovLand	9
☐	Invariance modulo indice	9
☐	Hormander, antisymétrie	9
☐	lien avec la permutation de $Q(\alpha, \beta; \gamma)$	9
☐	I'm too tired for this shit	10
☐	Oui le calcul	10
☐	contreexemple de l'additivité de la concaténation des chemins	11
☐	$E \rightarrow$ trivialisable	12
☐	pas sur que ce soit très bien	12
☐	définition fonction génératrice	12
☐	partie fonction génératrice	12
☐	existence des fonctions génératrices linéaires	13
☐	définition de l'indice gf	13
☐	ind gf et Maslov coïncident sur les lacets	13
☐	identification	13
☐	fonctions génératrices	13
☐	théorème liant les noyaux de S et $d\Phi - \text{Id}$	13
☐	Les indices sont additifs vis-à-vis de la somme directe	14

☐ modifier la propriété	14
☐ vérifier que la déf est bonne	14
☐ move that so next line is more natural	14
☐ dessin de Γ hamiltonien	15
☐ Duistermaat	16
☐ Clarifier les 40 identifications dans les coordonnées.	17
☐ Parellélisme des Jacobs	19
☐ rewrite the proof to make it more coherent.	20
☐ additivité du Maslov nouveau	20
☐ Pourquoi ?	21
☐ Pourquoi ?	21
☐ $v(z)=v(\gamma)+1$	22
☐ Faire le lien entre homologie et points critique	22
☐ jsp trop quoi	23
☐ something about superscript	23
☐ Proposition 2.x de Théret	23
☐ Cylindre	23
☐ La capacité est décroissante.	24
☐ majoration de la longueur	24
☐ compacité de Γ ensemble des géodésiques de longueur bornée par c ..	24
☐ trouver un nom convenable pour la gf capacity	25
☐ idem	25
☐ Weinstein	25
☐ Why is Maslov Class	25
☐ trouver nom gfc	26
☐ Chameau symplectique	26
☐ fixer μ	26
☐ moving crown	26
☐ La capacité est continue	27
☐ Pourquoi ?	27
☐ Pourquoi ?	27
☐ Pourquoi ?	28
☐ Pourquoi ?	28
☐ Pourquoi ?	28
☐ Pourquoi ?	28

III Corentin vs Victor Maslov et Johannes Jisse

Duistermaat

III.1 Indice de Maslov

III.1.1 Rappels sur la Grassmannienne Lagrangienne

On fixe dans cette section $(\mathbb{F}, \sigma)$ ev symplectique de dimension $2n \in \mathbb{N}$ et l'on notera $\text{Sym}(\mathbb{F})$ le groupe des symplectomorphismes de $\mathbb{F}$.

Définition 3.1.1.1: On appelle **Grassmannienne Lagrangienne** associée à $\mathbb{F}$ l'ensemble $\Lambda(n)$ des sous-espaces Lagrangiens de $\mathbb{F}$. De plus; Pour $\alpha \in \Lambda(n)$ et $k \in \mathbb{N}$ on pose

$$\Lambda^k(\alpha) := \{\beta \in \Lambda(n) \mid \dim \alpha \cap \beta = k\}$$

l'ensemble des Lagrangiens de $\mathbb{F}$ dont l'intersection avec α est de dimension k .

Proposition-Définition 3.1.1.1: Soient $\alpha, \beta \in \Lambda(n)$ et γ sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}$ de dimension n . Supposons α et γ transverses à β . Alors il existe une unique application linéaire $C : \alpha \rightarrow \beta$ appelée **cadre lagrangien** telle que $\gamma = \{u + Cu; u \in \alpha\}$. De plus, la forme

$$Q(\alpha, \beta; \gamma) : \alpha \times \alpha \rightarrow \mathbb{R};$$

$$(u, v) \mapsto \sigma(Cu, v)$$

est symétrique si et seulement si γ est Lagrangien.

Preuve: Par transversalité de β et γ on a $\mathbb{F} = \beta \oplus \gamma$, ce qui donne l'unicité. Puis par transversalité de β et α la projection $\pi : \alpha \rightarrow \gamma$ parallèlement à β est injective donc un isomorphisme. Ainsi, l'application $C = \pi - \text{Id}_\alpha \in \alpha \rightarrow \beta$ convient.

Pour tous $u, v \in \alpha$, en utilisant que α et β sont Lagrangiens :

$$\begin{aligned} Q(\alpha, \beta; \gamma)(u, v) &= \sigma(Cu, v) \\ &= \sigma(Cu, v + Cv) \\ &= \sigma(u + Cu, v + Cv) - \sigma(u, v + Cv) \\ &= \sigma(u + Cu, v + Cv) + Q(\alpha, \beta; \gamma)(v, u) + \sigma(v, u) \\ &= \sigma(u + Cu, v + Cv) + Q(\alpha, \beta; \gamma)(v, u). \end{aligned}$$

Ainsi, $Q(\alpha, \beta; \gamma)$ est symétrique si et seulement si $\sigma(u + Cu, v + Cv) = 0$ pour tous $u, v \in \alpha$ c'est-à-dire si et seulement si γ est Lagrangien par définition de C . $\square$

Proposition 3.1.1.1: Soient $\alpha, \beta \in \Lambda(n)$ transverses.

1. L'application $Q(\alpha, \beta) : \gamma \in \Lambda^0(\beta) \rightarrow Q(\alpha, \beta; \gamma) \in S(\alpha)$ est une bijection de $\Lambda^0(\beta)$ dans l'espace $S(\alpha)$ des formes bilin  aire sym  triques sur α .
2. Si $\gamma \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\beta)$ alors $Q(\alpha, \beta; \gamma)$ et $Q(\beta, \gamma; \alpha)$ sont conjugu  es.

Preuve:

1. Par transversalit   de α et β , Lagrangiens et par le fait que σ soit non d  g  n  r  e $w \in \beta \mapsto \sigma(w, \cdot)|_\alpha \in \alpha^*$ est un isomorphisme qui induit un second isomorphisme $(\alpha \rightarrow \beta) \simeq (\alpha \rightarrow \alpha^*)$. On obtient alors le diagramme suivant :

$$\Lambda^0(\beta) \hookrightarrow (\alpha \rightarrow \beta) \xrightarrow{\simeq} (\alpha \rightarrow \alpha^*)$$

$$\gamma \longmapsto C \longmapsto Q(\alpha, \beta; \gamma)$$

l'injectivit   de la premi  re fl  che d  coule l'unicit   dans la Proposition-D  finition 3.1.1.1 et donne celle de $Q(\alpha, \beta)$.

Soit maintenant $S \in S(\alpha)$. On obtient $C : \alpha \rightarrow \beta$ tel que $S = \sigma(C, \cdot)|_\alpha$ par l'isomorphisme ci-dessus. Posons $\gamma := \{u + Cu; u \in \alpha\}$ qui est de dimension n et transverse    β par transversalit   de α et β et $\gamma \subseteq \gamma^\sigma$ par sym  trie de S donc $\gamma \in \Lambda^0(\beta)$. On v  rifie sans mal que $Q(\alpha, \beta; \gamma) = S$.

2. Soit $\gamma \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\beta)$. On dispose de $C : \alpha \rightarrow \beta$ et $C' : \beta \rightarrow \gamma$ cadres Lagrangiens pour γ et α . Alors fixons $v \in \beta$ et posons $u := v + C'v \in \alpha$. En remarquant que $C'v = u + Cu \in \gamma$ on obtient :

$$\begin{aligned} Q(\beta, \gamma; \alpha)(v) &= \sigma(C'v, v) \\ &= \sigma(C'v, u - C'v) \\ &= \sigma(C'v, u) \\ &= \sigma(u + Cu, u) \\ &= \sigma(C'u, u) \\ &= Q(\alpha, \beta; \gamma)(u). \end{aligned}$$

Or l'application $v \mapsto u$ est la restriction β de la projection sur α parall  lement    γ qui est un isomorphisme. D'o   le r  sultat.

□

est-ce
que S
est ori-
ent  
en ± 1 .
Est-ce
que la

Fixons maintenant $\alpha, \beta, \gamma \in \Lambda(n)$ tels que $\beta \pitchfork \gamma$. On g  n  ralise d  sormais par r  duction symplectique la d  finition de $Q(\alpha, \beta; \gamma)$ au cas o   α et β ne sont pas transverses.

Les Lagrangiens α et β   tant isotropes, $\alpha \cap \beta$ le sera   galement et l'image par $\pi : \alpha + \beta \rightarrow (\alpha + \beta)/(\alpha \cap \beta)$ d'un Lagrangien $\mathbb{F}$ intersect   avec $\alpha + \beta$ sera un Lagrangien de $\alpha + \beta/(\alpha \cap \beta)$. On pose donc dans ce cas

$$Q(\alpha, \beta; \gamma) := Q(\pi\alpha, \pi\beta; \pi\gamma) \quad (1)$$

Proposition 3.1.1.2: Si γ est   galement transverse    α alors les formes $Q(\alpha, \beta; \gamma)$ et $Q(\beta, \gamma; \alpha')$ vue comme une forme bil  n  aire sur $\beta/(\alpha \cap \beta)$ sont conjugu  es (donc en particulier de m  me signature).

Preuve: Soit $C : \beta \rightarrow \gamma$ cadre Lagrangien pour α . On montre facilement que πC descend au quotient en une application $\tilde{C} : \pi\beta \rightarrow \pi\gamma$ qui est un cadre Lagrangien pour $\pi\alpha$. Ainsi, $Q(\beta, \gamma; \alpha)$ restreinte    $\pi\beta$ est   gale    $Q(\pi\beta, \pi\gamma; \pi\alpha)$ qui est conjugu  e    $Q(\alpha, \beta; \gamma) := Q(\pi\alpha, \pi\beta; \pi\gamma)$ par le point 2. de la proposition Proposition 3.1.1.1. $\square$

Proposition 3.1.1.3: $\Lambda(n)$ est une vari  t   diff  rentielle de dimension $\frac{1}{2}n(n+1)$ dont un atlas est donn   par les $(Q(\alpha, \beta))_{\alpha \pitchfork \beta}$. De plus, la diff  rentielle de $Q(\alpha, \beta)$ en α ne d  pend pas de β offrant une identification canonique entre de $T_\alpha \Lambda(n)$ et $S(\alpha)$.

Preuve: Soient β, β'

$\square$

Lemme 3.1.1.4: Pour tout $\gamma \in \Lambda^{k(\alpha)}$ il existe une submersion R d  finie sur un voisinage ouvert $\mathcal{U}$ de γ et    valeur dans $S(\alpha \cap \gamma)$ telle que :

1. pour tout $\gamma' \in \mathcal{U}$, $\dim \ker R(\gamma') = \dim \alpha \cap \gamma'$
2. $dR(\gamma) =: q_{\alpha \cap \gamma}$ soit la restriction de $S(\alpha) \rightarrow S(\alpha \cap \gamma)$.

$\Lambda(n)$
est une
vari  t  

Preuve: Soit $\gamma \in \Lambda^{k(\alpha)}$ et $\beta \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\beta)$. Dans une base adapt  e de α on a :

$$Q(\alpha, \beta; \gamma) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

pour une certaine matrice $A \in GL_{n-k}(\mathbb{R})$. Si $\gamma' \in \Lambda(n)$ est suffisamment proche de γ alors $\gamma' \in \Lambda^0(\beta)$ et

pas
sur de
garder
la no-
tation
 $q_{\alpha \cap \gamma}$

$$Q(\alpha, \beta; \gamma') = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix}$$

avec C, D petites et B proche de A (donc inversible).

Alors :

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -C^T B^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -B^{-1}C \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & D - C^T B^{-1}C \end{pmatrix}.$$

Posons $R(\gamma') := D - C^T B^{-1}C$. La fonction R ainsi d  finie est clairement une submersion qui v  rifie 1. Puis, par le calcul, dans les coordonn  es (B, C, D) : $dR(\gamma) = dD$. Ce qui correspond    la restriction demand  e. $\square$

Lemme 3.1.1.5: Soient $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ courbe diff  rentiable, $t_0 \in [0, 1]$ tel que $q_{\alpha \cap \gamma(t_0)}(\dot{L}_{t_0}) \neq 0$ soit non d  g  n  r  e, et $\beta \in \Lambda^0 \cap \Lambda^0(L_{t_0})$ alors :

$$\text{sgn } Q(\alpha, \beta; L_t) = \text{sgn } Q(\alpha, \beta; L_{t_0}) + \text{sgn } q_{\alpha \cap L_{t_0}}(\dot{L}_{t_0})$$

pour $t > t_0$ suffisamment proche de t_0 .

Preuve: Par construction de R dans le lemme pr  c  dent en $\gamma = L_{t_0}$, et non d  g  n  rescence de $q_{\alpha \cap L_{t_0}}(\dot{L}_{t_0})$ on a pour t suffisamment proche de t_0 $\text{sgn } Q(\alpha, \beta; L_t) = \text{sgn } Q(\alpha, \beta; L) + \text{sgn } R(L_t)$. Or, pour t suffisamment proche de t_0 $\text{sgn } R(L_t) = \text{sgn } (R(L_{t_0}) + (t - t_0) dR(L_{t_0})) = \text{sgn } q_{\alpha \cap L_{t_0}}(\dot{L}_{t_0})$. La derni  re   galit   d  coule de $t > t_0$ et $R(L_{t_0}) = 0$. $\square$

blabla on d  finit le Maslov

Proposition-D  finition 3.1.1.2: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ chemin continu de Lagrangiens. Fixons $\alpha \in \Lambda^0(L_0) \cap \Lambda^0(L_1)$ et $L' : [0, 1] \rightarrow \Lambda^0(\alpha)$ reliant L_1    L_0 . L'entier $[L : \alpha] := \text{ind}(L * L')$ ne d  pend pas du choix de L' et est appel   **nombre d'intersection de L avec α** .

Preuve: Le fait que $[L : \alpha]$ ne d  pende pas du choix de L' est une cons  quence imm  diate de la simple connexit   de $\Lambda^0(\alpha)$. $\square$

Notons tout de suite quelques propri  t  s imm  diates du nombres d'indice ainsi d  fini.

Proposition 3.1.1.6: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ chemin continu et $\alpha \in \Lambda^0(L_0) \cap \Lambda^0(L_1)$.

1. Si $L_0 = L_1$ alors L est un lacet et $[L : \alpha] = \text{ind}(L)$
2. Si l'on fixe $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_j = 1$ tels que $L(t_i) \in \Lambda^0(\alpha)$ et l'on note L_i la restriction de L à $[t_i, t_{i+1}]$ pour $i = 0, \dots, j-1$ alors $[L : \alpha] = \sum_{i=0}^{j-1} [L_i, \alpha]$.

On cherche désormais à obtenir un indice indépendant de α pour les chemins, ce que ne permet pas la Proposition-Définition 3.1.1.2.

Définition 3.1.1.2: Pour $\alpha, \alpha'; \beta, \beta' \in \Lambda(n)$ tels que α, α' soient transverses à β, β' on note $s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta')$ l'indice de Maslov d'un boucle reliant β à β' en

Proposition 3.1.1.7: Pour $\alpha, \alpha' \in \Lambda(n)$ et $\beta, \beta' \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\alpha')$:

$$s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta') = \frac{1}{2} (\text{sgn } Q(\alpha, \alpha'; \beta) - \text{sgn } Q(\alpha, \alpha'; \beta'))$$

intro-
duire s

Remarque 3.1.1.1: Dans la proposition ci-dessus α et α' ne sont *a priori* pas transverses. Les formes quadratiques $Q(\alpha, \alpha'; \beta)$ et $Q(\alpha, \alpha'; \beta')$ sont à prendre au sens de 1.

Preuve: Tout d'abord, remarquons que $s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta') = [\hat{L} : \alpha]$ où $\hat{L}$ est un chemin dans $\Lambda^0(\alpha)$ reliant β à β' , que l'on supposera intersecter $\Sigma(\alpha)$ uniquement en $\Lambda^1(\alpha)$ et transversalement.

Par le point 2. de Proposition 3.1.1.6, quitte à subdiviser $[0, 1]$, on peut supposer que $\hat{L}$ intersecte exactement une fois $\Lambda^1(\alpha)$ (le cas où L ne rencontre pas $\Lambda^1(\alpha)$ étant trivial).

Notons alors t_0 l'instant où $\hat{L}$ rencontre $\Lambda^1(\alpha)$.

Remarquons tout d'abord, que pour tout $t \in [0, 1] \setminus \{t_0\}$, $\ker Q(\pi\alpha, \pi\alpha'; \pi\hat{L}_t) = \hat{L}_t \cap \alpha = 0$ donc $\text{sgn } Q(\pi\alpha, \pi\alpha'; \pi\hat{L}_t)$ est constant sur $[0, t_0[$ et $]t_0, 1]$. Ainsi,

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} Q(\alpha, \alpha'; \beta) - \operatorname{sgn} Q(\alpha, \alpha'; \beta') &= \operatorname{sgn} Q\left(\pi\alpha, \pi\alpha'; \pi \overset{\text{red umbrella}}{L}_{t_0-\varepsilon}\right) - \operatorname{sgn} Q\left(\pi\alpha, \pi\alpha'; \pi \overset{\text{blue triangle}}{L}_{t_0+\varepsilon}\right) \\ &= 2 \operatorname{sgn} q_{\pi\alpha \cap \pi L_{t_0}} \left(\pi \overset{\text{crown}}{L}_{t_0} \right) \end{aligned}$$

,

Il suffit de montrer que $\operatorname{sgn} q_{\pi\alpha \cap \pi L_{t_0}} \left(\pi \overset{\text{crown}}{L}_{t_0} \right) = \operatorname{sgn} q_{\alpha \cap L_{t_0}} \left(\overset{\text{red umbrella}}{L}_{t_0} \right)$.

Soit $\gamma \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\alpha') \cap \Lambda^0(\overset{\text{crown}}{L}_{t_0})$. Par continuit   γ est transverse    $\overset{\text{red umbrella}}{L}_t$ pour t suffisamment proche de t_0 . On a par que $\frac{dQ(\alpha, \gamma; \overset{\text{red umbrella}}{L}_t)}{dt} \Big|_{t=t_0} = q_{\alpha \cap L_{t_0}} \overset{\text{blue triangle}}{L}_{t_0}$.

Si l'on suppose que $\gamma \subseteq \alpha + \alpha'$ alors on d  montre facilement que $Q(\alpha, \gamma; \overset{\text{crown}}{L}_t) \Big|_{\alpha \cap L_{t_0}} = Q(\pi\alpha, \pi\gamma; \pi \overset{\text{red umbrella}}{L}_t) \Big|_{\alpha \cap L_{t_0}} \circ \pi \overset{\text{blue triangle}}{L}_{t_0}$ donc $\operatorname{sgn} q_{\pi\alpha \cap \pi L_{t_0}} \left(\pi \overset{\text{crown}}{L}_{t_0} \right) = \operatorname{sgn} q_{\alpha \cap L_{t_0}} \left(\overset{\text{blue triangle}}{L}_{t_0} \right)$. Ce qui conclut.

,

□

Proposition 3.1.1.8: L'indice s est antisym  trique. Soient $\alpha, \alpha' \in \Lambda(n)$ et $\beta, \beta' \in \Lambda^0(\alpha) \cap \Lambda^0(\alpha')$, $s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta') = -s(\beta, \beta'; \alpha, \alpha')$.

Preuve: Soient $C_1 : \alpha \rightarrow \beta$ et $C_2 : \beta \rightarrow \alpha$ cadres Lagrangiens pour α' et β' respectivement. Choisissons (x, y) coordonn  es sur $\mathbb{F}$ adapt  es    la d  composition $\alpha \oplus \beta$ et consid  rons le symplectomorphisme

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{F} &\rightarrow \mathbb{F} \\ (x, y) &\mapsto (-y, x). \end{aligned}$$

qui permute $\alpha \leftrightarrow \beta$ et $\alpha' \leftrightarrow \beta'$ et conjugue C_1 et C_2 . Par suite, $Q(\alpha, \beta; \alpha') = \sigma(C_1, \cdot)_{|\alpha} = \sigma(\varphi C_1, \varphi)_{|\alpha} \simeq \sigma(C_2, \cdot)_{|\beta} = Q(\beta, \alpha; \beta')$. Or par , $\operatorname{sgn} Q(\beta, \alpha; \beta') = \operatorname{sgn} Q(\beta, \alpha; \beta')$. Cette formule restant vraie en rempla  ant α par α' , par la Proposition 3.1.1.7 on trouve

par
for-
mule
reliant
machin
  
chose

mon-
trer
le lien
pour la
d  finition de
posi-

con-
vaine-
raison
de ces
trame
   Maslov-

Land
Invari-

biore
mod-
de, in-
disym  trie

lien
avec
la per-
muta-
tion de $Q(\alpha,$

$$\begin{aligned}
s(\alpha, \alpha'; \beta, \beta') &= \frac{1}{2}(Q(\alpha, \alpha'; \beta) - Q(\alpha, \alpha'; \beta')) \\
&= -\frac{1}{2}(Q(\alpha', \beta; \alpha) - Q(\alpha', \beta'; \alpha)) \\
&= -\frac{1}{2}(\operatorname{sgn} Q(\beta, \alpha'; \beta') - \operatorname{sgn} Q()) \\
&= -\frac{1}{2}(\operatorname{sgn} Q(\beta, \beta'; \alpha') - \operatorname{sgn} Q(\beta, \beta'; \alpha)) \\
&= -s(\beta, \beta'; \alpha, \alpha')
\end{aligned}$$

□

Proposition-D  finition 3.1.1.3: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ et $\alpha \in \Lambda^0(L_0) \cap \Lambda^0(L_1)$. L'entier $\operatorname{ind}(L) := [L : \alpha] + \operatorname{ind} Q(L_1, \alpha; L_0)$ ne d  pend pas du choix de α . On l'appelle **indice de Maslov-Duistermaat de L** .

I'm too tired for this shit

Preuve: Soit $\alpha' \in \Lambda(n)$ transverse    L_0 et L_1 . La forme quadratique $Q(L_1, \alpha; L_0)$   tant non d  g  n  r  e, $\operatorname{ind} Q(L_1, \alpha; L_0) = n - \frac{1}{2} \operatorname{sgn} Q(L_1, \alpha; L_0)$. Ainsi, par

$$\begin{aligned}
[L : \alpha'] - \operatorname{ind} Q(L_1, \alpha'; L_0) &= [L : \alpha] + s(\alpha, \alpha'; L_0, L_1) + \operatorname{ind} Q(L_1, \alpha'; L_0) \\
&= [L : \alpha'] - s(L_0, L_1; \alpha, \alpha') + \operatorname{ind} Q(L_1, \alpha'; L_0) \\
&= [L : \alpha'] + n - \frac{1}{2}(\operatorname{sgn} Q(L_1, \alpha; L_0) - \operatorname{sgn} Q(L_1, \alpha'; L_0) + Q(L_1, \alpha'; L_0)) \\
&= [L : \alpha'] + \operatorname{ind} Q(L_1, \alpha; L_0)
\end{aligned}$$

Oui le calcul

□

III.1.2 Indice de Maslov Duistermaat

Remarque 3.1.2.1: Si L est une boucle les indices de Maslov et Maslov-Duistermaat co  cident : il suffit de prendre $L' \equiv L_0 = L_1$ et de remarquer que $\operatorname{ind}(L_0, \alpha; L_0) = 0$.

Proposition 3.1.2.1: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(n)$ chemin continu.

1. L'entier $\operatorname{ind}(L)$ ne d  pend que de la classe d'homotopie de L (a extr  mit  s fix  es).
2. L'indice est invariant par l'action de $\operatorname{Sym}(F)$.
3. Si $M : \mathbb{S}_1 \rightarrow \Lambda(n)$ est une boucle telle que $M_0 = L_1$ alors $\operatorname{ind}(L * M) = \operatorname{ind}(L) + \operatorname{ind}(M)$.

Preuve: Fixons $\alpha \in \Lambda(n)$ transverse à L_0 et L_1 et $L' : [0,1] \rightarrow \Lambda(n)$ tel que $L_{0'} = L_1$ et $L_{1'} = L_0$.

1. Soit $M : [0,1] \rightarrow \Lambda(n)$ homotope à L et de mêmes extrémités. Alors les boucles $L * L'$ et $L * L'$ sont homotopes donc $[L : \alpha] = [M : \alpha]$ par invariance par homotopie de l'indice de Maslov pour les boucles.
2. Soit $A \in \text{Sym}(\mathbb{F}, \sigma)$. L'invariance de l'indice de Maslov par l'action de $\text{Sym}(\mathbb{F})$ donne $[L : \alpha] = \text{ind}(L * L') = \text{ind}(AL * AL') = [AL', A\alpha]$. Puis $Q(L_1, \alpha; L_0)$ et $Q(AL_1, A\alpha; AL_0)$ sont clairement conjugués donc de même indice. Ce qui conclut.
3. On a par additivité de l'indice de Maslov $[L * M : \alpha] = \text{ind}(L * M * L') = \text{ind}(L' * L * M) = \text{ind}(L * L') + \text{ind}(M)$. Puis du fait que $\text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0)$ ne dépende que des extrémités du chemin considéré et par 1., on trouve $\text{ind}(L * M) = \text{ind}(L) + \text{ind}(M)$.

□

Remarque 3.1.2.2: Le troisième point de la proposition précédente ne marche pas si M n'est pas un lacet.

Proposition 3.1.2.2: Soient $A : \mathbb{S}_1 \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{F})$ et $L, L' : [0,1] \rightarrow \Lambda(n)$. Alors en notant $AL := (A_t L_t)$ on a l'égalité suivante :

$$\text{ind}(AL) - \text{ind}(AL') = \text{ind}(L) - \text{ind}(L').$$

Preuve: Le chemin AL est homotope au chemin $A_0 L * AL_1$. Ainsi par les points 2. et 3. de la Proposition 3.1.2.1 on trouve (car AL_1 est un lacet) $\text{ind}(AL) = \text{ind}(L) + \text{ind}(AL_1)$. Enfin par le point 1. de Proposition 3.1.2.1 et par connexité de $\Lambda(n)$ on a $\text{ind}(AL_1) = \text{ind}(AL_{1'})$ d'où l'égalité. □

con-
trex-
emple
de l'additivité
de la
con-
caté-
nation
des chemins

III.1.3 Indice de Maslov-Duistermaat pour les fibrés symplectiques sur le cercles

Soit $E \rightarrow \mathbb{S}_1$ fibré symplectique de fibre $(\mathbb{F}, \sigma)$. On considère alors V un sous-fibré Lagrangien de E et $R : [0,1] \rightarrow \Lambda(E)$ un chemin de Lagrangiens tel que $R_t \subseteq E_t$ pour tout $t \in \mathbb{S}_1$ (sans avoir nécessairement $R_0 = R_1$).

Proposition-Définition 3.1.3.1: Le fibré symplectique E est trivialisable et si $\tau : E \simeq \mathbb{S}_1 \times \mathbb{F}$ en est une trivialisatation alors en identifiant $\tau(V)$ à une boucle et $\tau(R)$ un chemin dans $\Lambda(n)$ on trouve que la quantité

$$\text{ind}_{V(R)} := \text{ind}(\tau(R)) - \text{ind}(\tau(V))$$

ne dépend pas de τ . On l'appelle **indice de Maslov de R relativement à V** .

Preuve: La trivialisabilité de E est une conséquence immédiate de la connexité de $\text{Sym}(\mathbb{F})$.

Soient $\tau, \tau' : E \simeq \mathbb{S}_1 \times \mathbb{F}$ des trivialisations de E . On pose

$$A : \mathbb{S}_1 \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{F})$$

$$t \mapsto \tau'_t \tau_t^{-1}.$$

$E \rightarrow \mathbb{S}_1$
trivialisable

On a alors $\tau'(R) = A\tau(R)$ et $\tau'(V) = A\tau(V)$. Ainsi, par la Proposition 3.1.2.2, $\text{ind}(\tau(R)) - \text{ind}(\tau(V)) = \text{ind}(\tau'(R)) - \text{ind}(\tau'(V))$. $\square$

pas sur
que ce
soit
très
bien...

III.1.4 GF-time !!

On se place dans $\mathbb{R}^{2m}$ muni de sa forme symplectique canonique et on fixe $k \in \mathbb{N}$.

Définition 3.1.4.1: Une forme quadratique $Q : \mathbb{R}^{2m} \times \mathbb{R}^k$ est dite **génératrice** si c'est une fonction génératrice au sens de [1]. Si l'on écrit $Q(X) = \frac{1}{2}X^T B X$ avec $X = \begin{pmatrix} w \\ \xi \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} a & b \\ b^T & c \end{pmatrix}$ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^{2m}$ et $\mathbb{R}^k$, alors Q est génératrice si et seulement si $(b^T \ c)$ est de rang maximal k .

Dans ce cas on pose comme dans [1], $\Sigma_Q = \{(w, \xi) \in \mathbb{R}^{2m} \times \mathbb{R}^k ; b^T w + c\xi = 0\}$ et

$$i_Q : \Sigma_Q \rightarrow \mathbb{R}^{2m} \simeq T^*\mathbb{R}^m$$

$$(w, \xi) \mapsto (w, aw + b\xi)$$

définit un plongement linéaire Lagrangien. On dit que $L = \text{im}(i_Q)$ est engendré par Q .

Exemple: Si W est un Lagrangien de $\mathbb{R}^{2m}$ admettant une fonction génératrice S , z un point de W et (w, ξ) le point correspondant dans Σ_Q alors $d^2 S(w, \xi)$ est une forme quadratique génératrice pour $T_z W$.

défi-
nition
fonc-
tion
généra-
trice

partie
fonc-
tion
généra-
trice

Th  or  me 3.1.4.1: Soit $L : [0, 1] \rightarrow \Lambda(2m)$. Il existe $(Q_t)_{t \in [0, 1]}$ chemin continu de formes quadratiques tel que Q_t engendre L_t pour tout $t \in [0, 1]$.

Preuve: □

Proposition-D  finition 3.1.4.1: Si L et $(Q_t)_{t \in [0, 1]}$ sont comme dans le th  or  me ci-dessus, alors l'entier $\text{ind}_{\text{gf}}(L) := \text{ind } Q_1 - \text{ind } Q_0$ ne d  pend que de L . On l'appelle **indice gf** de L .

Preuve: □

exis-
tence
des
fonc-
tions
g  n  ra-
trices lin  aires

Proposition 3.1.4.2: Si L est un lacet de Lagrangiens de $\mathbb{R}^{2m}$ alors $\text{ind}_{\text{gf}}(L) = \text{ind}(L)$.

Preuve: □

d  finition de
l'indice
gf

D  finition 3.1.4.2: Soit $A : [0, 1] \rightarrow \text{Sym}(\mathbb{R}^{2n})$ chemin continu de symplectomorphismes. Alors par l'identification on obtient $L := I(\text{graph } A)$ chemin de Lagrangiens de $T^*\mathbb{R}^{2n} \simeq \mathbb{R}^{2m}$ avec $m = 2n$. On d  finit alors l'**indice gf** de A comme $\text{ind}_{\text{gf}}(A) := \text{ind}_{\text{gf}}(L)$.

ind
gf et
Maslov
co  n-
cident
sur les
lacs

Proposition 3.1.4.3: Soit Φ isotopie hamiltonienne de $\mathbb{R}^{2n}$    support compact et S une famille de fonction g  n  ratrice quadratique    l'infini associ  e. Soit $z \in \mathbb{R}^{2n}$ un point fixe de Φ_1 et (z, ξ) le point critique de S_1 associ  . Alors en posant $A = (d\Phi_t(z))_{t \in [0, 1]}$ on a l'  galit   :

$$\text{ind}_{\text{gf}}(A) = \text{ind } d^2 S_1(z, \xi) - \text{ind } Q_\infty.$$

iden-
tifica-
tion
fonc-
tions
g  n  ra-
trices

Preuve: On consid  re Ψ l'isotopie hamiltonienne de $T\mathbb{R}^{2n}$ donn  e par $\Psi_t = I\Phi_t I^{-1}$. Par construction des fonctions g  n  ratrices, on dispose de $(w_t, \xi_t)_{t \in [0, 1]}$ chemin continu dans $\mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^k$ tel que $i_{Q_t}(w_t, \xi_t) = \Psi_t(z, 0)$. On a alors que $Q_t := d^2 S_t(w_t, \xi_t)$ est une fonction g  n  ratrice de $T_{\Psi_t(z, 0)} \tilde{\Gamma}_t = I(\text{graph } A_t)$. Ainsi par d  finition de $\text{ind}_{\text{gf}}(A)$ on a $\text{ind}_{\text{gf}}(A) = \text{ind } Q_1 - \text{ind } Q_0$.

Montrons maintenant que $\text{ind } Q_0 = \text{ind } Q_\infty$. Or Ψ_0   tant l'identit  , par la dimension de $\ker d^2 S_0$ est constante : $\dim \ker d^2 S_0(w, \xi) = \dim \ker d\Psi_0(w) - \text{Id} = 2n$ pour tout $(w, \xi) \in \mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^k$. Par cons  quent,

th  or  me
liant
les
noy-

l'indice de d^2S_0 est lui aussi constant sur Σ_{S_0} et S_0   tant   gal    Q_∞ en dehors d'un compact, $\text{ind } d^2S_0(w_0, \xi_0) = \text{ind } Q_\infty$.

D'o  , finalement, $\text{ind}_{\text{gf}}(A) = \text{ind } d^2S_0(w, z) - \text{ind } Q_\infty$.

□

Theorem 3.1.4.4: Soit $A : [0, 1] \rightarrow \text{Sp}(\mathbb{R}^{2n})$ un chemin de symplectomorphismes. Si $A_0 = \text{Id}$ alors $\text{ind}_{\text{gf}}(A) = \text{ind } I(\text{graph } A)$.

Preuve: Remarquons tout d'abord que puisque :

1. l'on dispose d'une d  composition $\mathbb{R}^{2n} = F \oplus F'$, en sous-espaces symplectiques, stables par A_1 telle que le spectre de $A_1|_F$ ne contienne pas -1 et que celui de $A_1|_{F'}$ soit r  duit    -1 ,
2. le groupe des symplectomorphismes d'un espace vectoriel est connexe,
3. les deux indices consid  r  s sont additifs vis-  -vis de la somme directe

on peut supposer que le spectre de A_1 ne contienne pas -1 ou soit r  duit    -1 .

Dans le premier cas, cela signifie que $\alpha := 0 \times \mathbb{R}^{2n}$ est transverse    L_1 et $\alpha \pitchfork L_0 = \mathbb{R}^{2n} \times 0$ par hypoth  se. Soit alors $L' : [0, 1] \rightarrow \Lambda^0(\alpha)$ reliant L_1    L_0 . Alors, par d  finition $[L : \alpha] = \text{ind}(L * L')$. Or par la Proposition 3.1.4.2, $\text{ind}_{\text{gf}}(L * L') = \text{ind}(L * L')$. Puis par additivit   de ind_{gf} , on obtient $[L : \alpha] = \text{ind}_{\text{gf}}(L) + \text{ind}_{\text{gf}}(L')$.

Ensuite puisque $L'_t \pitchfork \mathbb{R}^{2n} \times 0$ pour tout $t \in [0, 1]$. Soit $C_t : L'_1 \rightarrow \alpha$ le cadre lagrangien associ      α, L'_1 et L_t . Alors $Q'_t : w \mapsto \frac{1}{2}\langle C'_t w, w \rangle$ est une forme quadratique g  n  ratrice pour L'_t . On a en particulier $C'_1 = 0$ et donc $Q'_1 = 0$. Ainsi $\text{ind}_{\text{gf}}(L') = \text{ind}_{\text{gf}}(Q'_1) - \text{ind}_{\text{gf}}(Q'_0) = -\text{ind}_{\text{gf}}Q'_0$.

Puis consid  rons $C : L_1 \rightarrow \alpha$ tel que $L_0 = \{u + Cu; u \in L_1\}$. Si $u \in L_1 = L'_0$ alors $u = v + C'_1 v$ pour un certain $v \in L_0$. Ainsi, par unicit   de la d  composition $L_0 \oplus \alpha$, n  cessairement, $Cu = -C'_1 v$. Par suite, $Q(L_1, \alpha; L_0)(u) = \omega_{\mathbb{R}^{2n}}(Cu, u) = -\omega(C'_1 v, v) = Q'_0(v)$.

Ainsi, $\text{ind } Q'_0 = \text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0)$ et donc

$$\begin{aligned} \text{ind}(L) &= [L : \alpha] + \text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0) \\ &= \text{ind}_{\text{gf}}(L) + \text{ind}_{\text{gf}}(L') + \text{ind } Q(L_1, \alpha; L_0) \\ &= \text{ind}_{\text{gf}}(L) - \text{ind } Q'_0 + \text{ind } Q'_0 \\ &= \text{ind}_{\text{gf}}(L). \end{aligned}$$

Les indices sont additifs vis-  -vis de la somme directe

modifier la proposition 3.1.4.2 que la Prop 3.1.4.2 est une bonne move that so next line is more natural

Supposons maintenant que le spectre A_1 soit r  duit    -1 . On pose $\alpha = I(\text{graph } B) = \left\{ \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, b, a \right); a, b \in \mathbb{R}^n \right\}$ o   $B = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$. Alors α est transverse    L_0 et L_1 et

l'on peut joindre A_1    $-\text{Id}$ par des symplectomorphismes ayant -1 comme seule valeur propre.

□

IV Le syst  me hamiltonien

Soit L vari  t   ferm  e de dimension n et $j : L \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$. On munit T^*L de ses coordonn  es locales cotangentes (q, p) , de $\omega = dq \wedge dp$ forme symplectique canonique. Fixons alors une m  trique $\|\cdot\|$ sur TL qui induit une m  trique sur T^*L et un isomorphisme $T^*L \simeq TL$. On pose $B_\rho := \{(q, p) \in T^*L \mid \|p\| \leq \rho\}$.

On consid  re $h : [0, +\infty] \rightarrow [-\infty, 0]$ v  rifiant :

1. $h \equiv -a$ sur $\left[0, \frac{\varepsilon}{2}\right]$
2. h est convexe et strictement croissante sur $\left[\frac{\varepsilon}{2}, \varepsilon\right]$
3. $h' \equiv c$ sur $[\varepsilon, \rho - \varepsilon]$
4. h est concave et strictement d  croissante sur $\left[\rho - \varepsilon, \rho - \frac{\varepsilon}{2}\right]$
5. $h \equiv 0$ sur $\left[\rho - \frac{\varepsilon}{2}, +\infty\right]$

avec $a > c_{\text{gf}}(V)$ et $c > 0$ distinct de la longueur de toute g  od  sique close et $\varepsilon > 0$ petit.

On consid  re alors l'hamiltonien    support compact $H : T^*L \rightarrow \mathbb{R}$ d  fini par $H(q, p) := h(\|p\|)$ et on note $(\varphi_t)_{t \in [0, 1]}$ l'isotopie hamiltonienne correspondante.

Proposition 4.1: Le flot φ est une reparam  trisation du flot cog  od  sique (voir Proposition-D  finition 4.1.1) g et si $z = (p, q)$ est un point fixe de φ_1 alors la projection γ de sa φ -orbite sur L est une g  od  sique ferm  e de longueur $\ell(\gamma) = h'(\|p\|)$.

Preuve: D'apr  s, la Proposition 4.1.3 le flot cog  od  sique est g  n  r   par l'hamiltonien $K : (q, p) \mapsto \frac{\|p\|^2}{2}$, qui est li      H par la relation $H = a(K)$ o   $a : s \mapsto h(\sqrt{2s})$. Ainsi, en posant $c : z = (q, p) \mapsto a'(K(z)) \frac{h'(\|p\|)}{\|p\|}$, on obtient que $X_H(z) = c(z)X_K(z)$.

Par cons  quent, pour tout $z \in T^*L$,

$$\frac{dg_{c(z)t}(z)}{dt} = c(z)K(g_{c(z)t}(z)) = H(g_{c(z)t}(z))$$

et donc $\varphi_t(z) = g_{c(z)t}(z)$ pour tout $t \in [0,1]$. Ce qui prouve la premi  re assertion.

Si z est un point fixe de Φ_1 , le fait que $\gamma := (\pi_L(\varphi_t(z)))_{t \in [0,1]}$ soit une g  od  sique ferm  e d  coule imm  diatement du r  sultat pr  c  dent et enfin, une g  od  sique   tant de vitesse constante :

$$\ell(\gamma) = \int_0^1 \|\dot{\gamma}_t\| dt = \int_0^1 \left\| \frac{dg_{c(z)t}(z)}{dt} \right\| dt = \int_0^1 c(z) \|p\| dt = c(z) \|p\| = h'(\|p\|).$$

□

Fixons $z = (p, q)$ un point fixe de φ_1 . On consid  rera alors le fibr   symplectique $E \rightarrow \mathbb{S}_1$ dont la fibre E_t au point $t \in \mathbb{S}_1$ est donn  e par

$$E_t := \widetilde{T_z T^* L} \times T_{\varphi_t(z)} T^* L$$

et munie de la forme symplectique $\omega_E := -\pi_1^* \omega_L + \pi_2^* \omega_L$. On notera V le sous-fibr   lagrangien de E de fibre en t donn  e par

$$V_t = \text{vert}(z) \oplus \text{vert}(\varphi_t(z))$$

o   $\text{vert}(x)$ d  signe le sous espace vertical en $x \in T^* L$ du fibr   $T^* L \rightarrow L$.

D  finition 4.1: La fonction $t \mapsto d\varphi_t(z) : T_z T^* L \rightarrow T_{\varphi_t(z)} T^* L$ d  finit un chemin continu $\Gamma : [0,1] \rightarrow \Lambda(E)$ de sous-espace vectoriel lagrangiens. On notera alors $\text{ind}_\varphi(z)$ l'indice $\text{ind}_V(\Gamma)$ d  finit    la Proposition-D  finition 3.1.3.1.

Notons γ la g  od  sique associ  e au point fixe z dans la Proposition 4.1 et $i(\gamma)$ son indice de Morse. On peut alors relier ce dernier    l'indice $\text{ind}_\varphi(z)$ d  finit ci-dessus via :

Proposition 4.2: $\text{ind}_\varphi(z) = \begin{cases} i(z) + n & \text{si } h \text{ convexe en } \|p\| \\ i(z) + n - 1 & \text{si } h \text{ concave en } \|p\| \end{cases}$

Preuve: La preuve du cas convexe se trouve dans [1]. D  duisons-en la preuve dans le cas concave.

□

Duis-
ter-
maat

IV.1 Faits sur le flot cog  od  sique

Proposition-D  finition 4.1.1 (Flot cog  od  sique): Soit $z \in TL$. Il existe une unique g  od  sique γ sur L telle que $(\gamma_0, \dot{\gamma}_0) = z$. On appelle alors **flot g  od  sique**¹ l'application

$$\begin{aligned} g: TL \times [0, 1] &\rightarrow TL \\ (z, t) &\mapsto (\gamma_t, \dot{\gamma}_t) \end{aligned}$$

et **flot cog  od  sique**, not   $g: T^*L \times [0, 1] \rightarrow T^*L$ son conjugu   par l'isomorphisme $T^*L \simeq TL$.

Le fibr   TT^*L , muni la connexion de Levi-Civita associ  e    la m  trique $\|\cdot\|$ admet une d  composition

$$TT^*L = \text{hor} \oplus \text{vert} \quad (2)$$

en sous-fibr  s horizontal et vertical. Ces derniers sont alors canoniquement isomorphes    T^*L et sont donc munis d'un produit scalaire canonique.

Proposition 4.1.1: Soit (q, U) syst  me de coordonn  es normales sur L en $\pi_L(z)$ sont on d  duit les coordonn  es symplectiques $((q, p), U \times \mathbb{R}^{2n})$ sur T^*L . Alors $(q, \partial q, p, \partial p)$ est un syst  me de coordonn  es sur TT^*L sur lequel $TT^*L = \text{hor} \oplus \text{vert} = \ker dp \oplus \ker dq$.

Preuve: Dans le syst  me de coordonn  es ci-dessus, $\pi_L: (q, p) \mapsto q$ donc $d\pi_L = dq$ et par suite $\text{vert} := \ker d\pi_L = \ker dq$.

Ensuite, $\text{hor}(z) = \text{Im } ds_{\pi_L(z)}$ o   s est une section du fibr   $T^*L \rightarrow L$ telle que $s(\pi_L(z)) = z$ et $\nabla_X s = 0$ pour tout $X \in T_{\pi_L(z)}L$, ∇   tant la connexion de Levi-Civita associ  e    $\|\cdot\|$. Or remarquons que si l'on note (q_0, p_0) les coordonn  es en z , $s: (p, q) \mapsto p_0 dq$ convient. En effet, $\sigma(\pi_L(z)) = z$ et tout $X \in T_{\pi_L(z)}L$ s'  crit $X = \sum_{i=1}^n X_i dq_i$ donc $\nabla_X s = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p_0^j X_i \nabla_{dq_i} dq_j$. Or $\nabla_{dq_i} dq_j$ est l'image par l'isomorphisme $T^*L \simeq TL$ de $\nabla_{\partial q_i} \partial q_j = 0$ par le choix des coordonn  es normales. Ainsi, $\text{hor}(z) = \text{Im } ds_{\pi_L(z)}$ et lu dans les coordonn  es $ds_{q_0, p_0} = (q_0, dq_z, p_0, 0)$. Ainsi, $\text{hor}(z) = \ker dq$. $\square$

¹Lequel est bien d  fini car L est compact donc complet.

Proposition 4.1.2: Dans la d  composition $TT^*L = \text{Hor} \oplus \text{Vert}$, la forme symplectique ω_L s'  crit

$$\omega_L(z)(\delta z, \delta z') = \langle \delta_h z, \delta_v z' \rangle - \langle \delta_v z, \delta_h z' \rangle$$

Preuve: La formule est d  finie de mani  re intrins  que. Il suffit donc de v  rifier l'  galit   dans un syst  me de coordonn  es. Supposons que (q, U) est un syst  me coordonn  es locales normales en z auquel on associe $(q, \partial q, p, \partial p)$ syst  me de coordonn  es sur TT^*L comme pr  c  demment. Par ce qui pr  c  de, si l'on note $\pi_h : TT^*L \rightarrow \text{hor}$ et $\pi_v : TT^*L \rightarrow \text{vert}$ les projections sur les espaces vertical et horizontal alors, par ce qui pr  c  de $\pi_h = dq$ et $\pi_v = dp$. Ainsi, $\omega_L = \sum_{i=1}^n dp_i \wedge dq_i = \sum_{i=1}^n \pi_v \wedge \pi_h$ ce qui donne l'  galit   demand  e.

□

Proposition 4.1.3: Le flot cog  od  sique est engendr   par l'hamiltonien

$$K : T^*L \rightarrow \mathbb{R} \\ z = (q, p) \mapsto \frac{\|p\|^2}{2}.$$

qui a pour gradient symplectique le champ de vecteurs qui en $z = (p, q)$ vaut $X_K(z) = (p, 0) \in \text{hor} \oplus \text{vert} \simeq T^*L \oplus T^*L$.

Preuve: On se place dans q coordonn  es normales. On a que $K(z) = \sum \frac{p_i^2}{2}$ donc $dK(z) = \sum p_i dp_i = \langle p, dp \rangle = \omega_L((p, 0), \cdot)$ en identifiant p    son image dans $\text{hor}(z)$. Ainsi, on a bien $X_K(z) = (p, 0)$. □

Ainsi on en d  duit que si γ est une g  od  sique alors $\frac{d\dot{c}(t)}{dt} = (\dot{c}(t), 0) = X_K(c(t))$. Ainsi, $c(t) = g_t(c(0))$.

Proposition 4.1.4: Les champs de vecteurs g -invariants le long de γ g  od  sique sont en bijection avec les champs de Jacobi.

Preuve: Soient $\eta_0 \in T_z T^*L$. Alors $\eta_t := dg_t(\eta_0)$ est un champ de vecteur g -invariant.

Soit k courbe sur T^*L telle que $\frac{\partial k}{\partial s}|_{s=0} = \eta_0$. Posons $\eta_t := \frac{\partial g_t k_s}{\partial s}|_{s=0}$. Puis remarquons que par la proposition pr  c  dente :

$$\frac{\partial}{\partial t} \pi_L g_t(k_s) = T\pi_L \cdot \left(\frac{\partial}{\partial t} g_t(k_s) \right) = T\pi_L \cdot (g_t(k_s), 0) = g_t(k_s).$$

Donc pour tout s , $t \mapsto \pi_L g_t(k_s)$ est une g  od  sique. Ainsi la partie horizontale de η_t :

$$\pi_h(\eta_t) = T\pi_L \frac{\partial g_t(k_s)}{\partial s} \Big|_{s=0} = \frac{\partial}{\partial s} \pi_L g_t(k_s) \Big|_{s=0}$$

est un champ de Jacobi.

Puis, en utilisant que $\frac{\nabla}{dt} g_t(k_s) \Big|_{s=0} = K \cdot \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s) \Big|_{s=0}$ et $\frac{\nabla}{ds} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\nabla}{dt} \frac{\partial}{\partial s}$ on obtient :

$$\begin{aligned} \eta_t &= \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s)_0 \\ &= \left(T\pi_L \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s)_0, \pi_h \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s)_0 \right) \\ &= \left(T\pi_L \frac{\partial}{\partial s} g_t(k_s)_0, \frac{\nabla}{ds} g_t(k_s)_0 \right) \\ &= \left(\eta_{t,h}, \frac{\nabla}{ds} \frac{\partial}{\partial t} \pi_L g_t(k_s)_0 \right) \\ &= \left(\eta_{t,h}, \frac{\nabla}{dt} \eta_{t,v} \right). \end{aligned}$$

□

Rappel 4.1.1: Si η est un champ de Jacobi le long d'une g  od  sique γ tel que $\eta_0 = \alpha \dot{\gamma}_0$ et $\nabla \eta_0 = \beta \dot{\gamma}_0$ pour deux r  els α, β , alors $\eta_t = (\alpha + \beta t) \dot{\gamma}_t$.

Preuve:

□

Puisque $z = (q, p)$ et $T_q L \simeq T_q^* L = \mathbb{R}p \oplus p^\perp$, on obtient par 2 deux d  compositions horizontales $\text{hor} = \text{hor}' \oplus \text{hor}''$ et $\text{vert} = \text{vert}' \oplus \text{vert}''$. On pose alors $E' := \text{hor}' \oplus \text{vert}'$ et $E'' := \text{hor}'' \oplus \text{vert}''$, sous-fibr  s symplectiques orthogonaux et de dimension respectives 2 et $2n - 2$. Parell  lisme des Jacobi

Proposition 4.1.5: Le flot cog  od  sique pr  serve cette d  composition. De plus, le sous-fibr   E' est trivial et pour $t \in \mathbb{R}$, l'isomorphisme de fibr   induit $T(g_t) : E' \rightarrow E'$ s'  crit dans les bases naturelles :

$$\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Preuve: Tout d'abord, par la Proposition 4.1.2 $\omega((p, 0), (0, p)) \neq 0$ et E' est l'orthogonal symplectique de E'' . Or par la Proposition 4.1.3 il suffit donc de montrer que E' est invariant. D'abord, dans la d  composition $T_z T^* L = T_z^* L \oplus T_z^* L$ prise en $z = (p, q)$, par la Proposition 4.1.3

$$\begin{aligned} T_z \varphi_t(p, 0) &= T_z g_t X_K(z) \\ &= \frac{\partial}{\partial s} g_t \circ g_s(z) \Big|_{s=0} \\ &= X_K(g_t(z)) \in \text{hor}'(\varphi_t(z)). \end{aligned}$$

Puis, d'apr  s, la Proposition 4.1.4, $t \mapsto T_z g_t(0, p)$ est un champ de vecteurs g -invariant le long de $t \mapsto g_t(z)$. Il s'  crit donc $T_z g(0, p) = (\eta, \nabla \eta)$ o   η est un champ de Jacobi le long de $t \mapsto g_t(z)$. Or $\eta_0 = 0$ et $\nabla \eta = p$. Ainsi, par le Rappel 4.1.1, $\eta_t = t g_t(z)$ et donc $T_z g.(0, p) = (t g_t(z), g_t(z)) \in E'$.

Enfin, la trivialis  tion est donn  e par les identifications $\text{hor}'(z) \simeq \mathbb{R}p$ et $\text{vert}'(z) \simeq \mathbb{R}p$ en $z = (q, p)$ qui permettent d'obtenir $E' \simeq L \times \mathbb{R}^2$ et les calculs ci-dessus donnent la forme de $T_z \varphi_t$ dans les bases naturelles. $\square$

rewrite the proof to make it more coherent.

IV.2 Fin de la preuve

Preuve: En diff  rentiant la formule obtenue dans la preuve de la Proposition 4.1 en z on obtient :

$$T_z \varphi_t = T_z g_{c(z)t} + [t T_z c] X_K(\varphi_t(z)). \quad (3)$$

Remarquons que si $v \in E_z''$ alors $T_z c.v = 0$. Ainsi sur E'' , $T_z(\varphi_t) = T_z g_t$ ne d  pend pas de la concavit   ou convexit   de h en z .

La d  composition $TT^* L = E' \oplus E''$ nous permet de s  parer E $E = E' \oplus E''$, somme symplectique et nous donne $V = V' \oplus V''$ et $\Gamma = \Gamma' \oplus \Gamma''$ d  composition en sous-fibr  s Lagrangiens de E' et E'' . Ainsi, par additivit  , $\text{ind}_\varphi(\gamma) = \text{ind}_V(\Gamma) = \text{ind}_{V'}(\Gamma') + \text{ind}_{V''}(\Gamma'')$. Par ce qui pr  c  de, seul $\text{ind}_{V'}(\Gamma')$ d  pend du caract  re connexe ou convexe de h en z . On s'att  lera donc    le calculer.

additivit   du Maslov nouveau

Si $v = (\alpha, \beta) \in E_{z'}' = \text{hor}'(z) \oplus \text{vert}'(z) \simeq \mathbb{R}^2$ alors par la Proposition 4.1.5 et l'  quation 3, la matrice $T_z \varphi_t v$ dans les bases naturelles est :

$$\begin{pmatrix} 1 & c(z)t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t(0, h''(\|p\|) - c(z)) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & h''(\|p\|)t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La Proposition 4.1.5 nous offre les trivialisations de $E' \simeq \overline{\mathbb{R}^2} \times \mathbb{R}^2$, dans laquelle $V' \simeq (0 \times \mathbb{R}) \times (0 \times \mathbb{R})$ et $\Gamma_t = \text{graph}(A_t)$ o   A_t est l'endomorphisme canoniquement associ      la matrice ci-dessus. Posons $\alpha := (0 \times \mathbb{R}) \times (0 \times \mathbb{R}) \in \Lambda(2)$ cet espace est transverse    Γ_t    tout temps $t \in [0, 1]$ donc par la Proposition-D  finition 3.1.1.3 $\text{ind}(L) = \text{ind } Q(\Gamma_1, \alpha; \Gamma_0)$. Or $Q(\Gamma_1, \alpha; \Gamma_0) = -Q(\Gamma_0, \alpha; \Gamma_1)$ donc $\text{ind}(L) = \text{coind } Q(\Gamma_0, \alpha :$

Γ_1). Soit $C : \Gamma_0 \rightarrow \alpha$ le cadre lagrangien associé à Γ_1 . L'espace Γ_0 étant la diagonale, on en déduit par un simple calcul que $C : (u_1, u_2; u_1, u_2) \in \Gamma_0 \mapsto (-h''(\|p\|)u_2, 0; 0, 0) \in \alpha$. Ainsi, pour tout $u = (u_1, u_2; u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned} Q(\Gamma_0, \alpha; \Gamma_1)u &= (-\omega_{\mathbb{R}^2} \oplus \omega_{\mathbb{R}^2})(C(u), u) \\ &= -\omega_{\mathbb{R}^2}((-h''(\|p\|)u_2, 0), (u_1, u_2)) + 0 \\ &= h''(r)u_2^2. \end{aligned}$$

Par suite, par la Proposition-Définition 3.1.3.1,

$$\begin{aligned} \text{ind}_{V'}(\Gamma') &= \text{ind } \Gamma' - \text{ind } V' \\ &= \text{coind } Q(\Gamma_0, \alpha; \Gamma_1) \\ &= \begin{cases} 1 & \text{si } h''(\|p\|) > 0 \\ 0 & \text{si } h''(\|p\|) < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, $\text{ind}_{\varphi}^{\text{concave}} z = \text{ind}_{\varphi}^{\text{convexe}} z - 1$. Ce qui conclut la preuve Proposition 4.2.

□

V La vraie vie c'est dans $\mathbb{R}^{2n}$

Soit (V, J) voisinage tubulaire de $j(L)$ dans $\mathbb{R}^{2n}$. On définit un nouveau hamiltonien $\mathbf{H}$ de flux Φ via :

$$\begin{cases} \mathbf{H} = H \circ J^{-1} & \text{sur } V \\ \mathbf{H} \equiv 0 & \text{en dehors} \end{cases}$$

.

Proposition 5.1: Si $a > c_{\text{gf}(V)}$ et $c > 0$ est distinct de la longueur de toute géodésique fermée, alors il existe $z = (p, q)$ point fixe de φ_1 tel que h est strictement convexe ou concave en $\|p\|$.

Preuve: On a que $c_-(\mathbf{H}) = 0$ car $\mathbf{H} \leq 0$ donc $c_+(\mathbf{H}) > 0$ car Φ_1 n'est pas l'identité. Par suite on a z pt fixe de Φ_1 tel que $0 < \mathcal{A}_{\mathbf{H}}(z) = c_+(\mathbf{H}) \leq c_{\text{gf}(V)}$ donc $z \in V$ et $\mathbf{H}(z) \neq a$ car sur cet ensemble $\mathcal{A}_{\mathbf{H}} = a > c_{\text{gf}(V)}$. Posons $(q, p) := J^{-1}(z)$ qui est un point fixe de φ_1 tel que $\|p\| \in]\frac{\varepsilon}{2}, \rho - \frac{\varepsilon}{2}[$ mais par ce qui précède, $h'(\|p\|)$ est la longueur d'une géodésique fermée (celle associée à z) donc nécessairement h convexe en $\|p\|$. □

Pourquoi ?

Définition 5.1: L'entier $\text{ind}_{\text{gf}} z := \text{ind } d^2 S_1(z, \xi) - \text{ind } Q_{\infty}$ ne dépend pas du choix de S_1 mais uniquement de Φ_1 .

Pourquoi ?

Proposition 5.2: Le point fixe du lemme pr  c  dent peut-  tre choisi de sorte    ce que $2n - v(z) \leq \text{ind}_{\text{gf}} z \leq 2n$ o   $v(z) := \dim(\ker d\phi_1(z) - Id)$. On remarquera que

$$v(z) = v(\gamma) + 1.$$

Preuve: Soit z un tel point fixe. On lui fait correspondre (z, ξ) point critique de S_1 tel que $c = S_1(z, \xi)$ mais par construction $H^{2n+\text{ind } Q_\infty}(S_1^{c \pm \eta}) \neq 0$. Ainsi par th  orie de Morse-Bott on a un point critique (z, ξ) de S_1 tel que $\text{ind } d^2 S_1(z, \xi) \leq 2n + Q_\infty \leq d^2 S_1(z, \xi) + \dim \ker d^2 S_1(z, \xi)$.

Ensuite, montrons que $\ker Id - d\Phi_1 \simeq \ker d^2 S_1(z, \xi)$. Posons $\Sigma := \Sigma_1$. L'application

$$i : \Sigma \rightarrow \tilde{\Gamma}_t \leq T^* \mathbb{R}^{2n} \simeq \mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^{2n}$$

$$e = (w, \xi) \mapsto \left(w, \frac{\partial S}{\partial w}(w, z) \right)$$

Faire le lien entre homologie et points critiques

est un plongement.

Tout d'abord, si $V \in \ker d^2 S_1(z, \xi)$ alors $V \in \ker d \frac{\partial S_1}{\partial \xi}(w, \xi) = T_{(w, \xi)} \Sigma$. Il suffit donc d'  tudier $d^2 S_1(w, \xi)|_{T_{(w, \xi)} \Sigma} = d \frac{\partial S_1}{\partial w}(w, \xi)|_{T_{(w, \xi)} \Sigma} = d\pi_2 \circ di(w, \xi)$.

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{R}^{2n} & \xrightarrow{\sim} & \tilde{\Gamma}_t \\ \uparrow e & \nearrow i & \\ \Sigma & & \end{array}$$

On en d  duit l'existence d'un diff  o $e = (w, \xi) : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \Sigma$ tel que $\left(\frac{z + \Phi_1(z)}{2}, z - \Phi_1(z) \right) = \left(w(z), \frac{\partial S_1}{\partial w}(w(z), \xi(z)) \right)$ (   identification pr  s). Ainsi on a $Id - d\Phi_1 = d \frac{\partial S_1}{\partial w} \circ de = d^2 S_1 \circ de$. D'o   par ce qui pr  c  de $\ker Id - d\Phi_1(z) \stackrel{di(z)}{\simeq} \ker d^2 S_1(z, \xi)$. $\square$

Proposition 5.3: On a $\inf_{\text{gf}} z = \text{ind}_\phi z + (\mu(j), \gamma)$

Preuve:

Tout d'abord, remarquons que l'application $\tau : E \rightarrow \mathbb{S}_1 \times (\mathbb{R}^{2n} \times \mathbb{R}^{2n})$ d  finie par $\tau(t, v, w) := (t, dJ(z).v, dJ(\phi_t(z)).w)$ est une trivialis  tion de E . De plus, elle v  rifie $\Gamma' = \tau(\Gamma)$. On pose alors $C := \tau^{-1}(\mathbb{S}_1 \times (\mathbb{R}^n \times 0) \times (\mathbb{R}^n \times 0))$, sous-fibr   Lagrangien de E .

D'apr  s la Proposition-D  finition 3.1.3.1,

$$\begin{aligned}
\text{ind}_C(\Gamma) &= \text{ind}(\tau(\Gamma)) - \text{ind}(\tau(C)) \\
&= \text{ind}(\Gamma') - \text{ind}(t \mapsto (\mathbb{R}^n \times 0) \times (\mathbb{R}^n \times 0)) \\
&= \text{ind}(\Gamma').
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{ind}_C(\Gamma) &= \text{ind}(\tau(\Gamma)) - \text{ind}(\tau(V)) + \text{ind}(\tau(V)) - \text{ind}(\tau(C)) \\
&= \text{ind}_V(\Gamma) - \text{ind}_C(V) \\
&= \text{ind}_\varphi(z) - \text{ind}_C(V).
\end{aligned}$$

Or par invariance de l'indice de

La métrique $\|\cdot\|$ équipe $\text{hor}(z)$ et $\text{hor}(\varphi_t(z))$ d'un isomorphisme pour tout $t \in \mathbb{S}_1$.

$$= \text{ind} \left(t \mapsto j^*(T_z L) \oplus dJ(\varphi_t(z))^{-1}() \right)$$

jsp
trop
quoi

□

Proposition 5.4: On a :

$$c(H) = \|p\| h'(\|p\|) - h(\|p\|) + \int_\gamma j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}.$$

On obtient finalement:

$$(\mu(j), \gamma) \in \begin{cases} [n - i(\gamma) - \nu(z), n - i(\gamma)] & \text{dans le cas convexe} \\ [n - i(\gamma) - \nu(z) - 1, n - i(\gamma) + 1] & \text{dans le cas concave} \end{cases} \quad (4)$$

some-
thing
about
super-
script

Propo-
sition
2.x de
Théret

Preuve: On a $c(H) = c(\mathbf{H}) = \mathcal{A}_{\mathbf{H}}(z) = \int_{t \mapsto \Phi_t(z)} \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} - \mathbf{H} dt$. Mais $\mathbf{H}$ est constant le long de l'orbite de Φ et égal à $\mathbf{H}(z) = h(\|p\|)$ donc $c(H) = \int_{t \mapsto \Phi_t(z)} \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} - h(\|p\|)$.

Puis H étant radial, on a nécessairement $\|\Phi_t(z)\| = \|p\|$ pour tout $t \in [0, 1]$. Notons C le cylindre reliant γ (vu dans la section nulle de T^*L) à l'image de $t \mapsto \varphi_t(z)$. On obtient d'une part, par la formule de Stokes et la nullité de λ_L sur la section nulle

$$\int_C \omega_{\text{can}} = \int_C d\lambda_L = \int_{t \mapsto \varphi_t(z)} \lambda_L - \int_\gamma \lambda_L = \int_{t \mapsto \varphi_t(z)} \lambda_L.$$

Puis J étant un symplectomorphisme, $\int_C \omega_{\text{can}} = \int_{J_* C} J^* d\lambda_{\mathbb{R}^{2n}} = \int_{t \mapsto \Phi_t(z)} \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} - \int_\gamma j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}.$

$$\text{Or } \int_{t \mapsto \Phi_t(z)} \lambda_L = \int_0^1 \|p\| \dot{q}_t = \|p\| \ell(\gamma) = \|p\| h'(\|p\|).$$

$$\text{Enfin, } c(H) = \|p\| h'(\|p\|) - h(\|p\|) + \int_\gamma j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}.$$

Cylin-
dre

L'  quation 4 d  coule de l'  galit   pr  c  dente et de la Proposition 5.2, la Proposition 5.3 et la Proposition 4.2. $\square$

VI Passage    la limite

Les fonctions h et H d  finies pr  c  demment d  pendent des param  tres ρ, c et ε . Dans cette partie nous supposons les deux premiers fix  s et faisons tendre ε vers 0. Notons h_ε (resp. H_ε) la fonction h (resp. H) associ  es au param  tre $\varepsilon > 0$.

Proposition-D  finition 6.1: La quantit  

$$K(\rho, c) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} c(H_\varepsilon)$$

est bien d  finie.

Preuve: Les fonctions $\varepsilon \mapsto H_\varepsilon$ et $H \mapsto c(H)$ sont d  croissantes (d'apr  s la [pour la seconde) donc $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} c(H_\varepsilon) = \sup_{\varepsilon > 0} c(H_\varepsilon)$ qui est major   par $c_{\text{gf}}(V)$. $\square$

La capacit   est d  croissante.

Proposition 6.1: Il existe une g  od  sique ferm  e γ sur L v  rifiant 4 telle que $K(\rho, c)$ v  rifie :

$$K(\rho, c) = \begin{cases} \rho c + \int_\gamma j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} & \text{dans le cas convexe} \\ \rho \ell(\gamma) + \int_\gamma j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} & \text{dans le cas concave} \end{cases}$$

Preuve: Fixons $(\varepsilon_m)_{m \in \mathbb{N}}$ suite de r  els d  croissants vers 0. Par la Proposition 5.4 on obtient, pour tout $m \in \mathbb{N}$, une g  od  sique ferm  e γ_m , et un r  el $r_m \in]\frac{\varepsilon_m}{2}, \varepsilon_m[\cup]\rho - \varepsilon_m, \frac{\rho \varepsilon_m}{2}[$ tel que

$$c(H_{\varepsilon_m}) = r_m h'(r_m) - h(r_m) + \int_{\gamma_m} j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}. \quad (5)$$

Quitte    extraire, on peut supposer $\forall m \in \mathbb{N}, r_m \in]\frac{\varepsilon_m}{2}, \varepsilon_m[$ (cas convexe) ou $\forall m \in \mathbb{N}, r_m \in]\rho - \varepsilon_m, \frac{\rho \varepsilon_m}{2}[$.

Dans les deux cas, on a $\gamma_m = h'(r_m) \leq c$. Ainsi par [on peut supposer que la suite $(\gamma_m)_{m \in \mathbb{N}}$ converge vers une g  od  sique ferm  e γ (qui v  rifie donc 4).

majo-
ration
de la longueur

Dans le cas convexe, $r_m \rightarrow 0$, $\sup_{m \in \mathbb{N}} h'(r_m) \leq c < \infty$ et $h_{\varepsilon_m}(\varepsilon_m) = h_{\rho - \varepsilon} - c(\rho_2 \varepsilon_m) \rightarrow -c\rho$ et dans le cas concave, on a $r_m \rightarrow \rho$, $h'(r_m) = \ell(\gamma_m) \rightarrow \ell(\gamma)$. et $h_{\varepsilon_m}(r_m) \rightarrow 0$. L'  galit   demand  e d  coule du passage    la limite dans 5. $\square$

com-
 capacit  
de l'ensembl
des g  od  s
de longueur
born  e

VII D  mo du th  or  me

VII.1 C'est la vraie preuve du th  or  me let's goooooooo !!!

D  finition 7.1.1: On appelle **capacit   des fonctions g  n  ratrices** et l'on note $c_{\text{gf}}(L)$ la borne inf  rieur des capacit  s gf des voisinages ouverts de $j(L)$ dans $\mathbb{R}^{2n}$.

Proposition-D  finition 7.1.1: Le c  l  bre th  or  me de , nous permet d'  tendre le plongement $j : L \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$ en un plongement $J : U \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ o   U d  fini sur un voisinage ouvert U de L dans T^*L . Le couple (U, J) est appel   **voisinage de Weinstein**.

D  finition 7.1.2: Soit μ un repr  sentant de la classe de Maslov de j et (U, J) un voisinage de Weinstein. On appelle **μ -  paisseur de U** la quantit  

$$\|U\|_{\mu} := \sup\{s \geq 0; -s\mu(L) \subseteq U\}$$

o   $\mu(L) = \{\mu_x \mid x \in L\} \subseteq T^*L$.

On note de plus

$$w(L, j) := \sup_{\mu, U} \|U\|_{\mu}.$$

Remarque 7.1.1: La quantit   $\|U\|_{\mu}$ d  pend du choix du repr  sentant μ de la classe de Maslov.

trouver un nom convenable pour la gf capacity

Weinstein is Maslov Class

Theorem 7.1.1: Soit L vari  t   de dimension n et $j \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$ plongement Lagrangien, pour $n \geq 2$.

1. Si $L = \mathbb{T}^n$ la capacit   v  rifie :

$$c_{\text{gf}}(\mathbb{T}^n, j) \geq 2w(\mathbb{T}^n, j) > 0.$$

1. Si L admet une m  trique de courbure sectionnelle strictement n  gative alors

$$c_{\text{gf}}(L) \geq (n - 1)w(L, j) > 0.$$

1. Plus g  n  ralement, si $(L_1, j_1), \dots, (L_m, j_m)$ sont des plongements Lagrangiens $L = L_1 \times \dots \times L_m$ et $j = (j_1, \dots, j_m)$ alors

$$c_{\text{gf}}(L) \geq (n - m)w(L, j) > 0.$$

trou-
ver
nom
gfc

Ce r  sultat permet imm  diatement de prouver le r  sultat suivant :

Theorem 7.1.2 (Chameau Lagrangien): Si $j : L \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ est l'un des plongements ci-dessus, alors pour tout $\eta \in [0, c_{\text{gf}}(L)]$ il n'existe pas d'isotopie symplectique $(\Phi_t)_{t \in [0,1]}$    support compact dans $\Sigma_\eta := \{z \in \mathbb{R}^{2n} \mid y_n = 0 \text{ et } \|z\| \geq \eta\}$ telle que $\Phi_1(j(L)) \subseteq \mathbb{R}^{2n}_+$.

Preuve: Une telle isotopie Φ d  placerait n  cessairement l'image $J(U)$ d'un voisinage de Weinstein (J, U) de j . Laquelle est de capacit   $c(J(U)) \geq c_{\text{gf}}(L)$ ce qui est impossible par le $\square$.

VII.2 Oui bonjour serait-il possible d'obtenir un titre pour cette partie

Chameau
sym-
plec-
tique

On note σ la classe de Liouville du plongement j . $\sigma(\gamma) := \int_\gamma j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}$ la classe de Liouville.

fixer μ

Soit $\rho > 0$ suffisamment petit pour que $B_\rho \subseteq U$. On pose : $\|U\|_{\mu, \rho} = \sup\{s \geq 0, -s\mu(L) + B_\rho \subseteq U\}$.

.

Pour $s \in [0, \|U\|_{\mu, \rho}]$ on consid  re le symplectomorphisme

moving
crown

$$\begin{aligned} T_s : T^*L &\rightarrow T^*L \\ (q, p) &\mapsto (q, p - s\mu(q)) \end{aligned}$$

qui permet de d  finir le plongement lagrangien

$$j_s := J \circ (T_s)_L : L \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$$

qui s'  tend en $J_s : \mathbb{B}_\rho \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n}$.

Par la Proposition 6.1, on obtient une application $s \in [0, \|U\|_{\mu, \rho}] \mapsto K_s(\rho, c) \in \mathbb{R}$, continue par . On dispose, de plus, de γ_s g  od  sique ferm  e de longueur $\ell(\gamma_s) \leq c$ telle que

$$K_{s(\rho, c)} = \begin{cases} \rho \ell(\gamma_s) + \sigma(\gamma_s) - s \mu(\gamma_s) & \text{dans le cas convexe} \\ \rho c + \sigma(\gamma_s) - s \mu(\gamma_s) & \text{dans le cas concave.} \end{cases}$$

La ca-
pac-
it   est
con-
tinue

En effet, par le m  me argument qu'utilis   dans la preuve de Proposition 5.4 sur le cylindre d  limit   par γ_s et $T_s(\gamma_s)$ dans le fibr   cotangent $\int_{\gamma_s} j_s^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} - \int_{\gamma_s} j^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} = \int_{\gamma_s} T_s^*(J^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}}) - \int_{\gamma_s} J^* \lambda_{\mathbb{R}^{2n}} = \int_{\gamma_s} T_s^* \lambda_L - \int_{\gamma_s} \lambda_L = -s \mu(\gamma_s)$.

VII.3 Cas courbure strictement n  gative

Si L admet une m  trique de courbure strictement n  gative alors pour toute g  od  sique ferm  e γ , $i(\gamma) = \nu(\gamma) = 0$. Ainsi pour notre point fixe z , $\nu(z) = 1$ et donc par 4 :

Pourquoi ?

$$\begin{cases} \mu(\gamma) \in [n - 1, n] & \text{dans le cas convexe} \\ \mu(\gamma) \in [n, n + 1] & \text{dans le cas concave.} \end{cases}$$

Mais par compacit   de l'ensemble des g  od  siques de longueur major  e par c , les quantit  s $\ell(\gamma_s)$ et $\sigma(\gamma_s)$ ne prennent qu'un nombre fini de valeurs . Ainsi, la fonction $s \mapsto K_s(\rho, c)$ est affine par morceaux de pentes $\leq -(n - 1)$. Par suite $0 < K_s(\rho, c) \leq K_0(\rho, c) - (n - 1)s$ pour tout $s \in [0, \|U\|_{\mu, \rho}]$. En particulier, $K_0(\rho, c) \geq (n - 1)\|U\|_{\mu, \rho}$. Par suite, puisque $\|U\|_{\mu, \rho} \rightarrow \|U\|_\mu$ quand ρ tend vers 0 :

Pourquoi ?

$$K(j) := \lim_{\rho \rightarrow 0} \lim_{c \rightarrow \infty} K(\rho, c) \geq (n - 1)\|U\|_\mu.$$

On peut alors prouver le th  or  me. Par la formule ci-dessus, on a pour tout $\delta > 0$, deux nombres r  els $\rho > 0$ et $c > 0$ tels que $J(B_\rho) \subseteq V$ et $K_0(\rho, c) > (n - 1)\|U\|_\mu - \delta$. On a donc, par d  finition de $K_0(\rho, c)$, un hamiltonien H    support compact et inclus dans V de capacit   $c(H) \geq (n - 1)\|U\| - 2\delta$. D'o   finalement :

$$c_{\text{gf}}(V) \geq (n - 1)\|U\|_\mu.$$

On obtient alors le r  sultat souhait   par passage    la borne sup  rieure :

$$c_{\text{gf}}(L, j) \geq (n - 1)w(L, j) > 0.$$

VII.4 Cas d'un produit de sous-vari  t  s de courbure strictement n  gative

Plus g  n  ralement, si $(L_1, j_1), \dots, (L_m, j_m)$ sont des plongements Lagrangiens de vari  t  s admettant une m  trique de courbure strictement n  gative et que

(L, j) est le plongement produit. Alors comme pr  c  demment l'indice de Morse de tout g  od  sique $i(\gamma)$ est nul mais leur nullit   vaut $v(\gamma) = m - 1 > 0$. Ainsi

$$\begin{cases} \mu(\gamma) \in [n - m, n] & \text{dans le cas convexe} \\ \mu(\gamma) \in [n - m + 1, n + 1] & \text{dans le cas concave} \end{cases}$$

Pourquoi ?

On proc  de alors comme pr  c  demment et puisque $m < n$ pour obtenir $c_{\text{gf}}(V) \geq (n - m)\|U\|_\mu$, et passage    la borne sup  rieures :

$$c_{\text{gf}}(L, j) \geq (n - m)w(L, j) > 0.$$

VII.5 Cas du tore

Tout d'abord, muni de la m  trique plate le tore v  rifie $i(\gamma) = 0$ et $v(\gamma) = 0$ pour toutes les g  od  siques closes . Ainsi on a :

$$\begin{cases} \mu(\gamma) \in [0, n] & \text{dans le cas convexe} \\ \mu(\gamma) \in [1, n + 1] & \text{dans le cas concave} \end{cases}$$

Pourquoi ?

La formule importante est

$$K_{s(\rho, c)} = \begin{cases} \rho \ell(\gamma_s) + \sigma(\gamma_s) - s\mu(\gamma_s) & \text{dans le cas convexe} \\ \rho c + \sigma(\gamma_s) - s\mu(\gamma_s) & \text{dans le cas concave} \end{cases}$$

Remarque 7.5.1: Puisque $\mathbb{T}^n$ est orientable, on a n  cessairement $\mu(\gamma) \in 2\mathbb{Z}$ donc

Fixons ρ et   tudiions les variations de $K(\rho, c)$ en fonction de c .

Pourquoi ?

On pose :

- $C' = \{c > 0 \mid K(\rho, c) \text{ s'  crit } \rho c + \sigma(\gamma) \text{ uniquement.}\}$
- $C'' = \{c > 0 \mid K(\rho, c) \text{ s'  crit } \rho \ell(\gamma) + \sigma(\gamma) \text{ uniquement.}\}$
- C'' leur compl  mentaire dans $\mathbb{R}_+^*$.

Remarquons que C' et C'' sont des ouverts et que C'' est un ensemble de points isol  . En effet, si $c \in C''$ alors on a $K(\rho, c) = \rho c + \sigma(\gamma_1) = \rho \ell(\gamma_2) + \sigma(\gamma_2)$.

On a $K(\rho, c) = \rho c + \text{cst}$ sur C' et $K(\rho, c) = \text{cst}$ sur C'' . Ainsi n  cessairement $\lambda(C') \leq \frac{c_{\text{gf}}(V)}{\rho}$. Pourquoi ?

Un point $c_s \in C_s'''$ s'  crit $c_0 + s(\mu(\gamma_1) - \mu(\gamma_2))$ avec $c_0 \in C'''$, par existence.