

Enkät 1

- Sjukdom: Scenario 6, Scenario 19
- Akut smärta: Scenario 2, Scenario 14, Scenario 16
- Stress/Sömn: Scenario 1, Scenario 4
- Träningsvärk: Scenario 12, Scenario 24
- Motivation: Scenario 3, Scenario 8
- Livspussel: Scenario 15, Scenario 5

Enkät 2 (13 frågor)

- Sjukdom: Scenario 28, Scenario 35
- Akut smärta: Scenario 18, Scenario 20
- Stress/Sömn: Scenario 7, Scenario 9, Scenario 11
- Träningsvärk: Scenario 27, Scenario 30
- Motivation: Scenario 10, Scenario 23
- Livspussel: Scenario 17, Scenario 32

Enkät 3 (13 frågor)

- Sjukdom: Scenario 41, Scenario 47
- Akut smärta: Scenario 22, Scenario 26, Scenario 38
- Stress/Sömn: Scenario 13, Scenario 21, Scenario 25
- Träningsvärk: Scenario 36, Scenario 44
- Motivation: Scenario 33
- Livspussel: Scenario 37, Scenario 42

Enkät 4 (13 frågor)

- Sjukdom: Scenario 57
- Akut smärta: Scenario 39, Scenario 46, Scenario 56
- Stress/Sömn: Scenario 29, Scenario 31, Scenario 34
- Träningsvärk: Scenario 50
- Motivation: Scenario 45, Scenario 48
- Livspussel: Scenario 43, Scenario 51, Scenario 52

Enkät 5 (13 frågor)

- Sjukdom: Scenario 63
- Akut smärta: Scenario 58, Scenario 64
- Stress/Sömn: Scenario 40, Scenario 55, Scenario 59, Scenario 65
- Träningsvärk: Scenario 54
- Motivation: Scenario 49, Scenario 60
- Livspussel: Scenario 53, Scenario 61, Scenario 62

Sjukdom & infektion

Scenario 6

Profil: 35 år, nybörjare

Planerat pass: Lugn distans 40 min

Status: Ont i halsen och lätt feber

Alternativ:

- A) Kör som planerat
- B) Kör ett kortare pass
- C) Lugn promenad endast
- D) Vila
- E) Annat + Motivering

Scenario 19

Profil: 22 år, tränar för att förbättra miltid, veckovolym 40 km

Planerat pass: Intervaller – 5×1000 m (10 km-fart)

Status: Låg vätskenivå efter en varm dag igår, mörk urin på morgonen och lätt huvudvärk.

Pulsen normal, men känner sig seg.

Alternativ:

- A) Kör 5×1000 m
- B) Kör 3×1000 m i lugnare fart
- C) Kör ett lugnt distanspass 30 min
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 28

Profil: 19 år, terränglöpare, veckovolym 35 km

Planerat pass: Intervaller – 6×800 m

Status: Ont i halsen, lätt feberkänsla och frusen.

Alternativ:

- A) Kör 6×800 m som planerat
- B) Kör 3×800 m i mycket lugn fart
- C) Byt till 20 min mycket lugn promenad
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 35

Profil: 42 år, motionslöpare, tränar för 10 km, 30 km/vecka

Planerat pass: 12 km distans

Status: Lätt halsont sedan morgonen, känns tung i kroppen.

Alternativ:

- A) Kör 12 km som planerat
- B) Kör 6–8 km väldigt lugnt
- C) Byt till promenad 40–50 min
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 41

Profil: 24 år, tränar för 5 km, 45 km/vecka

Planerat pass: 12×45 sek backintervaller

Status: Dag 1–2 i menstruationscykeln. Lätt kramp i magen, tyngre benkänsla, men ingen smärta. Puls och sömn normal.

Alternativ:

A) Kör som planerat

B) Kör 8×45 sek i lugnare intensitet

C) Kör 25–30 min distans

D) Vila

E) Annat + motivering

Scenario 47

Profil: 36 år, tränar 5 pass/vecka, terränglöpning

Planerat pass: Backpass 15×45 sek

Status: Sovit normalt men har lätt huvudvärk

Alternativ:

A) Kör passet

B) Kör 8×45 sek i lugnare intensitet

C) Kör 25 min lugn distans

D) Vila

E) Annat + motivering

Akut smärta & Skadekänning

Scenario 2

Profil: 27 år, löpare med 10 km mål

Planerat pass: 14 km långpass

Status: Knäkänningar efter senaste passet, RPE 7/10

Alternativ:

A) Kör 14 km som planerat

B) Kör 10 km lugnare

C) Byt till cykel 45 min lätt

D) Vila helt

E) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Scenario 14

Profil: 15 år, ungdom, tränar för allmän utveckling

Planerat pass: Teknik + strides 8×100 m

Status: Ont i knät när hen springer i uppförsbackar.

Alternativ:

- A) Kör passet som planerat
- B) Kör teknikdelen men hoppa över strides
- C) Byt till enbart promenad/lätt cykel
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 16

Profil:

19 år, tävlar på 400 m, veckovolym 20 km

Planerat pass: 10×200 m sprint

Status: Känning i baksida lår, smått öm vid tryck.

Alternativ:

- A) Kör 10×200 m
- B) Kör 5×200 m lättare
- C) Teknikpass utan sprint
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 18

Profil: 33 år, tränar för sub45 på 10 km, veckovolym 35 km

Planerat pass: 4×8 min tröskel

Status: Upplevde krampkänning i baksida lår under gårdagens löppass.

Alternativ:

- A) Kör 4×8 min
- B) Kör 2×8 min väldigt kontrollerat
- C) Byt till 20–30 min lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 20

Profil: 33 år, motionär, tränar 3 pass/vecka

Planerat pass: Långpass – 14 km

Status: Smärta på utsida knä efter förra långpasset (misstänkt löparknä), känns vid löpning.

Alternativ:

- A) Kör 14 km som planerat
- B) Kör 10 km i lugn fart
- C) Byt till 40 min cykel/låg belastning
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 22

Profil: 28 år, tränar för Göteborgsvarvet, veckovoly 50 km

Planerat pass: Tempopass – 20 min sammanhängande tröskel

Status: Öm hälsena som känns stel på morgonen och ömmar lätt vid löpning.

Alternativ:

- A) Kör 20 min tröskel som planerat
- B) Kör 10–12 min tröskel i lugnare fart
- C) Byt till 30 min mycket lugn distans på mjukt underlag
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 26

Profil: 29 år, erfaren löpare, tränar för 10 km, veckovoly 40 km

Planerat pass: Tröskel – 3×8 min

Status: Huggande smärta i höger höft varje gång foten sätts i marken.

Alternativ:

- A) Kör 3×8 min som planerat
- B) Kör 2×8 min i lugnare fart
- C) Byt till lågintensiv cykel/crosstrainer 30–40 min
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 38

Profil: 27 år, tränar för 10 km, 55 km/vecka

Planerat pass: 12 km distans

Status: Senaste passet upplevdes lätt hugg i höger höftkula vid varje tredje steg på uppvärmning. Smärtan försvann när tempot höjs marginellt.

Alternativ:

- A) Kör passet som planerat
- B) Kör 8 km i lugnare fart
- C) Byt till 30 min cykel
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 39

Profil: 33 år, tränar för maraton, 80 km/vecka

Planerat pass: 28 km långpass

Status: Känsla av stelhet i hälsenan efter en vecka med mycket asfalt. Inga smärttoppar, men obehag i trampsteget.

Alternativ:

- A) Kör 28 km
- B) Kör 18–20 km på mjukt underlag
- C) Kör 12 km + 20 min crosstrainer
- D) Vila

E) Annat + motivering

Scenario 46

Profil: 23 år, tränar inför 800 m, 40 km/vecka

Planerat pass: Sprint-intervaller 12×150 m

Status: Lätt stel i hälsenan vid de första stegen på morgonen, släpper efter 2–3 min

Alternativ:

A) Kör 12×150 m

B) Kör 6×150 m försiktigt

C) Byt till 20–25 min cykel

D) Vila

E) Annat + motivering

Sömnbrist, Stress & Central Utmattning (CNS)

Scenario 1

Profil: 19 år, motionär, tränar 4 pass/vecka

Planerat pass: Intervaller 8×3 min

Status: Sovit 4 timmar, RPE 8/10 igår, lätt huvudvärk

Alternativ:

A) Kör passet som planerat

B) Halvera intervallerna (4×3 min)

C) Byt till 30 min lugn distans

D) Vila helt

E) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Scenario 4

Profil: 30 år, tränar för halvmaraton

Planerat pass: Tröskelpass 3×10 min

Status: Förhöjd puls 10 bpm över normalt på lugna pass, RPE högre än vanligt

Alternativ:

A) Kör tröskelpasset

B) Kör bara 2×10 min

C) Kör 40 min lätt distans

D) Vila

E) Annat + Motivering

Motivering (valfritt)

Scenario 7

Profil: 16 år, medeldistansare

Planerat pass: 6×800 m intervaller

Status: Social stress, mycket i skolan men sovit 8 h, RPE 4/10

Alternativ:

- A) Kör passet
- B) Kör 4×800 m
- C) Lugn jogg
- D) Vila
- E) Annat + Motivering

Scenario 9

Profil: 26 år, tränar för maraton

Planerat pass: 24 km långpass

Status: Åt dåligt under gårdagen (bara en måltid), tränade sent och hann inte återhämta ordentligt. Känner låg energi på morgonen trots normal sömn.

Alternativ:

- A) Kör 24 km
- B) Kör 18 km
- C) Kör 12 km
- D) Vila
- E) Annat + Motivering

Scenario 11

Profil: 17 år, tränar inför 5 km-tävling, veckovolym 22 km

Planerat pass: 8×400 m intervaller (5 km-fart)

Status: Sovit 5 timmar, känner sig seg och tung i benen.

Alternativ:

- A) Kör 8×400 m som planerat
- B) Kör 6×400 m i lugnare fart
- C) Kör 3×400 m mycket lugnt
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 13

Profil: 31 år, tränar för halvmaraton, veckovolym 45 km

Planerat pass: 3×10 min tröskel

Status: Hög vilopuls i morse, Garmin anger "Hög stress".

Alternativ:

- A) Kör 3×10 min som planerat
- B) Kör 2×10 min lättare
- C) Byt till 20–30 min lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 21

Profil: 17 år, tränar inför terrängtävling, veckovolym 25 km

Planerat pass: Backintervaller – 12×45 sek

Status: Puls stiger mycket snabbt under uppvärmning och ligger 15 bpm högre än normalt vid samma tempo.

Alternativ:

- A) Kör 12×45 sek som planerat
- B) Kör 6×45 sek i lugnare ansträngning
- C) Byt till 25–30 min lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 25

Profil: 25 år, tränar för sub40 på milen, veckovolym 55 km

Planerat pass: Fartlek – 45 min med flera snabbare inslag

Status: Senaste tre passen har pulsen legat 10–12 bpm högre än normalt vid samma tempo.

Alternativ:

- A) Kör 45 min fartlek som planerat
- B) Kör 30 min fartlek med färre/lugnare fartökningar
- C) Byt till 35–40 min lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 29

Profil: 34 år, tränar inför halvmaraton, veckovolym 50 km

Planerat pass: Tröskel – 4×10 min

Status: Har haft hög träningsvolym i fem dagar. Benen känns "slitna" trots bra sömn. Ingen smärta, men mycket låg explosivitet vid morgonens trappgång. HRV är låg.

Alternativ:

- A) Kör 4×10 min som planerat
- B) Kör 3×10 min i något lugnare fart
- C) Byt till 40 min lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 31

Profil: 35 år, tränar för bättre allmänkondition, veckovolym 25 km

Planerat pass: Lugn distans – 60 min

Status: Höga pollenhalter idag, tung andning och rinnande ögon. Ingen feber och pulsen normal, men känner sig "tung".

Alternativ:

- A) Kör 60 min som planerat

- B) Kör 40 min i lugnare fart
- C) Kör 20–30 min mycket lugnt
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 34

Profil: 21 år, tränar för 800 m, veckovolym 55 km

Planerat pass: 6×400 m i tävlingsfart

Status: Sovit 4h, vilopuls +7 bpm, mycket mental stress.

Alternativ:

- A) Kör passet som planerat
- B) Kortare intervaller (4×400 m)
- C) Byt till 6–8 km lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 40

Profil: 27 år, tränar för 10 km, 55 km/vecka

Planerat pass: 12 km distans

Status: Sovit 5–6 timmar tre nätter i rad. Morgonpuls 10 bpm över normalt. Känner sig stressad av arbete men ingen smärta från föregående pass.

Alternativ:

- A) Kör 12 km som planerat
- B) Kör 8 km lugnt
- C) Kör 30 min lugnt + avsluta
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Muskulär Trötthet & Träningsvärk (DOMS)

Scenario 12

Profil: 25 år, tränar för att förbättra 10 km-tid, veckovolym 28 km

Planerat pass: Lågintensiv distans 7 km

Status: Kraftig träningsvärk i framsida lår efter styrketräning.

Alternativ:

- A) Kör 7 km som planerat
- B) Kör 5 km väldigt lugnt
- C) Kör 3 km lugn jogg/gång
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 24

Profil: 45 år, tränar inför första halvmaraton, veckovolym 45 km

Planerat pass: Långpass – 20 km

Status: Garmin visar "Recovery time: 48 h" efter gårdagens hårda pass, benen känns tunga.

Alternativ:

- A) Kör 20 km som planerat
- B) Kör 15 km i lugnare fart
- C) Kör 10 km lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 27

Profil: 16 år, tränar 3 pass/vecka för allmän kondition

Planerat pass: Lugn distans – 30 min

Status: Har tydlig träningsvärk men säger sig vara motiverad att träna.

Alternativ:

- A) Kör 30 min som planerat
- B) Kör 20 min i lugnare fart
- C) Kör 10–15 min mycket lugnt eller promenad/jogg
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 30

Profil: 28 år, tränar för 10 km, veckovolym 45 km

Planerat pass: Intervaller – 4×1600 m

Status: Kraftig träningsvärk i baksida lår, svårt att sträcka ut benet ordentligt.

Alternativ:

- A) Kör 4×1600 m som planerat
- B) Kör 2×1600 m i lugnare fart
- C) Byt till 30 min mycket lugn distans eller cykel
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 36

Profil: 25 år, satsar på 5 km, veckovolym 60 km

Planerat pass: 3×10 min tröskel

Status: Kraftig träningsvärk i framsida lår efter styrkepass, svårt att gå nedför trappor.

Alternativ:

- A) Kör tröskelpasset som planerat
- B) Kör 2×10 min istället
- C) Byt till 40 min lugn jogg

- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 44

Profil: 29 år, tränar för milen sub40, 55 km/vecka

Planerat pass: 5×2 km tröskel

Status: Haft en vecka med 3 mycket tuffa pass, benen känns "stumma", men ingen smärta

Alternativ:

- A) Kör passet som planerat
- B) Kör 3×2 km i lugnare tröskelfart
- C) Byt till 40 min lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 50

Profil: 25 år, erfaren löpare, tränar 65 km/vecka

Planerat pass: 90 min långt pass

Status: Lätt stel i baksida lår efter snabbare pass tidigare i veckan, 2/10 smärta

Alternativ:

- A) Kör 90 min
- B) Kör 60 min
- C) Kör 45 min lugnt
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Motivation, Psykologi & Formtoppning

Scenario 3

Profil: 22 år, tävlar 5 km om 9 dagar

Planerat pass: Lugn distans 40 min

Status: Sovit 9 timmar, RPE 3/10 senaste passet, mycket pigg

Alternativ:

- A) Behåll passet
- B) Lägg in 4×20 sek strides i slutet
- C) Gör passet lite snabbare än vanligt
- D) Byt till kortare intervaller
- E) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Scenario 8

Profil: 20 år, tävlar 1500 m

Planerat pass: Tröskel 3×8 min

Status: Peakform, RPE lågt, god återhämtning, en vecka innan tävling

Alternativ:

- A) Kör 3×8 min
- B) Kör 2×8 min
- C) Lägg in lätt fartökning i slutet
- D) Byt till lugn distans
- E) Annat + Motivering

Scenario 10

Profil: 23 år, nyss persat 5 km

Planerat pass: Lugn distans 45 min

Status: Sovit bra, RPE 3/10, senaste veckorna gått mycket bra

Alternativ:

- A) Behåll passet
- B) Lägg in 5×1 min fartökningar
- C) Gör hela passet 10 sek/km snabbare
- D) Gör ett kort tröskelpass
- E) Annat + Motivering

Scenario 23

Profil: 14 år, ny inom löpning, tränar 2–3 gånger/vecka

Planerat pass: Lugn distans – 6 km

Status: Mycket trött efter skoldagen och vill helst inte träna.

Alternativ:

- A) Kör 6 km som planerat
- B) Kör 4 km i lugn fart
- C) Kör 2 km mycket lugnt eller gång/jogg
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 33

Profil: 40 år, tränar inför halvmaraton, veckovolym 50 km

Planerat pass: Tröskel – 5×6 min

Status: Har redan genomfört 4 hårda pass de senaste 6 dagarna, känner sig trött men "vill inte missa passet".

Alternativ:

- A) Kör 5×6 min som planerat
- B) Kör 3×6 min i lugnare fart
- C) Byt till 40 min lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 45

Profil: 41 år, motionär, tränar 4 pass/vecka

Planerat pass: 12 km långsamt distanspass

Status: Sovit mycket bra, men kroppen känns "tung" och saknar driv, ovanligt låg motivation

Alternativ:

A) Kör 12 km

B) Kör 8 km

C) Kör 5 km lugnt

D) Vila

E) Annat + motivering

Scenario 48

Profil: 14 år, nybörjarlöpare

Planerat pass: 4 km lugn distans

Status: Känner sig mentalt trött efter skola, låg motivation men ingen fysisk trötthet

Alternativ:

A) Kör 4 km

B) Kör 2–3 km i lugn fart

C) Kör 10–15 min lugn jogg

D) Vila

E) Annat + motivering

Scenario 49

Profil: 30 år, tränar 6 pass/vecka, tävling om 3 dagar

Planerat pass: 8 km distans med 4×20 sek strides

Status: Märker att pulsen är ovanligt hög (8–10 bpm) på morgonens promenad

Alternativ:

A) Kör passet

B) Kör 8 km utan strides

C) Kör 5 km lugnt

D) Vila

E) Annat + motivering

Yttre Miljö & Livspussel

Scenario 5

Profil: 17 år, juniorlöpare

Planerat pass: Backintervaller 10×30 sek

Status: Väldigt stressad dag, endast 25 min tid, RPE 5/10

Alternativ:

A) Kör backintervallerna ändå

B) Halvera passet

C) Lugn 20 min jogg

D) Vila

E) Annat + Motivering

Scenario 15

Profil: 42 år, motionär, tränar 3 ggr/vecka

Planerat pass: Långpass 16 km

Status: Världigt varmt ute (29°C), känner sig tung och trött.

Alternativ:

- A) Kör 16 km som planerat
- B) Kör 12 km i lugnare fart
- C) Kör 8 km lugnt
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 17

Profil: 13 år, ny på löpning, tränar 2–3 ggr/vecka

Planerat pass: Lugn distans 5 km

Status: Ont i magen och låg energi efter skoldagen.

Alternativ:

- A) Kör 5 km
- B) Kör 3 km lugnt
- C) Kör 1–2 km lugnt eller promenad
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 32

Profil: 24 år, tränar inför 10 km lopp, veckovolym 35 km

Planerat pass: Intervaller – 5×1200 m

Status: Stressad, har ätit dåligt under dagen och känner låg energi.

Alternativ:

- A) Kör 5×1200 m som planerat
- B) Kör 3×1200 m i kontrollerad fart
- C) Byt till 30 min lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 37

Profil: 16 år, ungdomslöpare, tränar 3–4 pass/vecka

Planerat pass: 5 km testlopp

Status: Lätt smärta i armbågen efter skola/idrott, inte relaterat till löpning men distraherad och trött.

Alternativ:

- A) Kör testloppet
- B) Genomför 3 km i kontrollerad fart
- C) Byt till 25–30 min lugn distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 42

Profil: 32 år, tränar för halvmaraton, 50 km/vecka

Planerat pass: 14 km distans

Status: Sovit 6 timmar, pollenhalter höga, ovanligt tung andning på morgonpromenaden

Alternativ:

A) Kör 14 km som planerat

B) Kör 10 km i lugnare fart

C) Kör 6 km väldigt lugnt

D) Vila

E) Annat + motivering

Scenario 43

Profil: 18 år, 1500 m-löpare, tränar 5–6 pass/vecka

Planerat pass: 10×300 m intervaller

Status: Stressad, låg aptit senaste dygnet, energin känns låg

Alternativ:

A) Kör 10×300 m

B) Kör 6×300 m i kontrollerad fart

C) Kör 25 min lugn distans

D) Vila

E) Annat + motivering

Scenario 51

Profil: 27 år, tränar inför Göteborgsvarvet, 55 km/vecka

Planerat pass: 12 km distans med 5×20 sek progressiva strides

Status: Dag 1 av menstruationen. Lätt mensvärk och ovanligt tunga ben men ingen skarp smärta. Normal vilopuls och normal sömn.

Alternativ:

A) Kör 12 km som planerat

B) Kör 8 km utan strides

C) Kör 5–6 km mycket lugnt

D) Vila

E) Annat + motivering

Scenario 52

Profil: 19 år, tävlar på 1500 m, tränar 6 pass/vecka

Planerat pass: 8×600 m i tröskelfart

Status: Mitten av menstruationscykeln (dag 8–12). Känner sig pigg och återhämtad, men gick lite väl hårt på styrkepasset dagen innan och är lätt stel i framsida lår.

Alternativ:

A) Kör 8×600 m som planerat

B) Kör 6×600 m

C) Kör 25–30 min lugn distans

- D) Vila
- E) Annat + motivering

Scenario 53

Profil: 30 år, tränar för milen sub45, 40 km/vecka

Planerat pass: Backintervaller 12×45 sek

Status: I den del av menstruationscykeln där ledrörligheten kan öka (runt ägglossning).

Känner lätt instabilitet i knäna men ingen smärta. Energi och puls normala.

Alternativ:

- A) Kör 12×45 sek backe
- B) Kör 8×45 sek med fokus på teknik
- C) Byt till 30 min progressiv distans
- D) Vila
- E) Annat + motivering

Profil 1: Vera, 25 år – "Den seriösa sub-eliten"

Bakgrund: Hög träningsmotivation, satsar på 3000/5000m löpning. Spenderar mycket tid på gymmet för att bygga upp sig (tung styrketräning). Goda kostvanor.

Baslinje: Genomsnittligt HRV: 120. VO2 max: 65. Vilopuls (RHR): 40. Veckovolym: 70 km.

Situation 1 (Central trötthet vs. Muskulär fräschör)

Status: Vaknade med ett HRV på 90 samt RHR på 55. Har haft ett högt träningstempo senaste veckan med både tunga intervallpass och tunga lyft. Känner sig trött (centralt), men musklerna känns utvilade.

Dagens pass: VO2 max-intervaller, ca 60 min totalt.

Alternativ:

- A) Kör VO2 max-passet som planerat, musklerna är ju fräscha.
- B) Kör passet men korta ner tiden i VO2 max-zonen (t.ex. halvera antalet intervaller).
- C) Byt ut passet till 45–60 min lugn distans (Zon 2).
- D) Helvila.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 2 (Kombinationseffekten)

Status: HRV 115, RHR 42 (nästan tillbaka på baslinje). Körde ett tungt benpass på gymmet igår kväll (knäböj och marklyft). Känner sig extremt stel i framsida lår idag (DOMS), RPE 7/10 på träningsvärk.

Dagens pass: Tröskelintervaller 6x1000m på löparbana.

Alternativ:

- A) Kör tröskelpasset som planerat, träningsvärken släpper efter uppvärmningen.
- B) Sänk farten på intervallerna till "moderat ansträngning" istället för tröskel.
- C) Byt till lugn återhämtningsjogg 30 minuter.
- D) Vila helt från löpning idag.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 3 (Under passet / Akut justering)

Status: All data (HRV, RHR, sömn) är perfekt. Alex värmer upp inför passet och känner sig i superform. Men under den andra intervallen hugger det till lätt i baksida lår (hamstring). Smärtan är 3/10, det går att springa men det känns onaturligt.

Dagens pass: Korta, snabba intervaller 15x200m i överfart (snabbare än tävlingsfart).

Alternativ:

- A) Bitar ihop och fortsätta, det är bara 3/10 i smärta och datan ser bra ut.
- B) Sänka farten markant och köra klart intervallerna.
- C) Avbryta intervallerna och jogga lugnt hemåt (Zon 1).
- D) Avbryta passet omedelbart, stanna klockan och promenera hem.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 4 (Formtoppning / Tapering)

Status: Det är 5 dagar kvar till säsongens viktigaste 5000m-lopp. Alex känner sig "för pigg", HRV ligger på 130 (högre än normalt) och RHR på 38. Han är nöjd över att tappa formen och vill trycka på för att "känna att farten finns där".

Dagens pass: Lätt aktivering planerad (30 min jogg + 4x15 sekunder snabba stegringar).

Alternativ:

- A) Håll fast vid den lätta aktiveringen, lita på formtoppningen.
- B) Låt personen köra ett hårdare pass (t.ex. 3x1000m i tävlingsfart) för att dämpa den mentala nojan.
- C) Förläng joggen till 60 minuter så Alex får ta ut sig lite grann.
- D) Vila helt för att samla ännu mer energi.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 5 (Livspusslet stör)

Status: Mycket stress i skolan/jobbet senaste tre dagarna. Har bara hunnit sova 5 timmar per natt. RHR är uppe på 48 (något förhöjd). Alex är dock extremt motiverad och vill träna hårt för att få en mental paus från stressen.

Dagens pass: Långpass 90 minuter.

Alternativ:

- A) Låt honom springa 90 min, den mentala pausen är viktig.
- B) Korta ner passet till 45–60 minuter lugn löpning.

C) Byt till ett kort, intensivt pass (t.ex. 20 min backintervaller) för att få ur sig stressen snabbt.

D) Tvinga honom till vila/sömn.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 6 (Tillbaka efter infektion)

Status: Vaknar efter tre dagars frånvaro med halsont. Är nu helt smärt- och feberfri sedan 24 timmar. HRV är dock fortfarande något lågt (105) och vilopulsen är +5 slag över normalt.

Dagens pass: Intervaller 8x400m i 3000m-fart.

Alternativ:

A) Kör passet enligt plan, han är symtomfri.

B) Byt ut intervallerna mot en lätt testjogg på 30 minuter.

C) Gör intervallerna men halvera farten.

D) Helvila ytterligare en dag.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 7 (Tävlingsbaksmällan)

Status: Två dagar efter 5000m-loppet (där han persade!). Motivationen är på topp och Alex känner sig mentalt oslagbar. Sömn och HRV har återgått till det normala, men vaderna är fortfarande spända (DOMS 4/10).

Dagens pass: 60 min lugn återhämtningsdistans (Zon 2).

Alternativ:

A) Kör passet som planerat, Zon 2 hjälper genomblödningen i vaderna.

B) Korta ner joggen till 30 minuter.

C) Byt ut löpningen mot alternativträning (cykel/simning) utan stötar.

D) Vila helt för att låta vaderna läka.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Profil 2: Emma, 42 år – "Nybörjaren / Hälsolöparen"

Bakgrund: Började springa för 8 månader sedan. Arbetar på kontor, har två barn. Mål: Att springa milen under 60 minuter om två månader. Använder inte pulsklocka dagligen, går på känsla (RPE).

Baslinje: Tränar 3 pass i veckan (tis, tors, sön). Veckovolym: ca 20 km.

Situation 1 (Tidsbrist och stress)

Status: Emma blir kvar på jobbet pga en kris. Istället för de planerade 60 minuterna har hon nu bara 30 minuter till godo innan hon måste hämta barn. Känner sig stressad.

Dagens pass: Lugn distans 8 km (ca 60 min).

Alternativ:

- A) Ställ in passet helt och vila, det är för stressigt.
- B) Spring 30 minuter men kör i ett hårdare tempo för att få "samma effekt".
- C) Spring 30 minuter i planerat lugnt tempo (4 km) och var nöjd.
- D) Byt till 20 minuter intervaller (ex. 1 min snabbt, 1 min vila).
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 2 (Överambition och träningsvärk)

Status: I helgen kände Emma sig stark och sprang 12 km istället för de planerade 8 km. Det var hennes längsta runda någonsin. Nu är det tisdag och hon har massiv träningsvärk (RPE 8/10) i låren.

Dagens pass: Tröskelpass 3x8 minuter.

Alternativ:

- A) Kör tröskelpasset ändå, träningsvärk är ofarligt.
- B) Byt passet till 30 minuter lugn återhämningsjogg/promenad.

C) Cykla lätt eller kör rörlighetsträning hemma istället för löpning.

D) Helvila tills träningsvärken släppt.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 3 (Lätt känning)

Status: Emma har känt ett svagt "molande" på utsidan av höger knä efter förra passet (2/10 i smärta). Känns inte när hon går, bara ibland i trappor.

Dagens pass: 5 km lugn distans.

Alternativ:

A) Spring 5 km som planerat, men stanna om det gör mer ont.

B) Spring 2-3 km på mjukt underlag och känn efter.

C) Avstå löpning, vila helt i 3 dagar.

D) Avstå löpning, kör styrketräning för ben/höft.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 4 (Pulsdrift på långpass)

Status: Emma känner sig pigg. Passet känns lugnt och hon kan prata normalt (RPE 4/10). Trots detta varnar hennes klocka efter 6 km att pulsen ligger i röd zon (Zon 4/5).

Dagens pass: Långpass 10 km.

Alternativ:

A) Lita på klockan, stanna och promenera tills pulsen går ner.

B) Lita på känslan (RPE), ignorera klockan och fortsatt springa.

C) Sänk tempot lite grann men fortsatt jogga.

D) Avbryt passet för säkerhets skull.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 5 (Mental dipp / Motivation)

Status: Det regnar på tvären och är mörkt ute. Emma är trött och känner absolut noll motivation att gå ut. Ingen träningsvärk, bara hjärnspöken.

Dagens pass: Backintervaller 8x40 sekunder.

Alternativ:

- A) Tvinga henne att köra backintervallerna, disciplin är viktigt.
- B) Byt passet till 30 minuter lugn kravlös jogg bara för att komma ut.
- C) Säg åt henne att vila idag och köra passet imorgon istället (om vädret är bättre).
- D) Ersätt löpningen med hemmaträning (styrka/core).
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 6 (Prestationsångest)

Status: Det är dagen innan Emmas stora mål: Hon ska springa "Test-milen" för att se om hon klarar under 60 minuter. Hon är väldigt nervös och vill sticka ut och "testa formen" med ett snabbt 3 km-pass.

Dagens pass: Helvila.

Alternativ:

- A) Låt henne springa 3 km snabbt för att lugna nerverna.
- B) Låt henne jogga 15 minuter väldigt lugnt bara för att hålla benen igång.
- C) Stå fast vid schemat: Helvila. Absolut ingen löpning idag.
- D) Byt till ett yogapass.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 7 (Efter målet)

Status: Emma klarade milen på 58 minuter! Hon är överlycklig men kroppsligt dränerad. Det är tisdag, två dagar efter loppet.

Dagens pass: 6 km lugn distans.

Alternativ:

- A) Kör 6 km, bra att komma igång med rutinerna direkt.
- B) Korta ner till 3 km mycket lugn promenadjogg.
- C) Helvila, ge kroppen en extra ledig vecka utan krav.
- D) Planera in ett nytt, tuffare tröskelpass för att rida på framgångsvågen.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Profil 3: Johan, 55 år – "Veteranen / Långskubbaren"

Bakgrund: Har sprungit i över 20 år. Älskar volym och bygger sin identitet kring att vara "långlöpare". Mål: Genomföra ett maraton under 3 timmar. Tålig hjärt/lung-kapacitet, men mekaniskt sliten (stela hälsenor).

Baslinje: Veckovolym: 50–60 km. Vilar sällan mer än två dagar i rad. Vilopuls: 45.

Situation 1 (Morgonstelheten)

Status: Johan vaknar och är extremt stel i höger hälsena (5/10 smärta vid första stegen). Det släpper efter 10 minuters promenad och känns inget när han väl är varm.

Dagens pass: Lugn distans 15 km.

Alternativ:

- A) Kör passet, det är ofarligt om det försvinner när han blir varm.
- B) Korta ner passet till 8 km och lägg till extra uppvärmning.
- C) Byt löpningen mot cykel (som avlastar hälsenan).
- D) Helvila från löpning i minst 5 dagar.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 2 (Fart-komplexet)

Status: Johan ska springa intervaller och hamnar med yngre löpare. Han springer intervallerna alldeles för snabbt (långt över sin mjölksyratröskel) och känner att han drar på sig mycket syra tidigt i passet.

Dagens pass: Tröskelintervaller 4x2 km.

Alternativ:

- A) Fortsätt pressa i det snabbare tempot, det ger bra VO₂-effekt istället.
- B) Stanna till, sänk tempot till rätt tröskelzon och genomför resten.
- C) Avbryt passet, han har redan missat syftet med dagen.
- D) Korta ner intervallerna (t.ex. till 4x1 km) men behåll det snabba tempot.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 3 (Den heliga veckovolymen)

Status: Johan har haft en hektisk vecka och missat två pass. Det är söndag och för att nå sin "målvolym" på 60 km för veckan, behöver han springa 32 km idag istället för planerade 20 km.

Dagens pass: Långpass 20 km.

Alternativ:

- A) Låt honom springa 32 km, volym är viktigast inför maraton.
- B) Håll fast vid 20 km, att kompensera genom extrem ökning är skaderisk.
- C) Kompromissa och kör 26 km.
- D) Dela upp det: 16 km på förmiddagen, 16 km på kvällen.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 4 (Återhämtningskris)

Status: Efter en treveckors-period av hård träning visar Johans klocka att hans HRV har varit konstant lågt i 5 dagar. Vilopulsen är dock normal. Han känner sig "lite tung" men vill träna.

Dagens pass: 12 km fartlek.

Alternativ:

A) Kör fartleken. HRV kan fela hos äldre atleter, lita på pulsen.

B) Byt till 12 km mycket lugn distans.

C) Vila i 3 dagar och "starta om" systemet.

D) Byt ut löpningen mot ett tungt styrkepass.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 5 (Tapering / Nedtrappning)

Status: Det är två veckor kvar till maratonloppet. Johan har följt schemat och minskat volymen. Nu får han panik, tycker att han tappat all kondition och känner sig trög. Han vill ut och springa ett snabbt 15 km-pass för att "väcka benen".

Dagens pass: 8 km mycket lugn jogg + 4 korta stegringar.

Alternativ:

A) Låt honom springa snabbt 15 km, psykologiskt självförtroende är viktigt.

B) Håll fast vid 8 km lugnt, känslan av tröghet är en normal del av formtoppning.

C) Låt honom köra 8 km, men hälften av passet i maratonfart.

D) Helvila för att undvika överträning inför loppet.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 6 (Energibrist på långpass)

Status: Under ett 28 km långpass (som springs i ZON 2) tar energin tvärs lut för Johan vid 22 km (Han "går in i väggen"). Pulsen är låg, men benen känns som bly.

Dagens pass: Långpass 28 km.

Alternativ:

- A) Tvinga honom att jogga klart, det bygger mental pannben.
- B) Låt honom promenera de sista 6 kilometrarna.
- C) Be honom ta en energi-gel, vila 5 minuter och sedan jogga hem.
- D) Avbryt passet helt och ring på skjuts, skaderisken är för hög när man är urladdad.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 7 (Post-Maraton syndromet)

Status: Johan sprang sitt maraton i söndags. Det är nu onsdag. Han har fortfarande svår träningsvärk i vaderna och lår, men huvudet skriker efter "endorfinkicken" och han vill ut och jogga 10 km.

Dagens pass: Helvila / Återhämtningsvecka.

Alternativ:

- A) Låt honom springa 10 km lugnt, blodet rensar ut slaggprodukter.
- B) Ersätt med 20 minuter lugn promenad eller cykling.
- C) Låt honom springa, men korta ner till 4 km.
- D) Strikta restriktioner: Helvila tills träningsvärken är borta.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Profil 4: Leo, 17 år – "Juniortalangen"

Bakgrund: Tävlrar i 1500m och 3000m på nationell juniornivå. Hög inneboende stress från både skola och egna krav. Ofta väldigt snabb men saknar ibland förståelse för återhämtning.

Baslinje: Veckovolym: 45 km. Vilopuls: 42. Sover oftast 8 timmar, men kvaliteten varierar med skolstressen.

Situation 1 (Betygsstress och sömnbrist - INNAN)

Status: Har haft nationella prov hela veckan. Sovit 4 timmar per natt i tre dagar. Vilopulsen är +8 slag förhöjd. Leo känner sig extremt trött i huvudet, men vill träna för att "inte tappa mot konkurrenterna".

Dagens pass: Hårda intervaller 8x400m i tävlingsfart.

Alternativ:

- A) Kör intervallerna som planerat för att hålla rutinen.
- B) Byt till ett lugnt distanspass på 40 min för att rensa huvudet.
- C) Korta ner intervallerna till 4x400m.
- D) Tvinga honom att vila/sova, ingen träning alls idag.
- E) Annat + Motivering.

Situation 2 (Överambition på bra dagar - INNAN)

Status: Vaknar utvilad en lördag, känner sig helt oslagbar. HRV är perfekt. Leo vill byta ut sitt lugna distanspass mot ett eget påhittat testlopp för att "se om han kan slå sitt personbästa på 3000m på träning".

Dagens pass: 10 km lugn återhämningsdistans (Zon 2).

Alternativ:

- A) Låt honom köra testloppet, man måste ta tillvara på formtoppar.
- B) Håll strikt på schemat: 10 km lugn distans, ingen fart.
- C) Kompromissa: Lägg in 4x1 min fartökning i slutet av det lugna passet.
- D) Låt honom köra halva distansen (5 km) i ett måttligt tröskeltempo.
- E) Annat + Motivering.

Situation 3 (Låg energi efter pass - EFTER)

Status: Körde ett distanspass igår som skulle vara "lugnt", men Leo sprang i halvhårt tempo hela vägen för att han "kände för det". Idag vaknar han med blytung ben och noll energi.

Dagens pass: Tröskelpass 4x6 minuter.

Alternativ:

- A) Kör tröskelpasset ändå, han måste lära sig konsekvenserna av att springa för fort på lugna dagar.
- B) Byt passet mot 30 min extremt lugn återhämtningsjogg.
- C) Flytta tröskelpasset till imorgon och vila idag.
- D) Korta ner tröskeln till 2x6 minuter.
- E) Annat + Motivering.

Situation 4 (Lätt sjukdomskänsla - INNAN)

Status: Känner sig "tjock" i halsen på morgonen, men har absolut ingen feber och vilopulsen är normal. Ingen smärta när han sväljer.

Dagens pass: Backintervaller 10x45 sekunder.

Alternativ:

- A) Kör passet, det sitter bara i huvudet eftersom pulsen är normal.
- B) Kör passet men med lägre intensitet.
- C) Byt till en lätt promenad/jogg på 20 minuter och känn efter.
- D) Helvila direkt, chansa aldrig med halsont.
- E) Annat + Motivering.

Situation 5 (Smärta vid uppvärmning - INNAN/UNDER)

Status: Efter 1 km av uppvärmningen känner Leo en tydlig smärta på insidan av smalbenet (benhinnorna, 4/10). Smärtan ökar i nedförsbackar.

Dagens pass: 8 km tempopass.

Alternativ:

- A) Fortsätt uppvärmningen och se om det släpper när han blir varm.
- B) Sänk farten, byt till mjukt underlag (gräs/grus) och jogga lugnt.
- C) Avbryt löpningen direkt och cykla istället.
- D) Avbryt direkt, vila helt.
- E) Annat + Motivering.

Situation 6 (Social press - INNAN)

Status: Leos kompisar (som är äldre och snabbare) frågar om han vill hänga med på deras långpass som går mycket snabbare än Leos planlagda tempo. Leo vill verkligen hänga på.

Dagens pass: Långpass 15 km i lugnt tempo (5:00 min/km).

Alternativ:

- A) Låt honom hänga med kompisarna hela vägen, social träning är bra.
- B) Låt honom springa med dem halva passet och sedan vika av hemåt.
- C) Säg åt honom att springa själv enligt schemat.
- D) Byt dag på långpasset för att undvika frestelsen.
- E) Annat + Motivering.

Situation 7 (Inför viktig tävling - INNAN)

Status: 3 dagar kvar till JSM (Junior-SM). Leo känner sig plötsligt väldigt tung i kroppen, vilket är vanligt under formtoppning, men han är stressad över det och vill ut och "testa benen" hårt.

Dagens pass: 20 minuter superlugn jogg.

Alternativ:

- A) Låt honom göra 2-3 korta, maxade spurter under joggen för självförtroendet.
- B) Håll stenhårt i honom: Bara 20 min jogg, inget annat.
- C) Helvila idag så han inte ställer till det för sig.
- D) Låt honom köra ett kort men hårt pass för att rensa luften.
- E) Annat + Motivering.

Profil 5: Marcus, 35 år – "Datanörden"

Bakgrund: Tävlingsinriktad motionär. Jagar sub-40 på milen. Har all teknisk utrustning (Garmin-klocka, pulsband, stryd-pod). Stirrar sig ofta blind på data istället för att lyssna på kroppen.

Baslinje: Veckovolym: 50 km. Vilopuls: 48. Följer strukturerat schema (polariserad träning).

Situation 1 (Datan vs Känslan - INNAN)

Status: Marcus vaknar och känner sig i sitt livs form, full av energi (RPE 2/10 på trötthet). Men hans klocka visar "Training Readiness: LOW", HRV är i botten och klockan rekommenderar 48 timmars vila.

Dagens pass: Intervaller 5x1000m.

Alternativ:

- A) Lita på klockan, ställ in intervallerna och vila.
- B) Lita på klockan, kör 30 min extremt lugn cykling.
- C) Lita på känslan, kör intervallerna precis som planerat.
- D) Kör intervallerna men sänk farten något som en kompromiss.
- E) Annat + Motivering.

Situation 2 (Dåligt kalibrerad zon - EFTER)

Status: Marcus körde ett lugnt distanspass igår. Enligt klockan var han i "Zon 3" (halvhårt) stora delar av passet, fast han tyckte det kändes som lätt ansträngning (Zon 2). Nu är han orolig att han tränat för hårt.

Dagens pass: Tröskelpass 20 minuter.

Alternativ:

- A) Anta att klockan stämde, han tränade för hårt igår, vila idag.
- B) Byt dagens tröskel till lugn distans för att kompensera.
- C) Strunt i datan från igår, kör dagens tröskelpass enligt plan.
- D) Kör tröskelpasset men basera dagens intensitet enbart på känsla, titta inte på pulsen.
- E) Annat + Motivering.

Situation 3 (Prylbaksmällan - EFTER)

Status: Marcus köpte nya, aggressiva kolfiberskor och sprang sitt långpass i dem igår. Idag vaknar han med extremt spända vader och ömma hälsenor (DOMS 7/10).

Dagens pass: Lugn distans 8 km.

Alternativ:

- A) Kör 8 km lugnt, det ökar blodgenomströmningen i vaderna.
- B) Korta ner till 4 km och stretcha mycket.
- C) Byt till alternativträning (cykel) för att ta bort stötarna från vaderna.
- D) Vila helt tills vaderna känns normala.
- E) Annat + Motivering.

Situation 4 (Jetlag - INNAN)

Status: Kom hem från en jobbresor i USA igår kväll. Har sovit oroligt, kroppen är inställd på fel tidszon och han är lite mosig i huvudet, men benen är utvilade.

Dagens pass: 10x400m tuffa intervaller.

Alternativ:

- A) Kör passet, benen är ju fräscha och svett hjälper mot jetlag.
- B) Byt passet till 45 minuter lugn, kravlös distans för att väcka kroppen.
- C) Flytta intervallerna till imorgon och vila idag.
- D) Halvera antalet intervaller (5x400m).
- E) Annat + Motivering.

Situation 5 (Den envisa milen - UNDER/EFTER)

Status: Marcus är ute på ett planerat 8 km tröskelpass. Vid 8 km känner han sig lite sliten, men ser på klockan att om han bara pressar 2 km till så sätter han nytt personbästa på milen på Strava. Han tvekar.

Dagens pass: Avsluta efter 8 km.

Alternativ:

- A) Låt honom gasa de sista 2 km för att ta sitt PR, det bygger självförtroende.
- B) Låt honom springa till 10 km men sakta ner farten rejält sista biten.
- C) Säg till honom att stanna klockan vid 8 km och jogga hem. Inga egotripptar på träning.
- D) Avbryt direkt, strängt schema gäller.

E) Annat + Motivering.

Situation 6 (Efter-tävling-analysen - EFTER)

Status: Sprang milen på tävling igår på 40:30, missade sitt sub-40-mål. Han är extremt frustrerad och vill ut och köra backintervaller idag för att "straffa sig själv" i form.

Dagens pass: Vila / Lugn promenad.

Alternativ:

- A) Låt honom köra intervaller för att få utlopp för frustrationen.
- B) Kompromissa: Låt honom springa en svettig, medelhård runda på 5 km.
- C) Tvinga fram vilan, förbjud löpning idag.
- D) Låt honom simma eller cykla intensivt, men ingen löpning.
- E) Annat + Motivering.

Situation 7 (Obalans i passet - EFTER)

Status: Körde tröskelintervaller. Första intervallen gick på 3:55-tempo, sista gick på 4:30-tempo för att han tog slut. Han mår pyton och är besviken.

Dagens pass (Dagen efter): Långpass 16 km.

Alternativ:

- A) Kör långpasset som planerat, tempot spelar ingen roll idag.
- B) Korta ner långpasset till 10 km eftersom han drog på sig mycket mjölksyra igår.
- C) Vila idag, flytta långpasset till imorgon.
- D) Kör långpasset men lägg in gångpauser var tredje kilometer.
- E) Annat + Motivering.

Profil 6: Sara, 31 år – "Comeback-löparen"

Bakgrund: Sprang mycket innan hon fick barn för 2 år sedan. Nu försöker hon hitta tillbaka. Begränsad tid, oregelbunden sömn ("skräpsömn"). Stressad över att hon är mycket långsammare nu än förr.

Baslinje: Veckovolym: 25 km (försöker träna 3 ggr/vecka). Vilopuls: 55.

Situation 1 (VAB och inställt pass - INNAN)

Status: Skulle ha sprungit igår, men barnet blev sjukt (VAB). Idag är det hennes planerade vilodag, men hon känner extrem ångest över att ha "missat" ett pass och vill klämma in igårdagens pass ikväll.

Dagens pass (Egentligen vilodag): Hårda intervaller (från igår).

Alternativ:

- A) Låt henne köra intervallerna ikväll, hon behöver komma ikapp.
- B) Låt henne springa, men gör om det till 30 min lugn kravlös jogg.
- C) Vila idag också, stryk passet ur schemat och gå vidare till nästa.
- D) Kör ett snabbt styrkepass på vardagsrumsgolvet istället.
- E) Annat + Motivering.

Situation 2 (Extrem trötthet - INNAN)

Status: Har sovit kanske 3 timmar osammanhängande pga vaket barn. Känner sig yr och mår lite illa av trötthet.

Dagens pass: 12 km långpass.

Alternativ:

- A) Spring 12 km, frisk luft gör henne piggare.
- B) Byt passet till 5 km friskvårdsjogg.
- C) Ställ in passet helt och prioritera sömn om möjligt.
- D) Byt ut det mot en lång barnvagnspromenad.
- E) Annat + Motivering.

Situation 3 (Jämförelsesjukan - UNDER/EFTER)

Status: Sara springer en gammal runda hon ofta sprang förr. Hon inser efter halva passet att hon ligger 45 sekunder/km långsammare än hon gjorde för 3 år sedan. Hon blir deppig, vill ge upp och gå hem.

Dagens pass: 8 km tempopass.

Alternativ:

- A) Be henne bita ihop och slutföra i det tempot hon orkar.
- B) Avbryt tempodelen, låt henne jogga lugnt utan att titta på klockan.
- C) Låt henne avbryta och promenera hem, det är inte värt det mentala slitaget idag.
- D) Be henne lägga in ett par korta spurter för att känna sig snabb igen.
- E) Annat + Motivering.

Situation 4 (Känning i bäcken/fogar - EFTER)

Status: Efter gårdagens lugna löpning fick hon ont (smärta 4/10) framtill i bäckenet/symfyssen, vilket hon känner igen från graviditeten. Idag känns det okej vid gång, men ömmar om hon hoppar.

Dagens pass: 6 km distans.

Alternativ:

- A) Spring 6 km lugnt, det går över.
- B) Byt löpning mot cykel/simning (ingen stötbelastning).
- C) Byt till ett specifikt styrkepass för mage/höft.
- D) Helvila i minst 3 dagar.
- E) Annat + Motivering.

Situation 5 (Tidsfönstret - INNAN)

Status: Barnet somnade precis. Sara har exakt 25 minuter på sig innan partnern måste åka iväg. Hennes schema säger 45 minuter lugn jogg.

Dagens pass: 45 min distans.

Alternativ:

- A) Ställ in, 25 min är för kort för att ge effekt.
- B) Spring 20 minuter lugnt, allt räknas.
- C) Spring 20 minuter jättehårt (hög puls) för att få bra träningseffekt på kort tid.

D) Kör ett intensivt HIIT-pass hemma istället.

E) Annat + Motivering.

Situation 6 (Barnvagns-dilemmat - INNAN)

Status: Måste ta med barnvagnen på dagens pass. Det blåser mycket och det är tungt att putta.

Dagens pass: Fartlek 40 minuter (korta ruscher).

Alternativ:

A) Kör fartleken med vagnen, det ger extra bra styrka.

B) Stryk fartleken, spring bara i ett jämnt och lugnt tempo med vagnen.

C) Promenera i rask takt med vagnen i 60 minuter istället.

D) Vänta till imorgon när hon kan springa utan vagn.

E) Annat + Motivering.

Situation 7 (När pusslet äntligen stämmer - INNAN)

Status: Första gången på veckor har Sara sovit ut (8h oavbrutet), ätit bra och har noll stress. Schemat säger dock bara 30 min återhämtningsjogg. Hon vill utnyttja super-dagen till något tyngre.

Dagens pass: 30 min lugn jogg (Zon 1/2).

Alternativ:

A) Håll schemat, en bra känsla betyder inte att man ska ändra planen.

B) Låt henne maxa utnyttjandet: Kör ett tufft intervallpass idag istället.

C) Förläng det lugna passet till 60 minuter så hon får njuta länge.

D) Låt henne lägga till 5 st korta, roliga backdrag i slutet av joggen.

E) Annat + Motivering.

Profil 7: Karin, 48 år – "Ultrakrigaren"

Bakgrund: Springer ultralopp (fjällmaraton 90 km är huvudmålet). Extremt stort pannben, mycket seg uthållighet men bristfällig snabbhet. Ignorerar ofta småskavanker, har en inställning att "smärta är svaghet som lämnar kroppen".

Baslinje: Veckovolym: 80–100 km (mycket tid ute). Vilopuls: 46.

Situation 1 (Konstant låggradig trötthet - INNAN)

Status: Vaknar och känner sig som "kola i hela kroppen". Inget gör ont, men hon känner sig tung, osugen på mat och vilopuls är +5. Hon ligger i en tung träningsblock-period.

Dagens pass: 4 timmar trail-löpning.

Alternativ:

- A) Kör 4 timmar, det är precis detta pannben man bygger för ultralopp.
- B) Korta ner passet till 2 timmar.
- C) Byt till 2 timmar landsvägscyckling (skona benen).
- D) Helvila idag, ät och sov.
- E) Annat + Motivering.

Situation 2 (Hälsenevarning - EFTER)

Status: Kom precis hem från ett backpass. Hälsenan knarrar (krepitationer) när hon rör på foten och den är svullen och knölig. Smärta 6/10.

Dagens pass (Imorgon): 15 km transportlöpning till jobbet.

Alternativ:

- A) Spring till jobbet, se om svullnaden går ner.
- B) Ta bussen till jobbet, helvila i 3-5 dagar från löpning.
- C) Tejpa hälsenan och jogga extremt lugnt.
- D) Cykla till jobbet.
- E) Annat + Motivering.

Situation 3 (Back-to-back pass - INNAN)

Status: Sprang 35 km igår. Idag ska hon bygga "trötta ben" (back-to-back) och springa 20 km till. Vaknar och benen känns helt dränerade, svårt att gå nerför trappan.

Dagens pass: 20 km distans.

Alternativ:

- A) Genomför 20 km-passet, det är hela syftet med back-to-back.
- B) Korta ner till 10 km, det räcker för effekten.
- C) Gå/vandra raskt i 20 km istället för att springa.
- D) Vila idag, hon har inte återhämtat sig från igår.
- E) Annat + Motivering.

Situation 4 (Aptitlöshet och energibrist - EFTER)

Status: Avslutade ett tungt pass för 4 timmar sedan. Karin känner sig illamående, har absolut noll aptit och har inte kunnat få i sig annat än lite vatten.

Dagens pass (Imorgon): 10 km återhämtningsjogg.

Alternativ:

- A) Kör 10 km imorgon, kroppen har lagrat tillräckligt med fett.
- B) Helvila imorgon för att kroppen uppenbarligen är i akut energikris.
- C) Byt imorgondagens pass till simning.
- D) Kör passet först på kvällen för att ge henne mer tid att äta.
- E) Annat + Motivering.

Situation 5 (Tapering-panik - INNAN)

Status: 10 dagar kvar till det 90 km långa fjälloppet. Schemat säger max 40 minuters jogg. Karin känner sig enormt frustrerad av att "göra ingenting" och vill ge sig ut i skogen i minst 2 timmar för att "inte tappa känslan".

Dagens pass: 40 min lätt jogg.

Alternativ:

- A) Låt henne vara ute i skogen i 2 timmar, men bara promenad.

- B) Låt henne springa 2 timmar, det påverkar inte ett 90 km-lopp nämnvärt.
- C) Tvinga henne att hålla schemat: max 40 minuter jogg.
- D) Låt henne springa 40 min jogg + 20 min tempo för att stilla oron.
- E) Annat + Motivering.

Situation 6 (Skavsår från helvetet - INNAN)

Status: Fick enorma köttår/skavsår på hälarna efter helgens pass. Plåster fäster inte. Att ta på sig löparskorna gör brutalt ont.

Dagens pass: 15 km tröskel.

Alternativ:

- A) Klipp hål i bak-kappan på ett par gamla skor och spring, ultrakrigare löser problem!
- B) Spring passet barfota på en gräsmatta.
- C) Vila från all löpning tills huden är helt läkt (ca 4-5 dagar).
- D) Kör ett mördande roddmaskin-pass inomhus i strumplästen istället.
- E) Annat + Motivering.

Situation 7 (Värmeböljan - INNAN)

Status: Det är plötsligt 31 grader varmt och hög luftfuktighet. Hennes fjällopp (som går i fjällen) förväntas bli svalt (10-15 grader).

Dagens pass: 30 km långpass mitt på dagen.

Alternativ:

- A) Spring 30 km kl 12:00, bra pannbensträning.
- B) Flytta passet till 05:00 på morgonen när det är svalt.
- C) Spring 30 km men sänk farten med 30-45 sekunder/km pga värmen.
- D) Dela upp passet i två (15 km morgon, 15 km kväll).
- E) Annat + Motivering.

Profil 8: David, 28 år – "Skadefågeln"

Bakgrund: Älskar fart och intervaller. Men varje gång han bygger upp volymen inför sitt mål (Halvmaraton) går han sönder, oftast problem med vader eller knän (löparknä). Han blundar ofta för tidiga varningssignaler.

Baslinje: Veckovolym: 30 km (men siktar på 50 km). Vilopuls: 50.

Situation 1 (Den bekanta stramheten - INNAN)

Status: Vaknar dagen efter ett distanspass. Känner en liten, "kall" och stramande känsla (2/10) i utsida knä (där han haft löparknä förut). Det gör inte jätteont, men han känner igen känslan exakt.

Dagens pass: Korta backintervaller 12x30 sek.

Alternativ:

- A) Kör backintervallerna, backar brukar vara skonsammare mot löparknä.
- B) Byt passet till lugn, platt löpning.
- C) Avbryt all löpning direkt, styrketräna sätesmuskeln (gluteus) istället.
- D) Helvila i tre dagar och utvärdera.
- E) Annat + Motivering.

Situation 2 (Missat träning, vill hoppa fram - INNAN)

Status: Har missat två hela veckors träning på grund av en muskelbristning i vaden. Nu känns vaden plötsligt bra (ingen smärta). Schemat är nu inne i "Vecka 8" (tuffaste veckan med mest volym).

Dagens pass: 16 km långpass inkl. farthöjning.

Alternativ:

- A) Hoppa direkt in på Vecka 8 och spring långpasset, vaden är ju läkt.
- B) Spring 8 km mycket lugnt för att testa vävnadstoleransen.
- C) Hoppa tillbaka och börja om schemat på Vecka 6.
- D) Kör endast gång/promenad 10 km idag.
- E) Annat + Motivering.

Situation 3 (Träningsvärk från rehab - INNAN)

Status: Har kört ett stenhårt rehab-pass (excentriska tåhävningar) på gymmet för att förebygga skador. Idag är vaderna så stela av träningsvärk att han vaggar fram.

Dagens pass: Tröskelintervaller 5x1000m.

Alternativ:

- A) Kör intervallerna, farten töjer ut musklerna.
- B) Byt till extremt lugn distansjogg, undvik framfotastalandning.
- C) Ställ in passet helt och cykla lugnt.
- D) Vila helt, träningsvärk efter rehab är bra men man ska inte springa på den.
- E) Annat + Motivering.

Situation 4 (Sko-krisen - EFTER)

Status: Bytte från klassiska "stabila" skor med mycket drop, till platta minimalistiska skor för att "bli starkare". Sprang 10 km igår. Vaknar idag och kan knappt stödja på hälen (våldsam hälseneinflammation).

Dagens pass (Imorgon): 5 km distans.

Alternativ:

- A) Spring 5 km i de gamla skorna imorgon.
- B) Promenera 5 km i de nya skorna för att långsamt vänja foten.
- C) Inför totalt löpförbud tills hälen tål full belastning igen.
- D) Tejpa hälen och jogga försiktigt.
- E) Annat + Motivering.

Situation 5 (Desperation innan loppet - INNAN)

Status: Det är 3 veckor kvar till Göteborgsvarvet (21 km). David har varit halvskadad och max sprungit 12 km som längst i år. Han är livrädd att han inte orkar distansen och vill ge sig ut och springa 20 km idag "bara för att veta".

Dagens pass: 10 km lugn distans.

Alternativ:

- A) Låt honom springa 20 km. Den mentala spärren måste bort.
- B) Låt honom springa 14–15 km som en kompromiss.
- C) Låt honom jogga 10 km och sedan promenera 5 km.
- D) Stoppa honom! Endast 10 km jogg tillåtet, en 20 km-chock nu ger bara skada.
- E) Annat + Motivering.

Situation 6 (Lita på världen? - INNAN)

Status: Var hos fysioterapeuten igår som sa "ta det försiktigt". David tolkar "försiktigt" som att han kan springa sina intervaller, men kanske lite långsammare.

Dagens pass: 8x400m intervaller.

Alternativ:

- A) Kör intervallerna men dra ner tempot till 80% av max.
- B) Stryk intervallerna och kör bara en lugn runda på 30 min.
- C) Bygg om passet: spring i 1 minut, gå i 1 minut, upprepa 10 gånger.
- D) Cykling eller simning.
- E) Annat + Motivering.

Situation 7 (Post-lopp eufori vs skadehistorik - EFTER)

Status: Genomförde halvmaratonloppet igår. Knät höll! Han mår fantastiskt bra och har bara lite vanlig muskelvärk. Eftersom han är så glad och motiverad vill han direkt börja träna mot ett nytt lopp imorgon.

Dagens pass: Planera framtiden / Vila.

Alternativ:

- A) Låt honom börja jogga imorgon, det är bra att rida på motivationen.
- B) Låt honom börja bygga veckovolym direkt, knät verkar ju hålla.
- C) Bromsa honom hårt: Schemalägg 5 dagar av absolut helvila från löpning, oavsett känsla.
- D) Ersätt löpning med lätt styrketräning närmaste veckan.

E) Annat + Motivering

Profil 9: Henrik, 39 år – "Triathleten / Multisportaren"

Bakgrund: Tränar inför en Ironman (Triathlon). Har en enorm konditionsmotor (hjärta/lungor) men springer sällan med fräscha ben eftersom han ofta cyklar dagen innan.

Baslinje: Löpvolym: 35 km/vecka (men total träningsvolym är över 12 timmar/vecka).
Vilopuls: 43.

Situation 1 (Kondition vs. Muskler - INNAN)

Status: Cyklade 3 timmar stenhårt igår. Konditionsmässigt (flåset) känner Henrik sig superpigg idag och vilopulsen är normal, men lårmusklerna är helt förstörda och känns som bly.

Dagens pass: Tröskelintervaller löpning 4x2 km.

Alternativ:

- A) Kör passet, i triathlon måste man kunna springa på trötta ben.
- B) Byt passet till lugn distans 10 km, musklerna orkar inte tröskelfart idag.
- C) Korta ner intervallerna till 4x1 km men håll farten.
- D) Vila från löpning, kör ett lätt simpass istället för att skona benen.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 2 (Den obalanserade kompenseringen - INNAN)

Status: Henrik missade sitt 2 timmar långa cykelpass igår på grund av regn. Idag har han egentligen bara 45 minuter lugn jogg på schemat, men vill kompensera gårdagens missade hjärtr träning genom att springa stenhårt i 90 minuter istället.

Dagens pass: 45 min lugn jogg.

Alternativ:

- A) Låt honom springa 90 min hårt, hjärtat behöver belastningen han missade.
- B) Håll schemat: 45 min lugn jogg. Missat pass är missat pass.

C) Kompromissa: Låt honom springa 90 min, men i strikt lugnt tempo.

D) Byt ut löpningen mot ett stenhårt cykelpass inomhus istället.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 3 (Den stela överkroppen - INNAN)

Status: Simmade ett brutalt överkroppspass i morse. Axlarna och brösttryggen är så stela att han har svårt att röra armarna naturligt, vilket pajar hans löpställning.

Dagens pass: 12 km tempopass (kvällstid).

Alternativ:

A) Kör tempopasset ändå, benen är ju utvilade.

B) Kör passet, men sänk farten till lugn distans eftersom tekniken brister.

C) Vila ikväll och flytta löppasset till imorgon.

D) Byt löpningen mot att cykla på motionscykel.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 4 (Asfaltsvurpan - INNAN)

Status: Fick sladd på racercykeln igår och skrapade upp höften rejält. Inget är brutet, men det svider mycket och stramar i huden när han tar ut löpsteget. RPE för smärta är 4/10.

Dagens pass: Långpass 18 km löpning.

Alternativ:

A) Tejpa såret och spring 18 km.

B) Spring, men korta ner passet till 8-10 km.

C) Vila från löpning helt tills såret slutat strama.

D) Cykla lugnt istället (där höften hålls mer stilla).

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 5 (Känning i övergången - EFTER)

Status: Körde ett "Brick-pass" (cyklade först, bytte skor, sprang sedan direkt). Under de första 2 kilometrarna av löpningen fick han våldsamt kramp i vänster vad, som nu är extremt öm.

Dagens pass (Dagen efter): 8 km lätt återhämtningsjogg.

Alternativ:

- A) Jogga extremt försiktigt 8 km för att få blodgenomströmning i vaden.
- B) Helvila från löpning, promenera max 20 min.
- C) Byt till simning, vaden ska inte ha någon stötblastning alls idag.
- D) Tejpa vaden med kinesiotejp och spring som planerat.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 6 (Energitömning från annan sport - INNAN)

Status: Henrik körde ett lugnt cykelpass på 4 timmar igår, men glömde äta ordentligt. Idag vaknar han med extrem energibrist, känner sig skakig och pulsen är låg.

Dagens pass: Backintervaller 10x1 min.

Alternativ:

- A) Ät en stor frukost, vänta 2 timmar och kör backintervallerna ändå.
- B) Byt backintervallerna till en kort promenad, han är för tömd.
- C) Flytta intervallerna till imorgon, ät ikapp kalorierna idag och vila.
- D) Sänk tempot och jogga passet på platt mark.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 7 (Tapering-frustration - INNAN)

Status: Tävlingsvecka! Träningsvolymen har droppat från 12 timmar till 3 timmar. Henrik känner sig "svullen", rastlös och livrädd för att han håller på att tappa all form, och vill köra ett oplanerat maxtest.

Dagens pass: Helvila.

Alternativ:

- A) Låt honom köra ett kort 3 km testlopp för att stilla nerverna.
- B) Håll fast vid helvila, förbjud all pulshöjande träning idag.
- C) Tillåt 30 minuter promenad och rörlighet för att dämpa rastlösheten.
- D) Låt honom köra en kort, lugn simtur bara för att få röra sig.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Profil 10: Mikael, 41 år – "Hantverkaren / Kroppsarbetaren"

Bakgrund: Byggarbetare. Går och står i tunga skyddsskor på betonggolv hela dagarna (ofta 20 000+ steg innan han ens börjar träna). Siktat på att springa ett halvmaraton. Har hög arbetsbelastning.

Baslinje: Löpvolum: 25 km/vecka (sprunget oftast kvällstid efter jobbet). Vilopuls: 55.

Situation 1 (Steg-utmattningen - INNAN)

Status: Har burit gipsskivor uppför trappor hela dagen på bygget. Klockan är 17:00, vaderna och låren är stenhårda och bränner redan innan han bytt om till löparkläder.

Dagens pass: Backintervaller 8x45 sekunder.

Alternativ:

- A) Kör backintervallerna, benen vänjer sig när han blir varm.
- B) Byt passet till platt, lugn distans 6 km.
- C) Helvila, arbetsdagen var ett tillräckligt tungt benpass.
- D) Korta ner till 4 backintervaller.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 2 (Hälsporre-varningen - INNAN)

Status: Har gått mycket på asfalterat tak hela veckan. Imorse när han klev ur sängen högg det till som en kniv under ena hälen (klassiskt symtom på plantar fasciit/hälsporre). Det släppte lite efter frukost.

Dagens pass: 8 km tröskelpass.

Alternativ:

- A) Spring tröskelpasset, det är borta nu när han är varm.
- B) Byt ut passet till simning eller cykling omedelbart (avlasta hälen helt).
- C) Jogga extremt lugnt 4-5 km och känn efter.
- D) Byt skyddsskor på jobbet och spring som vanligt ikväll.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 3 (Väder-depressionen - INNAN)

Status: Mikael har arbetat utomhus i 4 grader och hållregn hela dagen. Han är frusen in i märgen. Schemat säger att han ska ut och springa långpass i samma regnväder ikväll.

Dagens pass: 15 km långpass.

Alternativ:

- A) Pannben på! Ut och spring långpasset.
- B) Flytta långpasset till helgen (när han kan springa på förmiddagen).
- C) Byt till ett kort, högintensivt inomhuspass (ex. löpband eller burpees).
- D) Korta ner passet till 8 km och håll ett högre tempo för att bli varm.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 4 (Semester-euforin - INNAN)

Status: Första veckan på industrisemestern! Plötsligt sitter Mikael i solstolen hela dagen och är extremt utvilad. Benen känns fjäderlätta och han vill springa mycket mer än schemat säger.

Dagens pass: 6 km lugn distans.

Alternativ:

A) Låt honom dubbla passet till 12 km nu när kroppen tål det.

B) Håll schemat (6 km), vävnaderna är inte vana vid ökad löpvolym än.

C) Låt honom springa 8-10 km i ett snabbare tempopass istället.

D) Passa på att lägga till ett extra styrkepass efter löpningen.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 5 (Energi-kraschen - INNAN)

Status: Jobbade över, missade middagen och klockan är 19:30. Mikael är vrålhungrig, lite skakig och ska upp kl 05:30 imorgon bitti igen.

Dagens pass: 10 km distanslöpning.

Alternativ:

A) Tryck en banan, ut och spring 10 km snabbt och ät sen.

B) Korta ner passet till 4-5 km lugn jogg, bara för att behålla rutinen.

C) Ställ in passet helt. Ät middag och gå och lägg dig.

D) Flytta passet till kl 04:30 imorgon bitti istället.

E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 6 (Skoskav från bygget - INNAN)

Status: Har fått nya arbetsbyxor/skor på jobbet som gett honom ett stort vätskefyllt skavsår på sidan av tån. Det gör ont att sätta på sig löparskorna.

Dagens pass: 12 km fartlek.

Alternativ:

- A) Tejpa tån hårt, ta en Alvedon och kör fartleken.
- B) Byt passet till roddmaskin/cykel där tån inte böjs lika mycket.
- C) Helvila tills blåsan spricker och läker.
- D) Klipp hål i en gammal löparsko och jogga lugnt.
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Situation 7 (Tävlingsveckan och jobbet - INNAN)

Status: 4 dagar kvar till halvmaratonloppet. Mikael kan inte sitta still och vila på dagarna som proffsen (han måste ju bygga altaner). Han är orolig för att han kommer vara tung i benen på startlinjen.

Dagens pass: Lätt aktivering (20 min jogg).

Alternativ:

- A) Håll fast vid löpaktiveringen, rutin är viktigt oavsett yrke.
- B) Stryk all löpning sista 4 dagarna, arbetsdagarna räcker som ben-aktivering.
- C) Byt löpningen mot kvällsstretch och foamrolling för att mjuka upp arbetsmusklerna.
- D) Säg åt honom att sjukskriva sig (Oetiskt men effektivt?).
- E) Annat + Motivering.

Motivering (valfritt):

Profil: 28 år, tränar 6 pass/vecka

Planerat pass: 10 km distans + 5×200 m stegringar

Status:

- HRV normal
- Vilopuls normal
- Bra sömn
- Känner sig ovanligt seg och "platt" i benen
- Ingen smärta

Alternativ:

A) Kör enligt plan

- B) Kör 10 km men skippar stegringarna
- C) Kortar ner till 6 km lugnt
- D) Byter till alternativ träning
- E) Vila

F) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 42 år, tidigare elitmotionär, tränar 5–6 pass/vecka

Planerat pass: Tröskelpass 3×10 min

Status: Känner sig ovanligt stel i vaderna, vilopuls +8 slag över normal, hög arbetsstress senaste veckan

Alternativ:

- A) Kör passet som planerat
- B) Kortar ner till 2×10 min
- C) Byter till 45 min lugn distans
- D) Vila helt

E) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 27 år, ambitiös motionär, tränar 6 pass/vecka, mål: halvmaraton om 3 veckor

Planerat pass: Långpass 90 min med sista 20 min i tävlingsfart

Status: Känner begynnande ont på utsidan av höger knä (3/10), ökade träningsmängden med 20 % senaste 2 veckorna, mentalt väldigt motiverad

Alternativ:

- A) Kör passet som planerat
- B) Kör 90 min men utan fartökning
- C) Kortar ner till 60 min lugn distans
- D) Avbryter löpning och ersätter med alternativ träning (ex. cykel)
- E) Vila helt

F) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 35 år, motionär, tränar 3–4 pass/vecka, siktar på milen (10 km) om 5 veckor

Planerat pass: 12 km distans varav 5 km i tänkt tävlingsfart

Status: Förkyld för 6 dagar sedan (feberfri i 3 dagar), känner sig 90 % återställd, något rosslig i halsen på morgonen men pigg i kroppen

Alternativ:

- A) Kör 12 km inklusive 5 km i tävlingsfart
- B) Kör 12 km men helt i lugnt tempo
- C) Kortar ner till 6 km lugn distans
- D) Ersätter med 40 min lågintensiv cykel
- E) Vila helt

F) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 31 år, tränar 5 pass/vecka, stabil träningsbakgrund

Planerat pass: 6×1 km intervaller (totalt 12 km inkl. upp-/nedjogg)

Status: Efter 3:e intervallen uppstår plötslig smärta i höger vad (6/10). Går att springa men känns tydligt vid frånskjut.

Alternativ:

- A) Fullföljer alla 6 intervaller
- B) Avslutar intervallerna men joggar hem lugnt
- C) Avbryter passet direkt och går hem
- D) Avbryter löpningen och ersätter med cykel senare samma dag

E) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 24 år, tävlingsinriktad, tränar 7 pass/vecka

Planerat pass: 14 km distans

Status: Kämt sig konstant trött i 2–3 veckor, sänkt fart på distanspassen trots samma ansträngning, sömn ok men låg motivation. HRV lägre än normalt flera dagar i rad.

Alternativ:

- A) Kör 14 km enligt plan
- B) Kortar ner till 8 km lugnt
- C) Byter till 40 min mycket lugn alternativ träning
- D) Vila idag men fortsätter veckan enligt schema
- E) Initierar återhämtningsvecka direkt

F) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 38 år, tränar 4 pass/vecka, väl förberedd

Planerat: Halvmaraton (21,1 km)

Status: Sovit 3–4 timmar natten innan p.g.a. nervositet. Känner sig lite seg men inte sjuk.

Alternativ:

- A) Starta och håll planerad tävlingsfart
- B) Starta men justera målfart något (ex. +10–15 sek/km)
- C) Starta med känsla och ta beslut efter 5 km
- D) Avstå tävlingen

E) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 40 år, tränar 4 pass/vecka, viktningsmål parallellt

Planerat pass: Långpass 16 km lugn distans

Status:

- Märker tydlig pulsdraft efter 8–9 km senaste två långpassen
- Ligger på kaloriunderskott ~500 kcal/dag
- Sovit 6 timmar per natt senaste veckan
- Känner sig "småseg" men inte sjuk

Alternativ:

- A) Kör 16 km enligt plan
- B) Kortar ner till 12 km
- C) Kör 10 km och utvärderar känslan
- D) Vila och prioritera återhämtning
- E) Justerar kostupplägg men genomför passet

F) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 26 år, tränar 5–6 pass/vecka, 10 km-tävling om 10 dagar

Planerat pass: 8 km inkl. 4 km i tävlingsfart

Status:

- Dag 1 i menstruationscykeln
- Upplever lätt mensvärk (4/10)
- Sömn normal
- HRV normal
- Känner sig mentalt stabil

Alternativ:

- A) Kör enligt plan
- B) Genomför passet men sänker tävlingsfarten något
- C) Byter till lugn 8 km distans
- D) Flyttar kvalitetspasset 1–2 dagar fram

E) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 32 år, tränar 5 pass/vecka, halvmaraton om 8 dagar

Planerat pass: 10 km varav 6 km i tävlingsfart

Status:

- Känner begynnande förkylning (lätt halsont)
- HRV något sänkt
- Sovit 5 h
- Säger: "Jag MÅSTE känna tävlingsfarten en gång till."

Alternativ:

- A) Kör passet enligt plan
- B) Kör 10 km men utan fartdel
- C) Kortar till 5–6 km lugnt
- D) Vila och prioritera återhämtning
- E) Flyttar kvalitetspasset 2 dagar fram

F) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 39 år, tränar 4 pass/vecka

Planerat pass: 18 km lugn distans

Status (vid 11 km):

- Tilltagande smärta utsida knä (5/10)
- Försvinner något vid gång
- Har haft 2/10 känning senaste veckan
- Säger: "Det är bara 7 km kvar, jag kan bita ihop."

Alternativ:

- A) Springer klart 18 km
- B) Kortar ner och avslutar vid 13–14 km
- C) Avbryter direkt och går hem
- D) Avbryter och ersätter med cykel senare i veckan

E) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):

Profil: 27 år, tränar 7 pass/vecka, prestationsfokuserad

Planerat pass: 12 km distans

Status:

- Känner sig "lite sliten" i 2 veckor
- HRV svagt nedåtgående trend
- Prestation något sämre på senaste intervallpasset
- Säger: "Det är bara mental svaghet, jag måste trycka igenom."

Alternativ:

- A) Kör 12 km enligt plan
- B) Kör men sänker tempot tydligt
- C) Kortar till 8 km
- D) Vila idag men kör vidare enligt plan imorgon
- E) Initierar återhämtningsvecka

F) Annat + Motivering

Motivering (valfritt):