

## Seminar 1

### Recapitulare logica propozițională

**Teorie pentru S1.1:** Amintim tabelele de adevăr pentru conectorii propoziționali:

$p$	$\neg p$	$p$	$q$	$p \rightarrow q$	$p$	$q$	$p \wedge q$	$p$	$q$	$p \vee q$	$p$	$q$	$p \leftrightarrow q$
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0
		1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Putem să arătăm că o formulă  $\varphi$  este tautologie (validă, universal adevărată) folosind **metoda tabelului de adevăr**. Dacă  $v_1, \dots, v_n$  sunt variabilele propoziționale care apar în  $\varphi$ , atunci cele  $2^n$  evaluări posibile (i.e, o evaluare este o funcție  $e : \{v_1, \dots, v_n\} \rightarrow \{0, 1\}$ )  $e_1, \dots, e_{2^n}$  pot fi scrise într-un tabel:

$v_1$	$v_2$	$\dots$	$v_n$	$\varphi$
$e_1(v_1)$	$e_1(v_2)$	$\dots$	$e_1(v_n)$	$f_{e_1}(\varphi)$
$e_2(v_1)$	$e_2(v_2)$	$\dots$	$e_2(v_n)$	$f_{e_2}(\varphi)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$e_{2^n}(v_1)$	$e_{2^n}(v_2)$	$\dots$	$e_{2^n}(v_n)$	$f_{e_{2^n}}(\varphi)$

Dacă pe coloana lui  $\varphi$  obținem doar valoarea 1, atunci  $\varphi$  este tautologie.

**Teorie pentru S1.2:** Axiomele calculului propozițional sunt următoarele:

(A1)  $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$

(A2)  $(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi))$

(A3)  $(\neg\psi \rightarrow \neg\varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$

unde  $\varphi$ ,  $\psi$  și  $\chi$  sunt formule. În plus, avem următoarea **regulă de deducție**:

$$\text{MP (modus ponens)} \quad \frac{\varphi, \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

O  $\Gamma$ -**demonstrație** este o secvență de formule  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  astfel încât, pentru fiecare  $i \in \{1, \dots, n\}$ , una din următoarele condiții este satisfăcută:

- $\varphi_i$  este axiomă sau  $\varphi_i \in \Gamma$ ,
- $\varphi_i$  se obține din formulele anterioare prin MP.

O formulă  $\varphi$  este  $\Gamma$ -**teoremă** dacă există o  $\Gamma$ -demonstrație  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  astfel încât  $\varphi_n = \varphi$ . Notăm prin  $\Gamma \vdash \varphi$  faptul că  $\varphi$  este  $\Gamma$ -teoremă.

**Teorema 1** (Teorema deducției).  $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi \Leftrightarrow \Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ .

**Teorie pentru S1.3:** Amintim următoarele definiții:

- Un **literal** este o variabilă sau negația unei variabile.
- O **formă normală disjunctivă (FND)** este o disjuncție de conjuncții de literali

$$(l_1 \wedge \dots \wedge l_n) \vee \dots \vee (l'_1 \wedge \dots \wedge l'_m).$$

- O **formă normală conjunctivă (FNC)** este o conjuncție de disjuncții de literali

$$(l_1 \vee \dots \vee l_n) \wedge \dots \wedge (l'_1 \vee \dots \vee l'_m).$$

Pentru orice formulă  $\varphi$  există  $\theta_1$  în FND și  $\theta_2$  în FNC echivalente cu  $\varphi$ .

**Metoda transformărilor sintactice succesive.** Putem aduce o formulă în FND și/sau în FNC folosind următoarele transformări:

- înlocuirea implicațiilor și echivalențelor

$$\begin{aligned} \varphi \rightarrow \psi &\sim \neg\varphi \vee \psi \\ \varphi \leftrightarrow \psi &\sim (\neg\varphi \vee \psi) \wedge (\neg\psi \vee \varphi) \end{aligned}$$

- regulile De Morgan

$$\begin{aligned} \neg(\varphi \vee \psi) &\sim \neg\varphi \wedge \neg\psi \\ \neg(\varphi \wedge \psi) &\sim \neg\varphi \vee \neg\psi \end{aligned}$$

- principiului dublei negații

$$\neg\neg\psi \sim \psi$$

- distributivitatea

$$\begin{aligned} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) &\sim (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \\ (\psi \wedge \chi) \vee \varphi &\sim (\psi \vee \varphi) \wedge (\chi \vee \varphi) \end{aligned}$$

- absorbția

$$\begin{aligned} \varphi \wedge (\varphi \vee \psi) &\sim \varphi \\ \varphi \vee (\varphi \wedge \psi) &\sim \varphi \end{aligned}$$

**Metoda funcției booleene asociate unei formule.** Fie  $\varphi$  o formulă,  $v_1, \dots, v_n$  variabilele care apar în  $\varphi$  și  $e_1, \dots, e_{2^n}$  evaluările posibile. Tabelul asociat lui  $\varphi$  definește funcția booleană  $F_\varphi : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ :

$v_1$	$v_2$	$\dots$	$v_n$	$\varphi$	$x_1$	$x_2$	$\dots$	$x_n$	$F_\varphi(x_1, \dots, x_n)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$e_k(v_1)$	$e_k(v_2)$	$\dots$	$e_k(v_n)$	$f_{e_k}(\varphi)$	$e_k(v_1)$	$e_k(v_2)$	$\dots$	$e_k(v_n)$	$f_{e_k}(\varphi)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Dacă luăm disjuncția cazurilor în care avem 1 în tabelul de adevăr al funcției booleene obținem o formulă în FND.

**Teorie pentru S1.4:** O **clauză** este o mulțime finită de literali, i.e  $C = \{L_1, \dots, L_n\}$  unde  $L_1, \dots, L_n$  sunt literali. O clauză  $C = \{L_1, \dots, L_n\}$  este satisfiabilă dacă  $L_1 \vee \dots \vee L_n$  este satisfiabilă. **Clauza vidă**  $\square = \{\}$  nu este satisfiabilă. O mulțime de clauze  $\mathcal{S} = \{C_1, \dots, C_m\}$  este satisfiabilă dacă există o evaluare  $e : Var \rightarrow \{0, 1\}$  astfel încât  $e(C_i) = 1$  oricare  $i \in \{1, \dots, m\}$ .

$$\begin{aligned} \text{clauză} &= \text{disjuncție de literali} \\ \text{mulțime de clauze} &= \text{FNC} \end{aligned}$$

**Regula rezoluției:**

$$Rez \frac{C_1 \cup \{p\}, C_2 \cup \{\neg p\}}{C_1 \cup C_2}$$

unde  $\{p, \neg p\} \cap C_1 = \emptyset$  și  $\{p, \neg p\} \cap C_2 = \emptyset$ .

Fie  $\mathcal{S}$  o mulțime de clauze. O *derivare prin rezoluție* din  $\mathcal{S}$  este o secvență finită de clauze astfel încât fiecare clauză este din  $\mathcal{S}$  sau rezultă din clauze anterioare prin rezoluție. Dacă există o derivare prin rezoluție care se termină cu  $\square$ , atunci mulțimea inițială de clauze este nesatisfiabilă.

(S1.1) Arătați că următoarea formulă în logica propozițională este o tautologie:

$$(v_1 \vee v_2 \rightarrow v_3) \leftrightarrow (v_1 \rightarrow v_3) \wedge (v_2 \rightarrow v_3)$$

(S1.2) Fie  $\varphi$  și  $\psi$  formule în logica propozițională. Să se arate sintactic că

$$\vdash \varphi \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \psi).$$

(S1.3) Fie  $\varphi := (p \leftrightarrow \neg q) \rightarrow p$  o formulă în logica propozițională. Să se aducă  $\varphi$  la cele două forme normale, folosind, pe rând:

- (i) metoda transformărilor sintactice succesive,
- (ii) metoda funcției booleene corespunzătoare formulei  $\varphi$ .

(S1.4) Să se arate folosind rezoluția că următoarea formulă este nesatisfiabilă:

$$\varphi := (\neg v_1 \vee \neg v_2) \wedge ((v_3 \rightarrow \neg v_2) \vee v_1) \wedge (v_1 \rightarrow v_2) \wedge (v_2 \wedge v_3)$$

(S1.5) Fie  $L$  un limbaj pentru logica propozițională, cu un vocabular alcătuit din următoarea mulțime de variabile propoziționale  $V = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ . Să se găsească mulțimea modelelor următoarei formule propoziționale:

$$\gamma := (v_0 \wedge \bigvee_{1 \leq i \leq n} v_i) \leftrightarrow \bigvee_{1 \leq i \leq n} (v_0 \wedge v_i)$$

(S1.6) Există două triburi pe insula Tufa - Tu și Fa. Membrii tribului Tu spun întotdeauna adevărul, iar membrii tribului Fa mint întotdeauna. Un călător întâlnește trei băștinași -  $A$ ,  $B$ , și  $C$ . Fiecare dintre ei face o declarație călătorului:

- $A$  spune: ” $B$  și  $C$  spun adevărul dacă și numai dacă  $C$  spune adevărul”,
- $B$  spune: ”dacă  $A$  și  $C$  spun adevărul atunci este fals faptul că  $A$  spune adevărul când  $B$  și  $C$  spun adevărul”,
- $C$  spune: ” $B$  minte dacă și numai dacă  $A$  sau  $B$  spun adevărul”.

Puteți determina din ce trib fac parte  $A$ ,  $B$  și  $C$ ?