



# **Rapport d'activité 2025**

**1997-2022**



Le Registre Régional des Hémopathies Malignes de Basse-Normandie (RRHMBN) est localisé au Centre Hospitalier Universitaire de Caen Normandie depuis 1998. C'est un registre spécialisé en hématologie, qui recueille de façon active et exhaustive les données des patients domiciliés dans les départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne.

Le RRHMBN est certifié par le Comité National des Registres (CNR) tous les 4 ans, avec un dernier renouvellement en 2024.

Le registre est un outil ouvert à l'ensemble de la communauté médicale, qui permet par son exhaustivité, de connaître avec précision l'évolution de l'incidence de l'ensemble de ces hémopathies malignes et d'étudier leur évolution temporo-spatiale. Les données enregistrées permettent des travaux scientifiques de haute qualité.

Chaque année, environ 1000 nouveaux cas d'hémopathies malignes sont enregistrés en Basse-Normandie.

L'identification de chaque patient et de son parcours de soin résulte du croisement d'un nombre de sources de signalement important, provenant de 78 bases à notre disposition, notamment celle du D.I.M (Département d'Information Médicale) des établissements de la région, mais aussi des laboratoires de biologie médicale et d'anatomo-pathologie,...La multiplicité des sources de signalement garantit l'exhaustivité et la qualité des données.

Conformément à la Réglementation Générale des Protections De Données et selon les procédures communes à l'ensemble des registres de cancers du réseau Francim, les données sont enregistrées et

hébergées sur un serveur sécurisé du CHU de Caen de Normandie.

Ces données sont transmises de façon anonyme, au service de biostatistiques des Hospices Civils de Lyon (HCL) qui centralise toutes les données de l'ensemble des registres dans une base nationale conformément au partenariat validé par l'ensemble de nos tutelles : Institut National du Cancer (I.N.C.a) et Santé Publique France.

Nous tenons à remercier l'ensemble des acteurs participant au signalement des cas incidents et au bon fonctionnement du registre

L'équipe du Registre de Basse-Normandie



**Pr X. TROUSSARD**  
**Directeur**  
Laboratoire Hématologie  
CHU Avenue de la Côte de Nacre  
14033 Caen Cedex 9  
[troussard-x@chu-caen.fr](mailto:troussard-x@chu-caen.fr)  
Tél : 02 31 27 50 14

**Dr E. CORNET**  
**Praticien Hospitalier**  
Laboratoire Hématologie  
CHU Avenue de la Côte de Nacre  
14033 Caen Cedex 9  
[cornet-e@chu-caen.fr](mailto:cornet-e@chu-caen.fr)  
Tél : 02 31 27 48 03

**V. DUCHENET**  
**Attachée de recherche clinique**  
**Calvados et Orne**  
RRHMBN  
CHU Avenue de la Côte de Nacre  
14033 Caen Cedex 9  
[duchenet-v@chu-caen.fr](mailto:duchenet-v@chu-caen.fr)  
Tél. : 02 31 27 20 91

**J.M. PONCET**  
**Attaché de recherche clinique**  
**Manche**  
RRHMBN  
CHU Avenue de la Côte de Nacre  
14033 Caen Cedex 9  
[poncet-jm@chu-caen.fr](mailto:poncet-jm@chu-caen.fr)  
Tél. : 02 31 27 23 49

**F. LELIEVRE**  
**Secrétaire du Registre de**  
**Basse-Normandie**  
RRHMBN  
CHU Avenue de la Côte de Nacre  
14033 Caen Cedex 9  
[lelievre-fr@chu-caen.fr](mailto:lelievre-fr@chu-caen.fr)  
Tél. : 02 31 27 23 22

|                                                             |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hémopathies lymphoïdes B (/3)</b>                        |                                                                                                                                                                         |
| Leucémie aiguë lymphoblastique B                            | 96873 97283 98113 98123 98133 98143 98153 98163 98173 98183 98193 98263 98353 98363                                                                                     |
| Lymphome de Hodgkin                                         | 96503 96513 96523 96533 96543 96553 96593 96613 96623 96633 96643 96653 96673                                                                                           |
| Leucémie lymphoïde chronique (LLC) / Lymphome lymphocytaire | 96703 98233                                                                                                                                                             |
| Myélome multiple et plasmocytome                            | 97313 97323 97333 97343                                                                                                                                                 |
| Lymphome diffus à grandes cellules B                        | 96783 96793 96803 96843 96883 97383                                                                                                                                     |
| Lymphome folliculaire                                       | 96743 95973 96903 96913 96953 96983 97953                                                                                                                               |
| Lymphome de la zone marginale                               | 96893 96993                                                                                                                                                             |
| Lymphome lymphoplasmocytaire / Maladie de Waldenström       | 96713 97613                                                                                                                                                             |
| Lymphome du manteau                                         | 96733                                                                                                                                                                   |
| Leucémie à tricholeucocytes                                 | 99403                                                                                                                                                                   |
| Leucémie prolymphocytaire B                                 | 98323 98333                                                                                                                                                             |
| Maladie immunoproliférative                                 | 97603 97623 97643                                                                                                                                                       |
| Lymphome plasmablastique                                    | 97353                                                                                                                                                                   |
| Granulomatose lymphomatoïde grade 3                         | 97663                                                                                                                                                                   |
| <b>Lymphome non-hodgkinien NOS</b>                          | 96943 95903 95913 95963 96753 97123 97373 98203 99713                                                                                                                   |
| <b>Hémopathies lymphoïdes T (/3)</b>                        |                                                                                                                                                                         |
| Lymphome T/NK à cellules matures                            | 97003 97013 97023 97053 97083 97093 97143 97153 97163 97173 97183 97193 97243 97253 97263 98273 99483                                                                   |
| Leucémie à grands lymphocytes à grains (LGL)                | 98311 98313                                                                                                                                                             |
| Leucémie aiguë lymphoblastique T                            | 97293 98373                                                                                                                                                             |
| Sarcome de Kaposi                                           | 91403                                                                                                                                                                   |
| Leucémie prolymphocytaire T                                 | 98343                                                                                                                                                                   |
| <b>Hémopathies myéloïdes (/3)</b>                           |                                                                                                                                                                         |
| Syndrome myélodysplasique (SMD)                             | 99803 99823 99833 99853 99863 99873 99893 99913 99923 99933                                                                                                             |
| Leucémie aiguë myéloïde (LAM)                               | 98003 98013 98403 98603 98613 98653 98673 98693 98703 98713 98723 98733 98743 98773 98783 98793 98913 98953 98963 98973 98983 99103 99113 99123 99203 99303 99313 99843 |
| Thrombocyémie essentielle                                   | 99623                                                                                                                                                                   |
| Polyglobulie de Vaquez                                      | 99503                                                                                                                                                                   |
| Leucémie myéloïde chronique                                 | 98633 98753                                                                                                                                                             |
| Syndrome myélodysplasique myéloprolifératif                 | 98763 99453 99463 99753                                                                                                                                                 |
| Syndrome myéloprolifératif (SMP) avec myélofibrose          | 99613                                                                                                                                                                   |
| Autres syndromes myéloprolifératifs chroniques              | 99603 99633 99643                                                                                                                                                       |
| Leucémie aiguë myéloïde promyélocytaire                     | 98663                                                                                                                                                                   |
| Mastocytose                                                 | 97403 97413 97423                                                                                                                                                       |
| <b>Autres</b>                                               |                                                                                                                                                                         |
| Leucémie aiguë de lignée ambiguë                            | 98053 98063 98073 98083 98093                                                                                                                                           |
| Néoplasie à cellules histiocytaires/dendritiques            | 97273 97503 97513 97543 97553 97563 97573 97583 97593                                                                                                                   |
| Néoplasie myéloïde/lymphoïde avec éosinophilie              | 99653 99663 99673                                                                                                                                                       |

| Types d'hémapathies - Période d'incidence 1997 - 2022 - Tous âges | Femmes        |       |              |                            |             | Hommes        |       |              |                            |            | Sex ratio     | Total         |       |              |                            |             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------------|----------------------------|-------------|---------------|-------|--------------|----------------------------|------------|---------------|---------------|-------|--------------|----------------------------|-------------|
|                                                                   | Effectif      | %     | Taux bruts * | Tx standardisés **         | Age médian  | Effectif      | %     | Taux bruts * | Tx standardisés **         | Age médian | effectifs H/F | Effectif      | %     | Taux bruts * | Tx standardisés **         | Age médian  |
| <b>Hémopathies lymphoïdes B (/3)</b>                              |               |       |              |                            |             |               |       |              |                            |            |               |               |       |              |                            |             |
| Leucémie aiguë lymphoblastique B                                  | 190           | 3,0%  | 0,96         | 1,18 (0,64-1,73)           | 14          | 242           | 3,0%  | 1,30         | 1,46 (0,85-2,06)           | 18,5       | 1,3           | 432           | 3,0%  | 1,13         | 1,32 (0,74-1,89)           | 17,5        |
| Lymphome de Hodgkin                                               | 453           | 7,1%  | 2,29         | 2,5 (1,75-3,25)            | 35          | 582           | 7,2%  | 3,14         | 2,99 (2,19-3,79)           | 41         | 1,3           | 1 035         | 7,2%  | 2,70         | 2,74 (1,97-3,52)           | 38          |
| Leucémie lymphoïde chronique (LLC) / Lymphome lymphocytaire       | 1 427         | 22,4% | 7,23         | 3,27 (2,71-3,82)           | 74          | 2 005         | 24,9% | 10,80        | 5,01 (4,31-5,71)           | 71         | 1,4           | 3 432         | 23,8% | 8,96         | 4,12 (3,49-4,75)           | 72          |
| Myélome multiple et plasmocytome                                  | 1 444         | 22,7% | 7,31         | 3,35 (2,79-3,92)           | 73          | 1 597         | 19,8% | 8,60         | 3,99 (3,36-4,62)           | 72         | 1,1           | 3 041         | 21,1% | 7,94         | 3,66 (3,06-4,26)           | 73          |
| Lymphome diffus à grandes cellules B                              | 1 255         | 19,7% | 6,35         | 3,17 (2,57-3,78)           | 74          | 1 453         | 18,0% | 7,83         | 4,18 (3,45-4,91)           | 70         | 1,2           | 2 708         | 18,8% | 7,07         | 3,67 (3-4,34)              | 72          |
| Lymphome folliculaire                                             | 647           | 10,2% | 3,28         | 1,87 (1,4-2,34)            | 68          | 663           | 8,2%  | 3,57         | 2,04 (1,53-2,55)           | 64         | 1,0           | 1 310         | 9,1%  | 3,42         | 1,95 (1,46-2,44)           | 66          |
| Lymphome de la zone marginale                                     | 482           | 7,6%  | 2,44         | 1,16 (0,82-1,51)           | 74          | 549           | 6,8%  | 2,96         | 1,41 (1,02-1,8)            | 72         | 1,1           | 1 031         | 7,1%  | 2,69         | 1,28 (0,91-1,65)           | 73          |
| Lymphome lymphoplasmocytaire / Maladie de Waldenström             | 276           | 4,3%  | 1,40         | 0,59 (0,37-0,82)           | 75          | 498           | 6,2%  | 2,68         | 1,15 (0,83-1,48)           | 74         | 1,8           | 774           | 5,4%  | 2,02         | 0,87 (0,59-1,15)           | 74          |
| Lymphome du manteau                                               | 152           | 2,4%  | 0,77         | 0,33 (0,16-0,5)            | 76          | 321           | 4,0%  | 1,73         | 0,75 (0,49-1,02)           | 74         | 2,1           | 473           | 3,3%  | 1,23         | 0,54 (0,32-0,76)           | 74          |
| Leucémie à tricholeucocytes                                       | 32            | 0,5%  | 0,16         | 0,1 (0-0,22)               | 64,5        | 130           | 1,6%  | 0,70         | 0,39 (0,17-0,6)            | 64         | 4,1           | 162           | 1,1%  | 0,42         | 0,24 (0,07-0,42)           | 64          |
| Leucémie prolymphocytaire B                                       | 9             | 0,1%  | 0,05         | 0,02 (0-0,06)              | 79          | 8             | 0,1%  | 0,04         | 0,02 (0-0,07)              | 69         | 0,9           | 17            | 0,1%  | 0,04         | 0,02 (0-0,06)              | 76          |
| Maladie immunoproliférative                                       | 5             | 0,1%  | 0,03         | 0,01 (0-0,04)              | 79          | 2             | 0,0%  | 0,01         | 0,01 (0-0,05)              | 53         | 0,4           | 7             | 0,0%  | 0,02         | 0,01 (0-0,05)              | 75          |
| Lymphome plasmablastique                                          | 1             | 0,0%  | 0,01         | 0,03 (0-17,59)             | 87          | 3             | 0,0%  | 0,02         | 0,04 (0-23,46)             | 68         | 3,0           | 4             | 0,0%  | 0,01         | 0,04 (0-20,47)             | 73,5        |
| Granulomatose lymphomatoïde grade 3                               | 1             | 0,0%  | 0,01         | 17,56 (16,04-19,07)        | 79          | 0             | 0,0%  |              |                            |            |               | 1             | 0,0%  | 0,00         | 20,43 (18,79-22,06)        | 79          |
| <b>Total</b> Hémopathies lymphoïdes B (/3)                        | <b>6 374</b>  |       | <b>32,27</b> | <b>17,56 (16,04-19,07)</b> | <b>72</b>   | <b>8 053</b>  |       | <b>43,39</b> | <b>23,41 (21,66-25,17)</b> | <b>70</b>  | <b>1,3</b>    | <b>14 427</b> |       | <b>37,66</b> | <b>20,43 (18,79-22,06)</b> | <b>71</b>   |
| <b>Lymphome non-hodgkinien NOS</b>                                | <b>257</b>    |       | <b>1,30</b>  | <b>0,55 (0,33-0,77)</b>    | <b>77</b>   | <b>267</b>    |       | <b>1,44</b>  | <b>0,64 (0,38-0,9)</b>     | <b>75</b>  | <b>1,0</b>    | <b>524</b>    |       | <b>1,37</b>  | <b>0,59 (0,35-0,83)</b>    | <b>76,5</b> |
| <b>Hémopathies lymphoïdes T (/3)</b>                              |               |       |              |                            |             |               |       |              |                            |            |               |               |       |              |                            |             |
| Lymphome T/NK à cellules matures                                  | 369           | 61,1% | 1,87         | 1,18 (0,76-1,61)           | 67          | 533           | 63,8% | 2,87         | 1,68 (1,19-2,16)           | 67         | 1,4           | 902           | 62,6% | 2,35         | 1,43 (0,97-1,88)           | 67          |
| Leucémie à grands lymphocytes à grains (LGL)                      | 176           | 29,1% | 0,89         | 0,48 (0,24-0,71)           | 69          | 175           | 20,9% | 0,94         | 0,51 (0,26-0,75)           | 67         | 1,0           | 351           | 24,4% | 0,92         | 0,49 (0,25-0,73)           | 68          |
| Leucémie aiguë lymphoblastique T                                  | 26            | 4,3%  | 0,13         | 0,16 (0-0,35)              | 24          | 77            | 9,2%  | 0,41         | 0,52 (0,16-0,88)           | 16         | 3,0           | 103           | 7,2%  | 0,27         | 0,34 (0,05-0,63)           | 17          |
| Sarcome de Kaposi                                                 | 16            | 2,6%  | 0,08         | 0,04 (0-0,1)               | 80          | 36            | 4,3%  | 0,19         | 0,11 (0-0,23)              | 68         | 2,3           | 52            | 3,6%  | 0,14         | 0,07 (0-0,17)              | 69,5        |
| Leucémie prolymphocytaire T                                       | 17            | 2,8%  | 0,09         | 0,04 (0-0,09)              | 77          | 15            | 1,8%  | 0,08         | 0,04 (0-0,11)              | 76         | 0,9           | 32            | 2,2%  | 0,08         | 0,04 (0-0,1)               | 76          |
| <b>Total</b> Hémopathies lymphoïdes T (/3)                        | <b>604</b>    |       | <b>3,06</b>  | <b>1,89 (1,36-2,42)</b>    | <b>67</b>   | <b>836</b>    |       | <b>4,50</b>  | <b>2,86 (2,19-3,53)</b>    | <b>66</b>  | <b>1,4</b>    | <b>1 440</b>  |       | <b>3,76</b>  | <b>2,37 (1,77-2,97)</b>    | <b>66</b>   |
| <b>Hémopathies myéloïdes (/3)</b>                                 |               |       |              |                            |             |               |       |              |                            |            |               |               |       |              |                            |             |
| Syndrome myélodysplasique (SMD)                                   | 1 600         | 36,9% | 8,10         | 3,03 (2,54-3,53)           | 79,5        | 1 940         | 40,7% | 10,45        | 4,03 (3,45-4,62)           | 78         | 1,2           | 3 540         | 38,9% | 9,24         | 3,51 (2,97-4,05)           | 78          |
| Leucémie aiguë myéloïde (LAM)                                     | 841           | 19,4% | 4,26         | 2,18 (1,64-2,71)           | 76          | 848           | 17,8% | 4,57         | 2,39 (1,84-2,95)           | 72         | 1,0           | 1 689         | 18,6% | 4,41         | 2,28 (1,73-2,83)           | 73          |
| Thrombocytémie essentielle                                        | 911           | 21,0% | 4,61         | 2,43 (1,89-2,97)           | 72          | 611           | 12,8% | 3,29         | 1,71 (1,26-2,17)           | 70         | 0,7           | 1 522         | 16,7% | 3,97         | 2,07 (1,57-2,57)           | 71          |
| Polyglobulie de Vaquez                                            | 327           | 7,6%  | 1,66         | 0,78 (0,5-1,06)            | 73          | 395           | 8,3%  | 2,13         | 1,09 (0,74-1,44)           | 68         | 1,2           | 722           | 7,9%  | 1,88         | 0,93 (0,62-1,25)           | 71          |
| Leucémie myéloïde chronique                                       | 225           | 5,2%  | 1,14         | 0,75 (0,42-1,08)           | 65          | 294           | 6,2%  | 1,58         | 1,04 (0,64-1,44)           | 61         | 1,3           | 519           | 5,7%  | 1,35         | 0,9 (0,53-1,26)            | 62          |
| Syndrome myélodysplasique myéloprolifératif                       | 186           | 4,3%  | 0,94         | 0,38 (0,18-0,57)           | 78          | 308           | 6,5%  | 1,66         | 0,65 (0,41-0,9)            | 78         | 1,7           | 494           | 5,4%  | 1,29         | 0,51 (0,29-0,73)           | 78          |
| Syndrome myéloprolifératif (SMP) avec myélofibrose                | 83            | 1,9%  | 0,42         | 0,18 (0,05-0,31)           | 75          | 164           | 3,4%  | 0,88         | 0,43 (0,22-0,63)           | 70,5       | 2,0           | 247           | 2,7%  | 0,64         | 0,3 (0,13-0,47)            | 72          |
| Autres syndromes myéloprolifératifs chroniques                    | 102           | 2,4%  | 0,52         | 0,24 (0,08-0,4)            | 77          | 135           | 2,8%  | 0,73         | 0,34 (0,15-0,53)           | 72         | 1,3           | 237           | 2,6%  | 0,62         | 0,29 (0,11-0,46)           | 74          |
| Leucémie aiguë myéloïde promyélocytaire                           | 44            | 1,0%  | 0,22         | 0,18 (0,01-0,35)           | 54,5        | 50            | 1,0%  | 0,27         | 0,21 (0,02-0,4)            | 57         | 1,1           | 94            | 1,0%  | 0,25         | 0,19 (0,01-0,38)           | 55,5        |
| Mastocytose                                                       | 12            | 0,3%  | 0,06         | 0,17 (0-10,37)             | 47,5        | 18            | 0,4%  | 0,10         | 0,19 (0-12,16)             | 58,5       | 1,5           | 30            | 0,3%  | 0,08         | 0,18 (0-11,22)             | 51,5        |
| <b>Total</b> Hémopathies myéloïdes (/3)                           | <b>4 331</b>  |       | <b>21,93</b> | <b>10,2 (9,14-11,26)</b>   | <b>76</b>   | <b>4 763</b>  |       | <b>25,66</b> | <b>11,96 (10,81-13,11)</b> | <b>74</b>  | <b>1,1</b>    | <b>9 094</b>  |       | <b>23,74</b> | <b>11,04 (9,93-12,14)</b>  | <b>75</b>   |
| <b>Autres</b>                                                     |               |       |              |                            |             |               |       |              |                            |            |               |               |       |              |                            |             |
| Leucémie aiguë de lignée ambiguë                                  | 31            | 62,0% | 0,16         | 0,15 (0-0,32)              | 50          | 37            | 55,2% | 0,20         | 0,18 (0-0,38)              | 48         | 1,2           | 68            | 58,1% | 0,18         | 0,16 (0-0,35)              | 49,5        |
| Néoplasie à cellules histiocytaires/dendritiques                  | 19            | 38,0% | 0,10         | 0 (0-0)                    | 15          | 29            | 43,3% | 0,16         | 0 (0-0)                    | 39         | 1,5           | 48            | 41,0% | 0,13         | 0 (0-0)                    | 31          |
| Néoplasie myéloïde/lymphoïde avec éosinophilie                    | 0             | 0,0%  |              |                            |             | 1             | 1,5%  | 0,01         | 0,06 (0-0,15)              | 73         |               | 1             | 0,9%  | 0,00         | 0,06 (0-0,16)              | 73          |
| <b>Total</b> Autres (/3)                                          | <b>50</b>     |       | <b>0,25</b>  | <b>0,27 (0,02-0,51)</b>    | <b>38,5</b> | <b>67</b>     |       | <b>0,36</b>  | <b>0,33 (0,06-0,61)</b>    | <b>47</b>  | <b>1,3</b>    | <b>117</b>    |       | <b>0,31</b>  | <b>0,3 (0,04-0,56)</b>     | <b>42</b>   |
| <b>Total (/3)</b>                                                 | <b>11 616</b> |       | <b>58,82</b> | <b>30,46 (28,51-32,41)</b> | <b>73</b>   | <b>13 986</b> |       | <b>75,35</b> | <b>39,21 (36,97-41,44)</b> | <b>71</b>  | <b>1,2</b>    | <b>25 602</b> |       | <b>66,83</b> | <b>34,72 (32,63-36,82)</b> | <b>72</b>   |


# Leucémie aiguë lymphoblastique B

Codes ICDO : 96873, 97283, 98113, 98123, 98133, 98143, 98153, 98163, 98173, 98183, 98193, 98263, 98353, 98363

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 7      | 7      | 8        | 4      | 2    | 14    | 3,2   |
| 1998  | 11     | 3      | 4        | 6      | 4    | 14    | 3,2   |
| 1999  | 10     | 6      | 7        | 6      | 3    | 16    | 3,7   |
| 2000  | 14     | 6      | 11       | 7      | 2    | 20    | 4,6   |
| 2001  | 6      | 7      | 5        | 6      | 2    | 13    | 3,0   |
| 2002  | 9      | 6      | 4        | 7      | 4    | 15    | 3,5   |
| 2003  | 8      | 6      | 8        | 1      | 5    | 14    | 3,2   |
| 2004  | 11     | 9      | 7        | 10     | 3    | 20    | 4,6   |
| 2005  | 9      | 8      | 7        | 8      | 2    | 17    | 3,9   |
| 2006  | 9      | 8      | 10       | 4      | 3    | 17    | 3,9   |
| 2007  | 7      | 8      | 7        | 7      | 1    | 15    | 3,5   |
| 2008  | 10     | 6      | 12       | 2      | 2    | 16    | 3,7   |
| 2009  | 6      | 10     | 10       | 5      | 1    | 16    | 3,7   |
| 2010  | 5      | 7      | 6        | 2      | 4    | 12    | 2,8   |
| 2011  | 9      | 9      | 9        | 6      | 3    | 18    | 4,2   |
| 2012  | 11     | 7      | 11       | 4      | 3    | 18    | 4,2   |
| 2013  | 6      | 5      | 5        | 2      | 4    | 11    | 2,5   |
| 2014  | 12     | 11     | 12       | 9      | 2    | 23    | 5,3   |
| 2015  | 5      | 9      | 6        | 6      | 2    | 14    | 3,2   |
| 2016  | 15     | 8      | 15       | 2      | 6    | 23    | 5,3   |
| 2017  | 7      | 8      | 6        | 4      | 5    | 15    | 3,5   |
| 2018  | 10     | 5      | 5        | 7      | 3    | 15    | 3,5   |
| 2019  | 6      | 7      | 6        | 3      | 4    | 13    | 3,0   |
| 2020  | 11     | 10     | 11       | 4      | 6    | 21    | 4,9   |
| 2021  | 18     | 8      | 11       | 7      | 8    | 26    | 6,0   |
| 2022  | 10     | 6      | 10       | 4      | 2    | 16    | 3,7   |
| Total | 242    | 190    | 213      | 133    | 86   | 432   | 100,0 |
| %     | 56,0   | 44,0   | 49,3     | 30,8   | 19,9 | 100,0 |       |

Proportion de Leucémie aiguë lymphoblastique B  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 29,9 |
| Age médian  | 17,5 |
| Femmes      | 14,0 |
| Hommes      | 18,5 |
| Age maximal | 92   |
| Age minimal | 0    |


|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 242                   | 190                   | 213                   | 133                   | 86                    | 432                   |
| Taux bruts annuels*           | 1,30                  | 0,96                  | 1,20                  | 1,03                  | 1,13                  | 1,13                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 1,46<br>(0,85 - 2,06) | 1,18<br>(0,64 - 1,73) | 1,37<br>(0,77 - 1,96) | 1,29<br>(0,57 - 2)    | 1,30<br>(0,38 - 2,21) | 1,32<br>(0,74 - 1,89) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 1,24<br>(1,16 - 1,32) | 0,92<br>(0,85 - 0,98) | 1,14<br>(1,07 - 1,22) | 1,00<br>(0,91 - 1,08) | 1,08<br>(0,97 - 1,2)  | 1,08<br>(1 - 1,15)    |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 1,30<br>(1,2 - 1,41)  | 1,01<br>(0,92 - 1,11) | 1,21<br>(1,11 - 1,31) | 1,10<br>(0,97 - 1,22) | 1,16<br>(1 - 1,32)    | 1,15<br>(1,06 - 1,25) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010) \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |           |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | > 15 ans            | 0,79 (151)                       | 0,72 (134) | 0,67 (115) | 0,67 (84) | 0,65 (61) |
| Hommes          | > 15 ans            | 0,74 (178)                       | 0,66 (156) | 0,61 (120) | 0,57 (88) | 0,55 (59) |
| Significativité |                     | NS                               | NS         | NS         | p<0,01    | p<0,05    |


# Lymphome de Hodgkin

Codes ICDO : 96503, 96513, 96523, 96533, 96543, 96553, 96593, 96613, 96623, 96633, 96643, 96653, 96673

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 22     | 12     | 14       | 12     | 8    | 34    | 3,3   |
| 1998  | 19     | 14     | 10       | 17     | 6    | 33    | 3,2   |
| 1999  | 17     | 8      | 18       | 5      | 2    | 25    | 2,4   |
| 2000  | 17     | 15     | 14       | 11     | 7    | 32    | 3,1   |
| 2001  | 17     | 14     | 15       | 8      | 8    | 31    | 3,0   |
| 2002  | 27     | 16     | 19       | 14     | 10   | 43    | 4,2   |
| 2003  | 23     | 25     | 23       | 17     | 8    | 48    | 4,6   |
| 2004  | 29     | 15     | 20       | 19     | 5    | 44    | 4,3   |
| 2005  | 26     | 13     | 14       | 16     | 9    | 39    | 3,8   |
| 2006  | 20     | 15     | 21       | 8      | 6    | 35    | 3,4   |
| 2007  | 12     | 19     | 11       | 13     | 7    | 31    | 3,0   |
| 2008  | 21     | 21     | 22       | 16     | 4    | 42    | 4,1   |
| 2009  | 25     | 17     | 28       | 13     | 1    | 42    | 4,1   |
| 2010  | 19     | 23     | 20       | 12     | 10   | 42    | 4,1   |
| 2011  | 17     | 19     | 16       | 16     | 4    | 36    | 3,5   |
| 2012  | 32     | 17     | 24       | 19     | 6    | 49    | 4,7   |
| 2013  | 23     | 16     | 14       | 16     | 9    | 39    | 3,8   |
| 2014  | 26     | 25     | 23       | 17     | 11   | 51    | 4,9   |
| 2015  | 26     | 15     | 15       | 15     | 11   | 41    | 4,0   |
| 2016  | 25     | 26     | 28       | 17     | 6    | 51    | 4,9   |
| 2017  | 23     | 14     | 12       | 15     | 10   | 37    | 3,6   |
| 2018  | 26     | 19     | 23       | 14     | 8    | 45    | 4,3   |
| 2019  | 16     | 26     | 24       | 11     | 7    | 42    | 4,1   |
| 2020  | 23     | 21     | 24       | 10     | 10   | 44    | 4,3   |
| 2021  | 21     | 10     | 15       | 10     | 6    | 31    | 3,0   |
| 2022  | 30     | 18     | 21       | 18     | 9    | 48    | 4,6   |
| Total | 582    | 453    | 488      | 359    | 188  | 1 035 | 100,0 |
| %     | 56,2   | 43,8   | 47,1     | 34,7   | 18,2 | 100,0 |       |

Proportion de Lymphome de Hodgkin  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 42,5 |
| Age médian  | 38,0 |
| Femmes      | 35,0 |
| Hommes      | 41,0 |
| Age maximal | 99   |
| Age minimal | 4    |


|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 582                   | 453                   | 488                   | 359                   | 188                   | 1 035                 |
| Taux bruts annuels*           | 3,14                  | 2,29                  | 2,75                  | 2,77                  | 2,48                  | 2,70                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 2,99<br>(2,19 - 3,79) | 2,50<br>(1,75 - 3,25) | 2,76<br>(1,98 - 3,55) | 2,93<br>(1,91 - 3,95) | 2,43<br>(1,24 - 3,61) | 2,74<br>(1,97 - 3,52) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 3,20<br>(3,08 - 3,33) | 2,35<br>(2,25 - 2,46) | 2,78<br>(2,66 - 2,91) | 2,88<br>(2,73 - 3,03) | 2,58<br>(2,39 - 2,76) | 2,77<br>(2,65 - 2,88) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 3,12<br>(2,96 - 3,29) | 2,39<br>(2,25 - 2,54) | 2,78<br>(2,62 - 2,94) | 2,89<br>(2,69 - 3,08) | 2,51<br>(2,27 - 2,75) | 2,75<br>(2,6 - 2,9)   |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010) \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |            |            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans     |
| Femmes          | > 15 ans            | 0,92 (414)                       | 0,89 (389) | 0,83 (333) | 0,78 (230) | 0,72 (128) |
| Hommes          | > 15 ans            | 0,89 (515)                       | 0,85 (471) | 0,79 (400) | 0,72 (276) | 0,67 (173) |
| Significativité |                     | NS                               | p<0,05     | p<0,05     | p<0,01     | p<0,01     |

# Leucémie lymphoïde chronique (LLC) / Lymphome lymphocytaire

Codes ICDO : 96703, 98233

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 58     | 41     | 50       | 34     | 15   | 99    | 2,9   |
| 1998  | 48     | 47     | 48       | 23     | 24   | 95    | 2,8   |
| 1999  | 79     | 53     | 68       | 42     | 22   | 132   | 3,8   |
| 2000  | 76     | 59     | 63       | 47     | 25   | 135   | 3,9   |
| 2001  | 66     | 39     | 49       | 38     | 18   | 105   | 3,1   |
| 2002  | 63     | 31     | 43       | 29     | 22   | 94    | 2,7   |
| 2003  | 60     | 47     | 44       | 51     | 12   | 107   | 3,1   |
| 2004  | 56     | 44     | 41       | 42     | 17   | 100   | 2,9   |
| 2005  | 78     | 59     | 56       | 43     | 38   | 137   | 4,0   |
| 2006  | 79     | 56     | 58       | 47     | 30   | 135   | 3,9   |
| 2007  | 75     | 65     | 64       | 46     | 30   | 140   | 4,1   |
| 2008  | 74     | 72     | 64       | 44     | 38   | 146   | 4,3   |
| 2009  | 77     | 66     | 67       | 47     | 29   | 143   | 4,2   |
| 2010  | 84     | 66     | 60       | 57     | 33   | 150   | 4,4   |
| 2011  | 96     | 53     | 71       | 52     | 26   | 149   | 4,3   |
| 2012  | 78     | 70     | 78       | 41     | 29   | 148   | 4,3   |
| 2013  | 67     | 58     | 57       | 41     | 27   | 125   | 3,6   |
| 2014  | 82     | 63     | 60       | 58     | 27   | 145   | 4,2   |
| 2015  | 93     | 56     | 68       | 52     | 29   | 149   | 4,3   |
| 2016  | 88     | 43     | 58       | 40     | 33   | 131   | 3,8   |
| 2017  | 85     | 52     | 72       | 29     | 36   | 137   | 4,0   |
| 2018  | 79     | 48     | 62       | 38     | 27   | 127   | 3,7   |
| 2019  | 88     | 65     | 69       | 42     | 42   | 153   | 4,5   |
| 2020  | 103    | 56     | 75       | 57     | 27   | 159   | 4,6   |
| 2021  | 102    | 64     | 72       | 59     | 35   | 166   | 4,8   |
| 2022  | 71     | 54     | 56       | 34     | 35   | 125   | 3,6   |
| Total | 2 005  | 1 427  | 1 573    | 1 133  | 726  | 3 432 | 100,0 |
| %     | 58,4   | 41,6   | 45,8     | 33,0   | 21,2 | 100,0 |       |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Leucémie lymphoïde chronique (LLC) / Lymphome lymphocytaire  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 71,4 |
| Age médian  | 72,0 |
| Femmes      | 74,0 |
| Hommes      | 71,0 |
| Age maximal | 99   |
| Age minimal | 23   |

|                               | Hommes                   | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 2 005                    | 1 427                 | 1 573                 | 1 133                 | 726                   | 3 432                 |
| Taux bruts annuels*           | 10,80                    | 7,23                  | 8,86                  | 8,74                  | 9,57                  | 8,96                  |
| Taux standardisés**           |                          |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 5,01<br>(4,31 - 5,71)    | 3,27<br>(2,71 - 3,82) | 4,35<br>(3,66 - 5,03) | 3,90<br>(3,15 - 4,64) | 4,12<br>(3,14 - 5,09) | 4,12<br>(3,49 - 4,76) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 10,55<br>(10,32 - 10,77) | 6,87<br>(6,69 - 7,05) | 9,29<br>(9,06 - 9,52) | 7,99<br>(7,75 - 8,22) | 8,56<br>(8,25 - 8,88) | 8,64<br>(8,43 - 8,84) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 8,12<br>(7,89 - 8,35)    | 5,27<br>(5,09 - 5,46) | 7,03<br>(6,8 - 7,26)  | 6,20<br>(5,96 - 6,44) | 6,64<br>(6,31 - 6,96) | 6,63<br>(6,42 - 6,83) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)

\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |             |             |            |            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans       | 5 ans       | 10 ans     | 15 ans     |
| Femmes          | 10,13               | 0,92 (1309)                      | 0,87 (1211) | 0,72 (884)  | 0,51 (489) | 0,33 (209) |
| Hommes          | 8,19                | 0,92 (1838)                      | 0,85 (1667) | 0,68 (1164) | 0,43 (521) | 0,26 (210) |
| Significativité | p<0,001             | NS                               | NS          | p<0,01      | p<0,001    | NS         |

# Myélome multiple et plasmocytome

Codes ICDO : 97313, 97323, 97333, 97343

|              | Hommes       | Femmes       | Calvados     | Manche       | Orne        | Total        | %            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 1997         | 49           | 50           | 44           | 40           | 15          | 99           | 3,3          |
| 1998         | 60           | 46           | 39           | 39           | 28          | 106          | 3,5          |
| 1999         | 67           | 49           | 40           | 49           | 27          | 116          | 3,8          |
| 2000         | 50           | 52           | 46           | 36           | 20          | 102          | 3,4          |
| 2001         | 54           | 47           | 40           | 37           | 24          | 101          | 3,3          |
| 2002         | 52           | 48           | 43           | 39           | 18          | 100          | 3,3          |
| 2003         | 44           | 48           | 38           | 30           | 24          | 92           | 3,0          |
| 2004         | 63           | 54           | 51           | 51           | 15          | 117          | 3,8          |
| 2005         | 34           | 40           | 39           | 24           | 11          | 74           | 2,4          |
| 2006         | 51           | 48           | 46           | 28           | 25          | 99           | 3,3          |
| 2007         | 56           | 49           | 55           | 33           | 17          | 105          | 3,5          |
| 2008         | 65           | 57           | 45           | 49           | 28          | 122          | 4,0          |
| 2009         | 66           | 55           | 57           | 40           | 24          | 121          | 4,0          |
| 2010         | 61           | 72           | 63           | 51           | 19          | 133          | 4,4          |
| 2011         | 60           | 59           | 45           | 50           | 24          | 119          | 3,9          |
| 2012         | 62           | 53           | 49           | 44           | 22          | 115          | 3,8          |
| 2013         | 74           | 66           | 56           | 47           | 37          | 140          | 4,6          |
| 2014         | 59           | 48           | 50           | 34           | 23          | 107          | 3,5          |
| 2015         | 62           | 53           | 51           | 37           | 27          | 115          | 3,8          |
| 2016         | 51           | 58           | 45           | 35           | 29          | 109          | 3,6          |
| 2017         | 63           | 64           | 53           | 51           | 23          | 127          | 4,2          |
| 2018         | 76           | 60           | 67           | 42           | 27          | 136          | 4,5          |
| 2019         | 86           | 62           | 73           | 48           | 27          | 148          | 4,9          |
| 2020         | 64           | 58           | 55           | 42           | 25          | 122          | 4,0          |
| 2021         | 83           | 77           | 79           | 56           | 25          | 160          | 5,3          |
| 2022         | 85           | 71           | 70           | 46           | 40          | 156          | 5,1          |
| <b>Total</b> | <b>1 597</b> | <b>1 444</b> | <b>1 339</b> | <b>1 078</b> | <b>624</b>  | <b>3 041</b> | <b>100,0</b> |
| <b>%</b>     | <b>52,5</b>  | <b>47,5</b>  | <b>44,0</b>  | <b>35,4</b>  | <b>20,5</b> | <b>100,0</b> |              |

## Proportion de Myélome multiple et plasmocytome parmi l'ensemble des HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 71,4 |
| Age médian  | 73,0 |
| Femmes      | 73,0 |
| Hommes      | 72,0 |
| Age maximal | 99   |
| Age minimal | 30   |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nombre de patients</b>     | 1 597                 | 1 444                 | 1 339                 | 1 078                 | 624                   | 3 041                 |
| <b>Taux bruts annuels*</b>    | 8,60                  | 7,31                  | 7,54                  | 8,31                  | 8,23                  | 7,94                  |
| <b>Taux standardisés**</b>    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 3,99<br>(3,36 - 4,62) | 3,35<br>(2,79 - 3,92) | 3,76<br>(3,11 - 4,41) | 3,65<br>(2,93 - 4,37) | 3,49<br>(2,58 - 4,4)  | 3,66<br>(3,06 - 4,26) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 8,38<br>(8,18 - 8,58) | 7,00<br>(6,82 - 7,18) | 7,92<br>(7,71 - 8,14) | 7,58<br>(7,35 - 7,81) | 7,32<br>(7,03 - 7,61) | 7,66<br>(7,47 - 7,86) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 6,50<br>(6,29 - 6,71) | 5,35<br>(5,16 - 5,53) | 6,04<br>(5,83 - 6,25) | 5,85<br>(5,61 - 6,08) | 5,61<br>(5,32 - 5,91) | 5,88<br>(5,68 - 6,07) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)


\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

## Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |            |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans    |
| Femmes          | 3,96                | 0,77 (1112)                      | 0,66 (935) | 0,43 (513) | 0,21 (181) | 0,12 (61) |
| Hommes          | 3,50                | 0,75 (1191)                      | 0,63 (974) | 0,4 (522)  | 0,17 (158) | 0,09 (45) |
| Significativité | p<0,01              | NS                               | p<0,01     | p<0,001    | p<0,01     | p<0,05    |

## Répartition par tranches d'âges au diagnostic




Lymphome diffus à grandes cellules B

Codes ICDO : 96783, 96793, 96803, 96843, 96883, 97383

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 37     | 31     | 25       | 32     | 11   | 68    | 2,5   |
| 1998  | 42     | 36     | 32       | 32     | 14   | 78    | 2,9   |
| 1999  | 33     | 29     | 23       | 20     | 19   | 62    | 2,3   |
| 2000  | 42     | 36     | 38       | 22     | 18   | 78    | 2,9   |
| 2001  | 49     | 43     | 39       | 36     | 17   | 92    | 3,4   |
| 2002  | 48     | 43     | 38       | 30     | 23   | 91    | 3,4   |
| 2003  | 46     | 48     | 48       | 24     | 22   | 94    | 3,5   |
| 2004  | 57     | 36     | 52       | 25     | 16   | 93    | 3,4   |
| 2005  | 35     | 48     | 32       | 30     | 21   | 83    | 3,1   |
| 2006  | 46     | 47     | 36       | 39     | 18   | 93    | 3,4   |
| 2007  | 42     | 47     | 32       | 30     | 27   | 89    | 3,3   |
| 2008  | 49     | 65     | 55       | 39     | 20   | 114   | 4,2   |
| 2009  | 65     | 41     | 44       | 37     | 25   | 106   | 3,9   |
| 2010  | 54     | 52     | 43       | 48     | 15   | 106   | 3,9   |
| 2011  | 60     | 63     | 56       | 45     | 22   | 123   | 4,5   |
| 2012  | 55     | 44     | 48       | 30     | 21   | 99    | 3,7   |
| 2013  | 67     | 53     | 43       | 48     | 29   | 120   | 4,4   |
| 2014  | 61     | 52     | 42       | 44     | 27   | 113   | 4,2   |
| 2015  | 73     | 74     | 57       | 52     | 38   | 147   | 5,4   |
| 2016  | 63     | 49     | 43       | 46     | 23   | 112   | 4,1   |
| 2017  | 62     | 65     | 46       | 57     | 24   | 127   | 4,7   |
| 2018  | 67     | 36     | 53       | 31     | 19   | 103   | 3,8   |
| 2019  | 77     | 61     | 59       | 58     | 21   | 138   | 5,1   |
| 2020  | 82     | 56     | 51       | 55     | 32   | 138   | 5,1   |
| 2021  | 67     | 55     | 54       | 44     | 24   | 122   | 4,5   |
| 2022  | 74     | 45     | 48       | 47     | 24   | 119   | 4,4   |
| Total | 1 453  | 1 255  | 1 137    | 1 001  | 570  | 2 708 | 100,0 |
| %     | 53,7   | 46,3   | 42,0     | 37,0   | 21,0 | 100,0 |       |

Proportion de Lymphome diffus à grandes cellules B  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 68,4 |
| Age médian  | 72,0 |
| Femmes      | 74,0 |
| Hommes      | 70,0 |
| Age maximal | 103  |
| Age minimal | 7    |


|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 1 453                 | 1 255                 | 1 137                 | 1 001                 | 570                   | 2 708                 |
| Taux bruts annuels*           | 7,83                  | 6,35                  | 6,40                  | 7,72                  | 7,52                  | 7,07                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 4,18<br>(3,45 - 4,91) | 3,17<br>(2,57 - 3,78) | 3,60<br>(2,9 - 4,3)   | 3,72<br>(2,91 - 4,53) | 3,73<br>(2,63 - 4,83) | 3,67<br>(3 - 4,34)    |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 7,65<br>(7,45 - 7,84) | 6,07<br>(5,9 - 6,24)  | 6,65<br>(6,46 - 6,85) | 7,07<br>(6,85 - 7,29) | 6,79<br>(6,5 - 7,07)  | 6,83<br>(6,65 - 7,01) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 6,17<br>(5,96 - 6,37) | 4,74<br>(4,57 - 4,91) | 5,28<br>(5,07 - 5,48) | 5,59<br>(5,36 - 5,82) | 5,41<br>(5,11 - 5,71) | 5,42<br>(5,23 - 5,61) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |            |            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans     |
| Femmes          | 3,95                | 0,66 (832)                       | 0,58 (700) | 0,47 (514) | 0,35 (276) | 0,28 (145) |
| Hommes          | 4,37                | 0,68 (986)                       | 0,58 (822) | 0,48 (595) | 0,35 (302) | 0,27 (155) |
| Significativité | NS                  | NS                               | NS         | NS         | NS         | NS         |

# Lymphome folliculaire

Codes ICDO : 96743, 95973, 96903, 96913, 96953, 96983, 97953

|              | Hommes      | Femmes      | Calvados    | Manche      | Orne        | Total        | %            |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1997         | 20          | 18          | 19          | 10          | 9           | 38           | 2,9          |
| 1998         | 20          | 20          | 22          | 12          | 6           | 40           | 3,1          |
| 1999         | 19          | 19          | 17          | 13          | 8           | 38           | 2,9          |
| 2000         | 19          | 14          | 9           | 16          | 8           | 33           | 2,5          |
| 2001         | 18          | 27          | 15          | 19          | 11          | 45           | 3,4          |
| 2002         | 18          | 21          | 15          | 15          | 9           | 39           | 3,0          |
| 2003         | 19          | 21          | 22          | 9           | 9           | 40           | 3,1          |
| 2004         | 23          | 21          | 16          | 19          | 9           | 44           | 3,4          |
| 2005         | 18          | 27          | 22          | 11          | 12          | 45           | 3,4          |
| 2006         | 19          | 18          | 19          | 13          | 5           | 37           | 2,8          |
| 2007         | 28          | 27          | 28          | 18          | 9           | 55           | 4,2          |
| 2008         | 16          | 27          | 21          | 15          | 7           | 43           | 3,3          |
| 2009         | 24          | 28          | 21          | 24          | 7           | 52           | 4,0          |
| 2010         | 26          | 24          | 21          | 19          | 10          | 50           | 3,8          |
| 2011         | 31          | 25          | 25          | 22          | 9           | 56           | 4,3          |
| 2012         | 35          | 15          | 15          | 20          | 15          | 50           | 3,8          |
| 2013         | 29          | 25          | 27          | 18          | 9           | 54           | 4,1          |
| 2014         | 31          | 28          | 25          | 19          | 15          | 59           | 4,5          |
| 2015         | 36          | 30          | 35          | 21          | 10          | 66           | 5,0          |
| 2016         | 28          | 34          | 36          | 20          | 6           | 62           | 4,7          |
| 2017         | 37          | 35          | 31          | 23          | 18          | 72           | 5,5          |
| 2018         | 22          | 28          | 22          | 18          | 10          | 50           | 3,8          |
| 2019         | 42          | 34          | 29          | 28          | 19          | 76           | 5,8          |
| 2020         | 31          | 35          | 34          | 15          | 17          | 66           | 5,0          |
| 2021         | 29          | 20          | 30          | 10          | 9           | 49           | 3,7          |
| 2022         | 25          | 26          | 28          | 16          | 7           | 51           | 3,9          |
| <b>Total</b> | <b>663</b>  | <b>647</b>  | <b>604</b>  | <b>443</b>  | <b>263</b>  | <b>1 310</b> | <b>100,0</b> |
| <b>%</b>     | <b>50,6</b> | <b>49,4</b> | <b>46,1</b> | <b>33,8</b> | <b>20,1</b> | <b>100,0</b> |              |

Proportion de Lymphome folliculaire  
 parmi l'ensemble des  
 HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 64,6 |
| Age médian  | 66,0 |
| Femmes      | 68,0 |
| Hommes      | 64,0 |
| Age maximal | 99   |
| Age minimal | 14   |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nombre de patients</b>     | 663                   | 647                   | 604                   | 443                   | 263                   | 1 310                 |
| <b>Taux bruts annuels*</b>    | 3,57                  | 3,28                  | 3,40                  | 3,42                  | 3,47                  | 3,42                  |
| <b>Taux standardisés**</b>    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 2,04<br>(1,53 - 2,55) | 1,87<br>(1,4 - 2,34)  | 2,05<br>(1,53 - 2,58) | 1,86<br>(1,28 - 2,44) | 1,92<br>(1,15 - 2,69) | 1,95<br>(1,46 - 2,44) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 3,59<br>(3,46 - 3,73) | 3,26<br>(3,13 - 3,38) | 3,64<br>(3,5 - 3,79)  | 3,24<br>(3,08 - 3,39) | 3,28<br>(3,08 - 3,48) | 3,42<br>(3,29 - 3,55) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 2,95<br>(2,81 - 3,1)  | 2,69<br>(2,55 - 2,82) | 2,97<br>(2,82 - 3,13) | 2,65<br>(2,49 - 2,82) | 2,75<br>(2,53 - 2,97) | 2,81<br>(2,67 - 2,95) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)


\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |            |            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans     |
| Femmes          | 12,87               | 0,91 (588)                       | 0,86 (537) | 0,75 (418) | 0,6 (234)  | 0,46 (126) |
| Hommes          | 11,20               | 0,92 (609)                       | 0,85 (543) | 0,72 (418) | 0,54 (219) | 0,46 (113) |
| Significativité | p<0,01              | NS                               | NS         | NS         | p<0,001    | p<0,05     |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic




Lymphome de la zone marginale

Codes ICDO : 96893, 96993

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 13     | 14     | 22       | 3      | 2    | 27    | 2,6   |
| 1998  | 8      | 5      | 6        | 4      | 3    | 13    | 1,3   |
| 1999  | 6      | 2      | 5        | 1      | 2    | 8     | 0,8   |
| 2000  | 5      | 2      | 7        | 0      | 0    | 7     | 0,7   |
| 2001  | 4      | 7      | 4        | 3      | 4    | 11    | 1,1   |
| 2002  | 10     | 9      | 5        | 9      | 5    | 19    | 1,8   |
| 2003  | 13     | 11     | 8        | 11     | 5    | 24    | 2,3   |
| 2004  | 15     | 12     | 9        | 12     | 6    | 27    | 2,6   |
| 2005  | 13     | 11     | 12       | 10     | 2    | 24    | 2,3   |
| 2006  | 11     | 14     | 9        | 9      | 7    | 25    | 2,4   |
| 2007  | 23     | 13     | 15       | 14     | 7    | 36    | 3,5   |
| 2008  | 20     | 20     | 19       | 10     | 11   | 40    | 3,9   |
| 2009  | 19     | 19     | 19       | 16     | 3    | 38    | 3,7   |
| 2010  | 21     | 26     | 19       | 17     | 11   | 47    | 4,6   |
| 2011  | 26     | 19     | 25       | 13     | 7    | 45    | 4,4   |
| 2012  | 29     | 17     | 17       | 20     | 9    | 46    | 4,5   |
| 2013  | 25     | 33     | 26       | 17     | 15   | 58    | 5,6   |
| 2014  | 20     | 21     | 16       | 19     | 6    | 41    | 4,0   |
| 2015  | 39     | 25     | 39       | 13     | 12   | 64    | 6,2   |
| 2016  | 36     | 35     | 37       | 13     | 21   | 71    | 6,9   |
| 2017  | 28     | 20     | 29       | 10     | 9    | 48    | 4,7   |
| 2018  | 35     | 23     | 35       | 11     | 12   | 58    | 5,6   |
| 2019  | 27     | 27     | 28       | 14     | 12   | 54    | 5,2   |
| 2020  | 40     | 26     | 30       | 24     | 12   | 66    | 6,4   |
| 2021  | 35     | 35     | 33       | 22     | 15   | 70    | 6,8   |
| 2022  | 28     | 36     | 26       | 27     | 11   | 64    | 6,2   |
| Total | 549    | 482    | 500      | 322    | 209  | 1 031 | 100,0 |
| %     | 53,2   | 46,8   | 48,5     | 31,2   | 20,3 | 100,0 |       |

Proportion de Lymphome de la zone marginale  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 71,1 |
| Age médian  | 73,0 |
| Femmes      | 74,0 |
| Hommes      | 72,0 |
| Age maximal | 99   |
| Age minimal | 19   |


|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 549                   | 482                   | 500                   | 322                   | 209                   | 1 031                 |
| Taux bruts annuels*           | 2,96                  | 2,44                  | 2,82                  | 2,48                  | 2,76                  | 2,69                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 1,41<br>(1,02 - 1,8)  | 1,16<br>(0,82 - 1,51) | 1,43<br>(1,02 - 1,84) | 1,10<br>(0,69 - 1,51) | 1,28<br>(0,68 - 1,89) | 1,28<br>(0,91 - 1,65) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 2,88<br>(2,76 - 3)    | 2,34<br>(2,23 - 2,44) | 2,94<br>(2,81 - 3,08) | 2,26<br>(2,13 - 2,38) | 2,50<br>(2,33 - 2,67) | 2,60<br>(2,49 - 2,71) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 2,26<br>(2,13 - 2,38) | 1,83<br>(1,72 - 1,93) | 2,29<br>(2,16 - 2,42) | 1,74<br>(1,61 - 1,86) | 1,95<br>(1,78 - 2,13) | 2,02<br>(1,91 - 2,13) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |            |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans    |
| Femmes          | 10,60               | 0,9 (431)                        | 0,85 (382) | 0,71 (267) | 0,52 (130) | 0,34 (45) |
| Hommes          | 7,31                | 0,88 (477)                       | 0,8 (422)  | 0,6 (261)  | 0,4 (118)  | 0,31 (49) |
| Significativité | p<0,001             | NS                               | p<0,05     | p<0,001    | p<0,001    | p<0,05    |

# Lymphome lymphoplasmocytaire / Maladie de Waldenström

Codes ICDO : 96713, 97613

|              | Hommes      | Femmes      | Calvados    | Manche      | Orne        | Total        | %            |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1997         | 13          | 9           | 11          | 8           | 3           | 22           | 2,8          |
| 1998         | 19          | 14          | 14          | 13          | 6           | 33           | 4,3          |
| 1999         | 16          | 18          | 8           | 16          | 10          | 34           | 4,4          |
| 2000         | 18          | 10          | 9           | 14          | 5           | 28           | 3,6          |
| 2001         | 13          | 6           | 4           | 10          | 5           | 19           | 2,5          |
| 2002         | 20          | 11          | 11          | 12          | 8           | 31           | 4,0          |
| 2003         | 19          | 9           | 10          | 13          | 5           | 28           | 3,6          |
| 2004         | 18          | 10          | 12          | 13          | 3           | 28           | 3,6          |
| 2005         | 21          | 5           | 9           | 11          | 6           | 26           | 3,4          |
| 2006         | 20          | 13          | 15          | 12          | 6           | 33           | 4,3          |
| 2007         | 16          | 10          | 7           | 14          | 5           | 26           | 3,4          |
| 2008         | 10          | 12          | 9           | 9           | 4           | 22           | 2,8          |
| 2009         | 21          | 8           | 11          | 13          | 5           | 29           | 3,7          |
| 2010         | 18          | 7           | 6           | 14          | 5           | 25           | 3,2          |
| 2011         | 17          | 10          | 6           | 16          | 5           | 27           | 3,5          |
| 2012         | 22          | 9           | 10          | 17          | 4           | 31           | 4,0          |
| 2013         | 17          | 19          | 10          | 17          | 9           | 36           | 4,7          |
| 2014         | 15          | 12          | 8           | 15          | 4           | 27           | 3,5          |
| 2015         | 18          | 4           | 12          | 6           | 4           | 22           | 2,8          |
| 2016         | 15          | 8           | 8           | 11          | 4           | 23           | 3,0          |
| 2017         | 21          | 10          | 13          | 14          | 4           | 31           | 4,0          |
| 2018         | 28          | 10          | 14          | 15          | 9           | 38           | 4,9          |
| 2019         | 28          | 7           | 16          | 16          | 3           | 35           | 4,5          |
| 2020         | 26          | 18          | 19          | 20          | 5           | 44           | 5,7          |
| 2021         | 21          | 10          | 9           | 17          | 5           | 31           | 4,0          |
| 2022         | 28          | 17          | 15          | 19          | 11          | 45           | 5,8          |
| <b>Total</b> | <b>498</b>  | <b>276</b>  | <b>276</b>  | <b>355</b>  | <b>143</b>  | <b>774</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>%</b>     | <b>64,3</b> | <b>35,7</b> | <b>35,7</b> | <b>45,9</b> | <b>18,5</b> | <b>100,0</b> |              |

Proportion de Lymphome lymphoplasmocytaire / Maladie de Waldenström  
 parmi l'ensemble des  
 HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 73,5 |
| Age médian  | 74,0 |
| Femmes      | 75,0 |
| Hommes      | 74,0 |
| Age maximal | 98   |
| Age minimal | 34   |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nombre de patients</b>     | 498                   | 276                   | 276                   | 355                   | 143                   | 774                   |
| <b>Taux bruts annuels*</b>    | 2,68                  | 1,40                  | 1,55                  | 2,74                  | 1,89                  | 2,02                  |
| <b>Taux standardisés**</b>    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 1,15<br>(0,83 - 1,48) | 0,59<br>(0,37 - 0,82) | 0,72<br>(0,45 - 1)    | 1,13<br>(0,74 - 1,51) | 0,72<br>(0,33 - 1,1)  | 0,87<br>(0,59 - 1,15) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 2,58<br>(2,46 - 2,69) | 1,32<br>(1,24 - 1,39) | 1,63<br>(1,53 - 1,72) | 2,45<br>(2,32 - 2,58) | 1,64<br>(1,5 - 1,78)  | 1,93<br>(1,83 - 2,02) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 1,94<br>(1,83 - 2,05) | 0,97<br>(0,9 - 1,05)  | 1,21<br>(1,12 - 1,3)  | 1,83<br>(1,7 - 1,96)  | 1,19<br>(1,06 - 1,32) | 1,43<br>(1,33 - 1,52) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)


\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |            |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans    |
| Femmes          | 8,26                | 0,86 (238)                       | 0,77 (207) | 0,61 (140) | 0,42 (83)  | 0,26 (34) |
| Hommes          | 5,69                | 0,84 (415)                       | 0,73 (353) | 0,53 (224) | 0,34 (106) | 0,18 (40) |
| Significativité | p<0,001             | NS                               | NS         | p<0,001    | NS         | NS        |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



# Lymphome du manteau

Code ICDO : 96733

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 5      | 1      | 2        | 2      | 2    | 6     | 1,3   |
| 1998  | 11     | 5      | 7        | 5      | 4    | 16    | 3,4   |
| 1999  | 10     | 0      | 6        | 3      | 1    | 10    | 2,1   |
| 2000  | 6      | 4      | 8        | 2      | 0    | 10    | 2,1   |
| 2001  | 6      | 9      | 11       | 3      | 1    | 15    | 3,2   |
| 2002  | 11     | 5      | 10       | 4      | 2    | 16    | 3,4   |
| 2003  | 10     | 5      | 4        | 8      | 3    | 15    | 3,2   |
| 2004  | 8      | 3      | 5        | 4      | 2    | 11    | 2,3   |
| 2005  | 12     | 5      | 8        | 5      | 4    | 17    | 3,6   |
| 2006  | 18     | 5      | 11       | 6      | 6    | 23    | 4,9   |
| 2007  | 10     | 7      | 13       | 3      | 1    | 17    | 3,6   |
| 2008  | 12     | 4      | 8        | 5      | 3    | 16    | 3,4   |
| 2009  | 8      | 8      | 6        | 8      | 2    | 16    | 3,4   |
| 2010  | 17     | 5      | 11       | 8      | 3    | 22    | 4,7   |
| 2011  | 8      | 8      | 6        | 9      | 1    | 16    | 3,4   |
| 2012  | 13     | 9      | 9        | 6      | 7    | 22    | 4,7   |
| 2013  | 13     | 3      | 8        | 7      | 1    | 16    | 3,4   |
| 2014  | 17     | 7      | 7        | 14     | 3    | 24    | 5,1   |
| 2015  | 21     | 6      | 12       | 9      | 6    | 27    | 5,7   |
| 2016  | 18     | 4      | 13       | 7      | 2    | 22    | 4,7   |
| 2017  | 21     | 8      | 13       | 6      | 10   | 29    | 6,1   |
| 2018  | 8      | 7      | 5        | 9      | 1    | 15    | 3,2   |
| 2019  | 9      | 8      | 4        | 8      | 5    | 17    | 3,6   |
| 2020  | 14     | 6      | 10       | 8      | 2    | 20    | 4,2   |
| 2021  | 18     | 10     | 10       | 12     | 6    | 28    | 5,9   |
| 2022  | 17     | 10     | 16       | 6      | 5    | 27    | 5,7   |
| Total | 321    | 152    | 223      | 167    | 83   | 473   | 100,0 |
| %     | 67,9   | 32,1   | 47,1     | 35,3   | 17,5 | 100,0 |       |

Proportion de Lymphome du manteau  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025



1,8%


|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 73,0 |
| Age médian  | 74,0 |
| Femmes      | 76,0 |
| Hommes      | 74,0 |
| Age maximal | 95   |
| Age minimal | 42   |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 321                   | 152                   | 223                   | 167                   | 83                    | 473                   |
| Taux bruts annuels*           | 1,73                  | 0,77                  | 1,26                  | 1,29                  | 1,09                  | 1,23                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,75<br>(0,49 - 1,02) | 0,33<br>(0,16 - 0,5)  | 0,60<br>(0,34 - 0,85) | 0,53<br>(0,27 - 0,79) | 0,44<br>(0,13 - 0,76) | 0,54<br>(0,32 - 0,76) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 1,66<br>(1,57 - 1,75) | 0,73<br>(0,67 - 0,78) | 1,31<br>(1,22 - 1,39) | 1,16<br>(1,07 - 1,25) | 0,97<br>(0,87 - 1,08) | 1,18<br>(1,1 - 1,25)  |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 1,26<br>(1,17 - 1,35) | 0,55<br>(0,49 - 0,61) | 0,97<br>(0,89 - 1,06) | 0,88<br>(0,79 - 0,97) | 0,73<br>(0,63 - 0,84) | 0,89<br>(0,81 - 0,96) |


\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)

\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |           |           |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans     | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | 3,33                | 0,82 (124)                       | 0,69 (100) | 0,37 (45) | 0,25 (22) | 0,16 (9)  |
| Hommes          | 3,42                | 0,74 (238)                       | 0,63 (194) | 0,4 (106) | 0,19 (35) | 0,12 (13) |
| Significativité | NS                  | p<0,05                           | p<0,05     | p<0,05    | p<0,01    | p<0,01    |

Leucémie à tricholeucocytes

Code ICDO : 99403


|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 3      | 2      | 3        | 1      | 1    | 5     | 3,1   |
| 1998  | 7      | 2      | 3        | 6      | 0    | 9     | 5,6   |
| 1999  | 11     | 3      | 6        | 6      | 2    | 14    | 8,6   |
| 2000  | 4      | 0      | 1        | 3      | 0    | 4     | 2,5   |
| 2001  | 4      | 2      | 2        | 2      | 2    | 6     | 3,7   |
| 2002  | 9      | 2      | 6        | 5      | 0    | 11    | 6,8   |
| 2003  | 4      | 2      | 1        | 4      | 1    | 6     | 3,7   |
| 2004  | 6      | 0      | 2        | 2      | 2    | 6     | 3,7   |
| 2005  | 6      | 0      | 4        | 2      | 0    | 6     | 3,7   |
| 2006  | 3      | 0      | 1        | 1      | 1    | 3     | 1,9   |
| 2007  | 4      | 0      | 1        | 2      | 1    | 4     | 2,5   |
| 2008  | 3      | 1      | 0        | 1      | 3    | 4     | 2,5   |
| 2009  | 7      | 1      | 5        | 3      | 0    | 8     | 4,9   |
| 2010  | 6      | 1      | 3        | 2      | 2    | 7     | 4,3   |
| 2011  | 3      | 0      | 1        | 1      | 1    | 3     | 1,9   |
| 2012  | 5      | 1      | 3        | 3      | 0    | 6     | 3,7   |
| 2013  | 8      | 4      | 5        | 4      | 3    | 12    | 7,4   |
| 2014  | 3      | 0      | 2        | 0      | 1    | 3     | 1,9   |
| 2015  | 4      | 0      | 1        | 1      | 2    | 4     | 2,5   |
| 2016  | 3      | 1      | 1        | 2      | 1    | 4     | 2,5   |
| 2017  | 5      | 2      | 2        | 4      | 1    | 7     | 4,3   |
| 2018  | 0      | 3      | 1        | 1      | 1    | 3     | 1,9   |
| 2019  | 8      | 2      | 4        | 6      | 0    | 10    | 6,2   |
| 2020  | 6      | 1      | 3        | 3      | 1    | 7     | 4,3   |
| 2021  | 4      | 1      | 2        | 2      | 1    | 5     | 3,1   |
| 2022  | 4      | 1      | 2        | 2      | 1    | 5     | 3,1   |
| Total | 130    | 32     | 65       | 69     | 28   | 162   | 100,0 |
| %     | 80,2   | 19,8   | 40,1     | 42,6   | 17,3 | 100,0 |       |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Leucémie à tricholeucocytes  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 63,9 |
| Age médian  | 64,0 |
| Femmes      | 64,5 |
| Hommes      | 64,0 |
| Age maximal | 97   |
| Age minimal | 33   |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 130                   | 32                    | 65                    | 69                    | 28                    | 162                   |
| Taux bruts annuels*           | 0,70                  | 0,16                  | 0,37                  | 0,53                  | 0,37                  | 0,42                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,39<br>(0,17 - 0,6)  | 0,10<br>(0 - 0,22)    | 0,23<br>(0,05 - 0,41) | 0,28<br>(0,06 - 0,51) | 0,20<br>(0 - 0,44)    | 0,24<br>(0,07 - 0,42) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 0,70<br>(0,64 - 0,76) | 0,16<br>(0,13 - 0,19) | 0,39<br>(0,35 - 0,44) | 0,49<br>(0,43 - 0,55) | 0,35<br>(0,28 - 0,41) | 0,42<br>(0,37 - 0,47) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 0,57<br>(0,51 - 0,63) | 0,14<br>(0,11 - 0,17) | 0,33<br>(0,27 - 0,38) | 0,41<br>(0,34 - 0,47) | 0,30<br>(0,22 - 0,37) | 0,35<br>(0,3 - 0,4)   |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010) \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |           |           |           |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans     | 5 ans     | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | > 15 ans            | 0,94 (30)                        | 0,94 (29) | 0,94 (26) | 0,82 (19) | 0,66 (9)  |
| Hommes          | > 15 ans            | 0,95 (123)                       | 0,9 (114) | 0,8 (92)  | 0,66 (63) | 0,53 (35) |
| Significativité |                     | NS                               | NS        | NS        | p<0,05    | NS        |

Total hémopathies lymphoïdes B (/3)


|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne  | Total  | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 1997  | 227    | 186    | 199      | 146    | 68    | 413    | 2,9   |
| 1998  | 246    | 193    | 186      | 158    | 95    | 439    | 3,0   |
| 1999  | 269    | 187    | 198      | 162    | 96    | 456    | 3,2   |
| 2000  | 254    | 198    | 207      | 160    | 85    | 452    | 3,1   |
| 2001  | 237    | 202    | 184      | 163    | 92    | 439    | 3,0   |
| 2002  | 268    | 193    | 196      | 164    | 101   | 461    | 3,2   |
| 2003  | 246    | 222    | 206      | 168    | 94    | 468    | 3,2   |
| 2004  | 286    | 205    | 215      | 197    | 79    | 491    | 3,4   |
| 2005  | 252    | 217    | 203      | 161    | 105   | 469    | 3,3   |
| 2006  | 276    | 225    | 226      | 168    | 107   | 501    | 3,5   |
| 2007  | 274    | 247    | 234      | 182    | 105   | 521    | 3,6   |
| 2008  | 281    | 287    | 256      | 191    | 121   | 568    | 3,9   |
| 2009  | 318    | 254    | 268      | 206    | 98    | 572    | 4,0   |
| 2010  | 311    | 283    | 252      | 230    | 112   | 594    | 4,1   |
| 2011  | 328    | 265    | 260      | 231    | 102   | 593    | 4,1   |
| 2012  | 342    | 243    | 264      | 205    | 116   | 585    | 4,1   |
| 2013  | 329    | 282    | 251      | 217    | 143   | 611    | 4,2   |
| 2014  | 326    | 267    | 245      | 229    | 119   | 593    | 4,1   |
| 2015  | 377    | 272    | 296      | 212    | 141   | 649    | 4,5   |
| 2016  | 343    | 266    | 285      | 193    | 131   | 609    | 4,2   |
| 2017  | 352    | 278    | 277      | 213    | 140   | 630    | 4,4   |
| 2018  | 351    | 240    | 288      | 186    | 117   | 591    | 4,1   |
| 2019  | 387    | 299    | 312      | 234    | 140   | 686    | 4,8   |
| 2020  | 402    | 288    | 314      | 239    | 137   | 690    | 4,8   |
| 2021  | 399    | 291    | 316      | 239    | 135   | 690    | 4,8   |
| 2022  | 372    | 284    | 292      | 219    | 145   | 656    | 4,5   |
| Total | 8 053  | 6 374  | 6 430    | 5 073  | 2 924 | 14 427 | 100,0 |
| %     | 55,8   | 44,2   | 44,6     | 35,2   | 20,3  | 100,0  |       |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Total hémopathies lymphoïdes B (/3) parmi l'ensemble des HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 66,9 |
| Age médian  | 71,0 |
| Femmes      | 72,0 |
| Hommes      | 70,0 |
| Age maximal | 103  |
| Age minimal | 0    |

|                            | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients         | 8 053                 | 6 374                 | 6 430                 | 5 073                 | 2 924                 | 14 427                |
| Taux bruts annuels*        | 43,39                 | 32,27                 | 36,20                 | 39,12                 | 38,56                 | 37,66                 |
| Taux standardisés**        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale (IC 0,95)     | 23,41 (21,66 - 25,17) | 17,56 (16,04 - 19,07) | 20,90 (19,17 - 22,63) | 20,43 (18,42 - 22,45) | 19,64 (17,09 - 22,19) | 20,43 (18,79 - 22,06) |
| pop Europe Ouest (IC 0,95) | 42,50 (42,04 - 42,96) | 31,09 (30,7 - 31,47)  | 37,77 (37,31 - 38,24) | 36,20 (35,69 - 36,7)  | 35,12 (34,47 - 35,77) | 36,59 (36,17 - 37,01) |
| pop USA (IC 0,95)          | 34,25 (33,76 - 34,74) | 25,00 (24,59 - 25,41) | 30,16 (29,68 - 30,64) | 29,20 (28,66 - 29,74) | 28,28 (27,59 - 28,96) | 29,37 (28,92 - 29,82) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane (années) | Probabilité de survie (Effectif) |             |             |             |            |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                 |                  | 1 an                             | 2 ans       | 5 ans       | 10 ans      | 15 ans     |
| Femmes          | 7,82             | 0,83 (5239)                      | 0,75 (4630) | 0,6 (3259)  | 0,44 (1751) | 0,32 (830) |
| Hommes          | 6,68             | 0,82 (6580)                      | 0,73 (5724) | 0,57 (3906) | 0,39 (1888) | 0,28 (894) |
| Significativité | p<0,001          | NS                               | p<0,05      | p<0,001     | p<0,001     | p<0,001    |

# Lymphome non-hodgkinien NOS

Codes ICDO : 95903, 95913, 95963, 96753, 96943, 97123, 97373, 98203, 99713

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 3      | 6      | 6        | 2      | 1    | 9     | 1,7   |
| 1998  | 10     | 7      | 4        | 11     | 2    | 17    | 3,2   |
| 1999  | 13     | 13     | 14       | 10     | 2    | 26    | 5,0   |
| 2000  | 13     | 10     | 7        | 11     | 5    | 23    | 4,4   |
| 2001  | 14     | 16     | 14       | 15     | 1    | 30    | 5,7   |
| 2002  | 6      | 9      | 9        | 6      | 0    | 15    | 2,9   |
| 2003  | 11     | 11     | 7        | 11     | 4    | 22    | 4,2   |
| 2004  | 15     | 13     | 15       | 9      | 4    | 28    | 5,3   |
| 2005  | 8      | 12     | 12       | 5      | 3    | 20    | 3,8   |
| 2006  | 9      | 6      | 12       | 0      | 3    | 15    | 2,9   |
| 2007  | 7      | 6      | 5        | 4      | 4    | 13    | 2,5   |
| 2008  | 9      | 13     | 10       | 6      | 6    | 22    | 4,2   |
| 2009  | 11     | 9      | 9        | 7      | 4    | 20    | 3,8   |
| 2010  | 4      | 12     | 5        | 10     | 1    | 16    | 3,1   |
| 2011  | 9      | 13     | 9        | 9      | 4    | 22    | 4,2   |
| 2012  | 11     | 7      | 12       | 6      | 0    | 18    | 3,4   |
| 2013  | 7      | 5      | 2        | 5      | 5    | 12    | 2,3   |
| 2014  | 6      | 2      | 3        | 5      | 0    | 8     | 1,5   |
| 2015  | 14     | 5      | 12       | 3      | 4    | 19    | 3,6   |
| 2016  | 15     | 24     | 18       | 11     | 10   | 39    | 7,4   |
| 2017  | 8      | 9      | 10       | 4      | 3    | 17    | 3,2   |
| 2018  | 9      | 9      | 10       | 7      | 1    | 18    | 3,4   |
| 2019  | 13     | 7      | 10       | 6      | 4    | 20    | 3,8   |
| 2020  | 13     | 15     | 11       | 14     | 3    | 28    | 5,3   |
| 2021  | 16     | 11     | 8        | 16     | 3    | 27    | 5,2   |
| 2022  | 13     | 7      | 4        | 12     | 4    | 20    | 3,8   |
| Total | 267    | 257    | 238      | 205    | 81   | 524   | 100,0 |
| %     | 51,0   | 49,0   | 45,4     | 39,1   | 15,5 | 100,0 |       |

Proportion de Lymphome non-hodgkinien NOS  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025



2,0%


|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 73,8 |
| Age médian  | 76,5 |
| Femmes      | 77,0 |
| Hommes      | 75,0 |
| Age maximal | 108  |
| Age minimal | 3    |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 267                   | 257                   | 238                   | 205                   | 81                    | 524                   |
| Taux bruts annuels*           | 1,44                  | 1,30                  | 1,34                  | 1,58                  | 1,07                  | 1,37                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,64<br>(0,38 - 0,9)  | 0,55<br>(0,33 - 0,77) | 0,63<br>(0,37 - 0,89) | 0,63<br>(0,33 - 0,93) | 0,45<br>(0,11 - 0,78) | 0,59<br>(0,35 - 0,83) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 1,38<br>(1,29 - 1,46) | 1,21<br>(1,14 - 1,29) | 1,37<br>(1,28 - 1,46) | 1,39<br>(1,3 - 1,49)  | 0,95<br>(0,84 - 1,05) | 1,29<br>(1,21 - 1,37) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 1,07<br>(0,99 - 1,16) | 0,91<br>(0,83 - 0,98) | 1,06<br>(0,97 - 1,15) | 1,03<br>(0,94 - 1,13) | 0,71<br>(0,61 - 0,82) | 0,98<br>(0,9 - 1,06)  |


\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)

\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |           |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | 4,56                | 0,66 (168)                       | 0,61 (151) | 0,48 (103) | 0,31 (48) | 0,2 (22)  |
| Hommes          | 3,63                | 0,65 (172)                       | 0,59 (150) | 0,44 (99)  | 0,25 (40) | 0,16 (18) |
| Significativité | NS                  | NS                               | NS         | NS         | NS        | NS        |

# Lymphome T/NK à cellules matures

Codes ICDO : 97003, 97013, 97023, 97053, 97083, 97093, 97143, 97153, 97163, 97173, 97183, 97193, 97243, 97253, 97263, 98273, 99483

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 14     | 13     | 15       | 9      | 3    | 27    | 3,0   |
| 1998  | 19     | 10     | 19       | 6      | 4    | 29    | 3,2   |
| 1999  | 19     | 6      | 15       | 4      | 6    | 25    | 2,8   |
| 2000  | 18     | 13     | 13       | 15     | 3    | 31    | 3,4   |
| 2001  | 9      | 14     | 11       | 9      | 3    | 23    | 2,5   |
| 2002  | 12     | 14     | 13       | 9      | 4    | 26    | 2,9   |
| 2003  | 28     | 14     | 16       | 20     | 6    | 42    | 4,7   |
| 2004  | 21     | 12     | 19       | 8      | 6    | 33    | 3,7   |
| 2005  | 17     | 8      | 14       | 4      | 7    | 25    | 2,8   |
| 2006  | 25     | 13     | 17       | 13     | 8    | 38    | 4,2   |
| 2007  | 27     | 13     | 15       | 18     | 7    | 40    | 4,4   |
| 2008  | 22     | 19     | 17       | 15     | 9    | 41    | 4,5   |
| 2009  | 19     | 14     | 13       | 18     | 2    | 33    | 3,7   |
| 2010  | 24     | 17     | 17       | 14     | 10   | 41    | 4,5   |
| 2011  | 19     | 17     | 18       | 10     | 8    | 36    | 4,0   |
| 2012  | 13     | 14     | 11       | 13     | 3    | 27    | 3,0   |
| 2013  | 19     | 18     | 19       | 10     | 8    | 37    | 4,1   |
| 2014  | 28     | 11     | 20       | 12     | 7    | 39    | 4,3   |
| 2015  | 21     | 14     | 19       | 11     | 5    | 35    | 3,9   |
| 2016  | 27     | 14     | 25       | 9      | 7    | 41    | 4,5   |
| 2017  | 20     | 18     | 22       | 11     | 5    | 38    | 4,2   |
| 2018  | 22     | 15     | 20       | 9      | 8    | 37    | 4,1   |
| 2019  | 25     | 23     | 22       | 16     | 10   | 48    | 5,3   |
| 2020  | 25     | 20     | 22       | 13     | 10   | 45    | 5,0   |
| 2021  | 21     | 14     | 23       | 6      | 6    | 35    | 3,9   |
| 2022  | 19     | 11     | 15       | 9      | 6    | 30    | 3,3   |
| Total | 533    | 369    | 450      | 291    | 161  | 902   | 100,0 |
| %     | 59,1   | 40,9   | 49,9     | 32,3   | 17,8 | 100,0 |       |

Proportion de Lymphome T/NK à cellules matures  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 63,3 |
| Age médian  | 67,0 |
| Femmes      | 67,0 |
| Hommes      | 67,0 |
| Age maximal | 96   |
| Age minimal | 2    |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 533                   | 369                   | 450                   | 291                   | 161                   | 902                   |
| Taux bruts annuels*           | 2,87                  | 1,87                  | 2,53                  | 2,24                  | 2,12                  | 2,35                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 1,68<br>(1,19 - 2,16) | 1,18<br>(0,76 - 1,61) | 1,59<br>(1,1 - 2,09)  | 1,35<br>(0,79 - 1,9)  | 1,21<br>(0,54 - 1,88) | 1,43<br>(0,97 - 1,88) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 2,86<br>(2,74 - 2,98) | 1,82<br>(1,73 - 1,91) | 2,66<br>(2,53 - 2,78) | 2,11<br>(1,99 - 2,24) | 1,98<br>(1,83 - 2,14) | 2,32<br>(2,21 - 2,43) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 2,34<br>(2,21 - 2,47) | 1,55<br>(1,44 - 1,65) | 2,19<br>(2,06 - 2,32) | 1,77<br>(1,64 - 1,91) | 1,64<br>(1,47 - 1,81) | 1,93<br>(1,81 - 2,04) |


\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)

\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |            |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans    |
| Femmes          | 11,77               | 0,75 (275)                       | 0,7 (255)  | 0,62 (202) | 0,53 (125) | 0,47 (80) |
| Hommes          | 5,56                | 0,74 (391)                       | 0,65 (334) | 0,52 (243) | 0,4 (133)  | 0,31 (77) |
| Significativité | NS                  | NS                               | NS         | p<0,001    | p<0,001    | p<0,001   |

Leucémie à grands lymphocytes à grains (LGL)

Codes ICDO : 98311, 98313


|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 1      | 0      | 1        | 0      | 0    | 1     | 0,3   |
| 1998  | 1      | 0      | 0        | 1      | 0    | 1     | 0,3   |
| 1999  | 2      | 2      | 3        | 0      | 1    | 4     | 1,1   |
| 2000  | 4      | 3      | 1        | 4      | 2    | 7     | 2,0   |
| 2001  | 2      | 1      | 1        | 2      | 0    | 3     | 0,9   |
| 2002  | 2      | 2      | 2        | 2      | 0    | 4     | 1,1   |
| 2003  | 2      | 2      | 2        | 1      | 1    | 4     | 1,1   |
| 2004  | 3      | 3      | 4        | 1      | 1    | 6     | 1,7   |
| 2005  | 1      | 3      | 3        | 1      | 0    | 4     | 1,1   |
| 2006  | 4      | 8      | 8        | 2      | 2    | 12    | 3,4   |
| 2007  | 3      | 3      | 3        | 1      | 2    | 6     | 1,7   |
| 2008  | 8      | 9      | 11       | 4      | 2    | 17    | 4,8   |
| 2009  | 8      | 14     | 9        | 11     | 2    | 22    | 6,3   |
| 2010  | 6      | 5      | 7        | 3      | 1    | 11    | 3,1   |
| 2011  | 12     | 12     | 16       | 4      | 4    | 24    | 6,8   |
| 2012  | 8      | 8      | 9        | 5      | 2    | 16    | 4,6   |
| 2013  | 2      | 6      | 6        | 0      | 2    | 8     | 2,3   |
| 2014  | 9      | 8      | 10       | 3      | 4    | 17    | 4,8   |
| 2015  | 5      | 8      | 5        | 4      | 4    | 13    | 3,7   |
| 2016  | 12     | 6      | 13       | 3      | 2    | 18    | 5,1   |
| 2017  | 12     | 7      | 11       | 6      | 2    | 19    | 5,4   |
| 2018  | 5      | 8      | 9        | 2      | 2    | 13    | 3,7   |
| 2019  | 14     | 7      | 16       | 5      | 0    | 21    | 6,0   |
| 2020  | 15     | 17     | 14       | 11     | 7    | 32    | 9,1   |
| 2021  | 18     | 17     | 20       | 10     | 5    | 35    | 10,0  |
| 2022  | 16     | 17     | 23       | 5      | 5    | 33    | 9,4   |
| Total | 175    | 176    | 207      | 91     | 53   | 351   | 100,0 |
| %     | 49,9   | 50,1   | 59,0     | 25,9   | 15,1 | 100,0 |       |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Leucémie à grands lymphocytes à grains (LGL) parmi l'ensemble des HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 66,5 |
| Age médian  | 68,0 |
| Femmes      | 69,0 |
| Hommes      | 67,0 |
| Age maximal | 93   |
| Age minimal | 23   |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 175                   | 176                   | 207                   | 91                    | 53                    | 351                   |
| Taux bruts annuels*           | 0,94                  | 0,89                  | 1,17                  | 0,70                  | 0,70                  | 0,92                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,51<br>(0,26 - 0,75) | 0,48<br>(0,24 - 0,71) | 0,66<br>(0,37 - 0,96) | 0,35<br>(0,11 - 0,58) | 0,37<br>(0,03 - 0,7)  | 0,49<br>(0,25 - 0,73) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 0,94<br>(0,87 - 1,01) | 0,87<br>(0,8 - 0,93)  | 1,22<br>(1,14 - 1,31) | 0,66<br>(0,59 - 0,73) | 0,65<br>(0,56 - 0,74) | 0,90<br>(0,84 - 0,97) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 0,75<br>(0,68 - 0,82) | 0,71<br>(0,64 - 0,77) | 0,98<br>(0,9 - 1,07)  | 0,52<br>(0,45 - 0,59) | 0,53<br>(0,44 - 0,63) | 0,73<br>(0,66 - 0,8)  |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |           |           |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans     | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | 14,99               | 0,94 (163)                       | 0,91 (145) | 0,79 (97) | 0,65 (57) | 0,49 (24) |
| Hommes          | 13,48               | 0,94 (164)                       | 0,88 (141) | 0,71 (85) | 0,62 (48) | 0,5 (18)  |
| Significativité | NS                  | NS                               | NS         | p<0,05    | p<0,01    | NS        |

# Leucémie aiguë lymphoblastique T

Codes ICDO : 97293, 98373

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 3      | 1      | 1        | 2      | 1    | 4     | 3,9   |
| 1998  | 1      | 0      | 0        | 0      | 1    | 1     | 1,0   |
| 1999  | 0      | 2      | 0        | 2      | 0    | 2     | 1,9   |
| 2000  | 1      | 0      | 0        | 1      | 0    | 1     | 1,0   |
| 2001  | 4      | 3      | 2        | 2      | 3    | 7     | 6,8   |
| 2002  | 6      | 2      | 5        | 2      | 1    | 8     | 7,8   |
| 2003  | 2      | 3      | 2        | 3      | 0    | 5     | 4,9   |
| 2004  | 1      | 0      | 1        | 0      | 0    | 1     | 1,0   |
| 2005  | 4      | 2      | 4        | 0      | 2    | 6     | 5,8   |
| 2006  | 4      | 2      | 2        | 3      | 1    | 6     | 5,8   |
| 2007  | 4      | 0      | 2        | 2      | 0    | 4     | 3,9   |
| 2008  | 7      | 1      | 4        | 4      | 0    | 8     | 7,8   |
| 2009  | 4      | 0      | 1        | 2      | 1    | 4     | 3,9   |
| 2010  | 1      | 1      | 2        | 0      | 0    | 2     | 1,9   |
| 2011  | 4      | 0      | 2        | 1      | 1    | 4     | 3,9   |
| 2012  | 2      | 2      | 2        | 1      | 1    | 4     | 3,9   |
| 2013  | 2      | 1      | 2        | 0      | 1    | 3     | 2,9   |
| 2014  | 6      | 0      | 2        | 3      | 1    | 6     | 5,8   |
| 2015  | 1      | 2      | 1        | 2      | 0    | 3     | 2,9   |
| 2016  | 2      | 1      | 2        | 0      | 1    | 3     | 2,9   |
| 2017  | 7      | 1      | 3        | 3      | 2    | 8     | 7,8   |
| 2018  | 1      | 0      | 1        | 0      | 0    | 1     | 1,0   |
| 2019  | 1      | 0      | 1        | 0      | 0    | 1     | 1,0   |
| 2020  | 1      | 1      | 1        | 1      | 0    | 2     | 1,9   |
| 2021  | 4      | 1      | 3        | 2      | 0    | 5     | 4,9   |
| 2022  | 4      | 0      | 3        | 0      | 1    | 4     | 3,9   |
| Total | 77     | 26     | 49       | 36     | 18   | 103   | 100,0 |
| %     | 74,8   | 25,2   | 47,6     | 35,0   | 17,5 | 100,0 |       |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Leucémie aiguë lymphoblastique T  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025



0,4%


|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 25,9 |
| Age médian  | 17,0 |
| Femmes      | 24,0 |
| Hommes      | 16,0 |
| Age maximal | 88   |
| Age minimal | 1    |

|                               | Hommes                | Femmes               | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 77                    | 26                   | 49                    | 36                    | 18                    | 103                   |
| Taux bruts annuels*           | 0,41                  | 0,13                 | 0,28                  | 0,28                  | 0,24                  | 0,27                  |
| Taux standardisés**           |                       |                      |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,52<br>(0,16 - 0,88) | 0,16<br>(0 - 0,35)   | 0,33<br>(0,04 - 0,62) | 0,37<br>(0 - 0,75)    | 0,32<br>(0 - 0,78)    | 0,34<br>(0,05 - 0,63) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 0,40<br>(0,36 - 0,44) | 0,13<br>(0,1 - 0,16) | 0,26<br>(0,23 - 0,3)  | 0,27<br>(0,23 - 0,32) | 0,24<br>(0,19 - 0,3)  | 0,26<br>(0,23 - 0,3)  |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 0,44<br>(0,38 - 0,5)  | 0,14<br>(0,1 - 0,17) | 0,29<br>(0,23 - 0,34) | 0,31<br>(0,24 - 0,37) | 0,28<br>(0,19 - 0,36) | 0,29<br>(0,24 - 0,34) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)

\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |           |           |           |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans     | 5 ans     | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | > 15 ans            | 0,85 (22)                        | 0,81 (21) | 0,73 (19) | 0,65 (14) | 0,65 (10) |
| Hommes          | > 15 ans            | 0,87 (68)                        | 0,77 (59) | 0,68 (47) | 0,68 (38) | 0,64 (26) |
| Significativité |                     | NS                               | NS        | NS        | NS        | NS        |

Total h  mopathies lympho  des T (/3)

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 21     | 16     | 22       | 11     | 4    | 37    | 2,6   |
| 1998  | 21     | 10     | 19       | 7      | 5    | 31    | 2,2   |
| 1999  | 23     | 12     | 21       | 6      | 8    | 35    | 2,4   |
| 2000  | 25     | 17     | 16       | 20     | 6    | 42    | 2,9   |
| 2001  | 15     | 20     | 15       | 13     | 7    | 35    | 2,4   |
| 2002  | 22     | 21     | 24       | 14     | 5    | 43    | 3,0   |
| 2003  | 32     | 19     | 20       | 24     | 7    | 51    | 3,5   |
| 2004  | 28     | 17     | 26       | 10     | 9    | 45    | 3,1   |
| 2005  | 22     | 14     | 21       | 6      | 9    | 36    | 2,5   |
| 2006  | 36     | 24     | 31       | 18     | 11   | 60    | 4,2   |
| 2007  | 36     | 16     | 22       | 21     | 9    | 52    | 3,6   |
| 2008  | 40     | 29     | 34       | 24     | 11   | 69    | 4,8   |
| 2009  | 34     | 28     | 25       | 31     | 6    | 62    | 4,3   |
| 2010  | 33     | 23     | 27       | 17     | 12   | 56    | 3,9   |
| 2011  | 36     | 29     | 37       | 15     | 13   | 65    | 4,5   |
| 2012  | 27     | 24     | 25       | 20     | 6    | 51    | 3,5   |
| 2013  | 25     | 28     | 30       | 11     | 12   | 53    | 3,7   |
| 2014  | 43     | 20     | 32       | 18     | 13   | 63    | 4,4   |
| 2015  | 29     | 24     | 27       | 17     | 9    | 53    | 3,7   |
| 2016  | 43     | 22     | 40       | 13     | 12   | 65    | 4,5   |
| 2017  | 40     | 29     | 40       | 20     | 9    | 69    | 4,8   |
| 2018  | 31     | 24     | 33       | 11     | 11   | 55    | 3,8   |
| 2019  | 41     | 34     | 44       | 21     | 10   | 75    | 5,2   |
| 2020  | 44     | 42     | 42       | 27     | 17   | 86    | 6,0   |
| 2021  | 44     | 33     | 47       | 19     | 11   | 77    | 5,3   |
| 2022  | 45     | 29     | 47       | 15     | 12   | 74    | 5,1   |
| Total | 836    | 604    | 767      | 429    | 244  | 1 440 | 100,0 |
| %     | 58,1   | 41,9   | 53,3     | 29,8   | 16,9 | 100,0 |       |

Proportion de Total h  mopathies lympho  des T (/3)  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

P  riode d'incidence : 1997 - 2022  
Tous   ges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 61,7 |
| Age m  dian | 66,0 |
| Femmes      | 67,0 |
| Hommes      | 66,0 |
| Age maximal | 96   |
| Age minimal | 1    |


|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 836                   | 604                   | 767                   | 429                   | 244                   | 1 440                 |
| Taux bruts annuels*           | 4,50                  | 3,06                  | 4,32                  | 3,31                  | 3,22                  | 3,76                  |
| Taux standardis  s**          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 2,86<br>(2,19 - 3,53) | 1,89<br>(1,36 - 2,42) | 2,78<br>(2,12 - 3,44) | 2,11<br>(1,39 - 2,82) | 1,96<br>(1,07 - 2,85) | 2,37<br>(1,77 - 2,97) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 4,48<br>(4,33 - 4,63) | 2,97<br>(2,85 - 3,09) | 4,50<br>(4,34 - 4,66) | 3,13<br>(2,98 - 3,28) | 3,02<br>(2,82 - 3,21) | 3,69<br>(3,56 - 3,83) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 3,75<br>(3,58 - 3,91) | 2,51<br>(2,38 - 2,65) | 3,74<br>(3,57 - 3,91) | 2,67<br>(2,5 - 2,84)  | 2,55<br>(2,34 - 2,77) | 3,11<br>(2,96 - 3,26) |

\* Taux pour 100 000 habitants   g  s de 0    108 ans (Pop INSEE 2010) \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

R  partition par tranches d'  ges au diagnostic



Probabilit   de survie globale



| Survie           | M  diane<br>(ann  es) | Probabilit   de survie (Effectif) |            |            |            |            |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |                       | 1 an                              | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans     |
| Femmes           | 14,58                 | 0,81 (485)                        | 0,77 (444) | 0,67 (327) | 0,56 (199) | 0,49 (116) |
| Hommes           | 8,07                  | 0,81 (667)                        | 0,72 (570) | 0,58 (398) | 0,47 (231) | 0,38 (128) |
| Significativit   | NS                    | NS                                | p<0,05     | p<0,001    | NS         | NS         |


Syndrome myélodysplasique (SMD)

Codes ICDO : 99803, 99823, 99833, 99853, 99863, 99873, 99893, 99913, 99923, 99933

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 56     | 40     | 45       | 31     | 20   | 96    | 2,7   |
| 1998  | 60     | 43     | 48       | 31     | 24   | 103   | 2,9   |
| 1999  | 63     | 40     | 49       | 37     | 17   | 103   | 2,9   |
| 2000  | 44     | 42     | 41       | 29     | 16   | 86    | 2,4   |
| 2001  | 49     | 46     | 38       | 36     | 21   | 95    | 2,7   |
| 2002  | 53     | 34     | 36       | 33     | 18   | 87    | 2,5   |
| 2003  | 60     | 44     | 50       | 34     | 20   | 104   | 2,9   |
| 2004  | 58     | 47     | 43       | 34     | 28   | 105   | 3,0   |
| 2005  | 56     | 50     | 58       | 26     | 22   | 106   | 3,0   |
| 2006  | 62     | 57     | 63       | 28     | 28   | 119   | 3,4   |
| 2007  | 67     | 78     | 72       | 48     | 25   | 145   | 4,1   |
| 2008  | 83     | 73     | 65       | 39     | 52   | 156   | 4,4   |
| 2009  | 82     | 95     | 72       | 51     | 54   | 177   | 5,0   |
| 2010  | 116    | 101    | 88       | 65     | 64   | 217   | 6,1   |
| 2011  | 96     | 99     | 84       | 53     | 58   | 195   | 5,5   |
| 2012  | 105    | 86     | 89       | 39     | 63   | 191   | 5,4   |
| 2013  | 82     | 79     | 70       | 48     | 43   | 161   | 4,5   |
| 2014  | 98     | 78     | 82       | 57     | 37   | 176   | 5,0   |
| 2015  | 94     | 64     | 66       | 68     | 24   | 158   | 4,5   |
| 2016  | 86     | 70     | 60       | 71     | 25   | 156   | 4,4   |
| 2017  | 57     | 57     | 42       | 47     | 25   | 114   | 3,2   |
| 2018  | 75     | 55     | 62       | 47     | 21   | 130   | 3,7   |
| 2019  | 89     | 60     | 74       | 39     | 36   | 149   | 4,2   |
| 2020  | 71     | 43     | 48       | 44     | 22   | 114   | 3,2   |
| 2021  | 67     | 56     | 53       | 52     | 18   | 123   | 3,5   |
| 2022  | 111    | 63     | 87       | 63     | 24   | 174   | 4,9   |
| Total | 1 940  | 1 600  | 1 585    | 1 150  | 805  | 3 540 | 100,0 |
| %     | 54,8   | 45,2   | 44,8     | 32,5   | 22,7 | 100,0 |       |

Proportion de Syndrome myélodysplasique (SMD) parmi l'ensemble des HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 76,9 |
| Age médian  | 78,0 |
| Femmes      | 79,5 |
| Hommes      | 78,0 |
| Age maximal | 99   |
| Age minimal | 1    |


|                            | Hommes             | Femmes             | Calvados           | Manche             | Orne               | Total              |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nombre de patients         | 1 940              | 1 600              | 1 585              | 1 150              | 805                | 3 540              |
| Taux bruts annuels*        | 10,45              | 8,10               | 8,92               | 8,87               | 10,62              | 9,24               |
| Taux standardisés**        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| pop mondiale (IC 0,95)     | 4,03 (3,45 - 4,62) | 3,03 (2,54 - 3,53) | 3,81 (3,2 - 4,42)  | 3,07 (2,46 - 3,67) | 3,66 (2,8 - 4,52)  | 3,51 (2,97 - 4,05) |
| pop Europe Ouest (IC 0,95) | 9,65 (9,44 - 9,86) | 7,41 (7,22 - 7,59) | 9,12 (8,89 - 9,35) | 7,53 (7,31 - 7,76) | 8,92 (8,6 - 9,24)  | 8,49 (8,3 - 8,69)  |
| pop USA (IC 0,95)          | 7,21 (7 - 7,42)    | 5,31 (5,14 - 5,48) | 6,59 (6,38 - 6,8)  | 5,47 (5,26 - 5,68) | 6,47 (6,17 - 6,77) | 6,15 (5,97 - 6,34) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane (années) | Probabilité de survie (Effectif) |             |            |            |           |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|
|                 |                  | 1 an                             | 2 ans       | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans    |
| Femmes          | 3,78             | 0,79 (1258)                      | 0,66 (1018) | 0,42 (584) | 0,2 (231)  | 0,11 (76) |
| Hommes          | 2,76             | 0,73 (1410)                      | 0,58 (1081) | 0,31 (525) | 0,12 (165) | 0,06 (50) |
| Significativité | p<0,001          | p<0,001                          | p<0,001     | p<0,001    | p<0,001    | p<0,001   |


Leucémie aiguë myéloïde (LAM)

Codes ICDO : 98003, 98013, 98403, 98603, 98613, 98653, 98673, 98693, 98703 à 98743, 98773 à 98793, 98913, 98953 à 98983, 99103, 99113, 99123, 99203, 99303, 99313, 99843

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 20     | 24     | 17       | 21     | 6    | 44    | 2,6   |
| 1998  | 22     | 24     | 29       | 14     | 3    | 46    | 2,7   |
| 1999  | 23     | 34     | 27       | 20     | 10   | 57    | 3,4   |
| 2000  | 17     | 21     | 13       | 15     | 10   | 38    | 2,2   |
| 2001  | 33     | 26     | 25       | 26     | 8    | 59    | 3,5   |
| 2002  | 17     | 28     | 21       | 20     | 4    | 45    | 2,7   |
| 2003  | 25     | 26     | 26       | 12     | 13   | 51    | 3,0   |
| 2004  | 28     | 25     | 18       | 22     | 13   | 53    | 3,1   |
| 2005  | 33     | 26     | 35       | 17     | 7    | 59    | 3,5   |
| 2006  | 39     | 34     | 32       | 29     | 12   | 73    | 4,3   |
| 2007  | 26     | 21     | 25       | 10     | 12   | 47    | 2,8   |
| 2008  | 22     | 31     | 24       | 20     | 9    | 53    | 3,1   |
| 2009  | 30     | 34     | 34       | 20     | 10   | 64    | 3,8   |
| 2010  | 31     | 28     | 27       | 22     | 10   | 59    | 3,5   |
| 2011  | 34     | 32     | 28       | 29     | 9    | 66    | 3,9   |
| 2012  | 52     | 34     | 42       | 25     | 19   | 86    | 5,1   |
| 2013  | 27     | 54     | 30       | 31     | 20   | 81    | 4,8   |
| 2014  | 30     | 34     | 34       | 15     | 15   | 64    | 3,8   |
| 2015  | 39     | 28     | 29       | 24     | 14   | 67    | 4,0   |
| 2016  | 38     | 53     | 45       | 31     | 15   | 91    | 5,4   |
| 2017  | 54     | 48     | 48       | 37     | 17   | 102   | 6,0   |
| 2018  | 41     | 33     | 32       | 27     | 15   | 74    | 4,4   |
| 2019  | 51     | 34     | 29       | 40     | 16   | 85    | 5,0   |
| 2020  | 35     | 32     | 30       | 26     | 11   | 67    | 4,0   |
| 2021  | 42     | 33     | 33       | 25     | 17   | 75    | 4,4   |
| 2022  | 39     | 44     | 31       | 28     | 24   | 83    | 4,9   |
| Total | 848    | 841    | 764      | 606    | 319  | 1 689 | 100,0 |
| %     | 50,2   | 49,8   | 45,2     | 35,9   | 18,9 | 100,0 |       |

Proportion de Leucémie aiguë myéloïde (LAM) parmi l'ensemble des HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 68,8 |
| Age médian  | 73,0 |
| Femmes      | 76,0 |
| Hommes      | 72,0 |
| Age maximal | 100  |
| Age minimal | 0    |


|                            | Hommes             | Femmes             | Calvados           | Manche             | Orne               | Total              |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nombre de patients         | 848                | 841                | 764                | 606                | 319                | 1 689              |
| Taux bruts annuels*        | 4,57               | 4,26               | 4,30               | 4,67               | 4,21               | 4,41               |
| Taux standardisés**        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| pop mondiale (IC 0,95)     | 2,39 (1,84 - 2,95) | 2,18 (1,64 - 2,71) | 2,39 (1,8 - 2,97)  | 2,30 (1,63 - 2,98) | 2,01 (1,21 - 2,82) | 2,28 (1,73 - 2,83) |
| pop Europe Ouest (IC 0,95) | 4,42 (4,28 - 4,57) | 4,01 (3,88 - 4,15) | 4,45 (4,29 - 4,61) | 4,19 (4,02 - 4,36) | 3,75 (3,54 - 3,97) | 4,21 (4,06 - 4,35) |
| pop USA (IC 0,95)          | 3,55 (3,4 - 3,71)  | 3,22 (3,07 - 3,36) | 3,57 (3,4 - 3,73)  | 3,34 (3,16 - 3,52) | 3,00 (2,78 - 3,22) | 3,37 (3,22 - 3,52) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane (années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |           |           |
|-----------------|------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                 |                  | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | 0,44             | 0,34 (286)                       | 0,22 (176) | 0,15 (106) | 0,12 (61) | 0,11 (35) |
| Hommes          | 0,54             | 0,38 (319)                       | 0,26 (211) | 0,18 (125) | 0,14 (60) | 0,12 (27) |
| Significativité | p<0,001          | NS                               | NS         | NS         | NS        | NS        |


Thrombocytémie essentielle

Code ICDO : 99623

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 10     | 15     | 10       | 7      | 8    | 25    | 1,6   |
| 1998  | 9      | 23     | 18       | 9      | 5    | 32    | 2,1   |
| 1999  | 15     | 28     | 21       | 11     | 11   | 43    | 2,8   |
| 2000  | 11     | 29     | 20       | 12     | 8    | 40    | 2,6   |
| 2001  | 12     | 26     | 15       | 15     | 8    | 38    | 2,5   |
| 2002  | 20     | 23     | 22       | 16     | 5    | 43    | 2,8   |
| 2003  | 22     | 29     | 18       | 22     | 11   | 51    | 3,4   |
| 2004  | 16     | 23     | 23       | 13     | 3    | 39    | 2,6   |
| 2005  | 13     | 22     | 16       | 12     | 7    | 35    | 2,3   |
| 2006  | 23     | 33     | 26       | 17     | 13   | 56    | 3,7   |
| 2007  | 20     | 36     | 21       | 28     | 7    | 56    | 3,7   |
| 2008  | 25     | 27     | 24       | 17     | 11   | 52    | 3,4   |
| 2009  | 23     | 39     | 24       | 26     | 12   | 62    | 4,1   |
| 2010  | 18     | 33     | 16       | 27     | 8    | 51    | 3,4   |
| 2011  | 19     | 31     | 29       | 16     | 5    | 50    | 3,3   |
| 2012  | 20     | 39     | 29       | 18     | 12   | 59    | 3,9   |
| 2013  | 29     | 43     | 37       | 18     | 17   | 72    | 4,7   |
| 2014  | 26     | 39     | 35       | 23     | 7    | 65    | 4,3   |
| 2015  | 28     | 38     | 30       | 31     | 5    | 66    | 4,3   |
| 2016  | 39     | 44     | 26       | 33     | 24   | 83    | 5,5   |
| 2017  | 26     | 43     | 38       | 21     | 10   | 69    | 4,5   |
| 2018  | 33     | 55     | 47       | 29     | 12   | 88    | 5,8   |
| 2019  | 45     | 53     | 38       | 42     | 18   | 98    | 6,4   |
| 2020  | 36     | 40     | 45       | 23     | 8    | 76    | 5,0   |
| 2021  | 43     | 62     | 54       | 33     | 18   | 105   | 6,9   |
| 2022  | 30     | 38     | 28       | 27     | 13   | 68    | 4,5   |
| Total | 611    | 911    | 710      | 546    | 266  | 1 522 | 100,0 |
| %     | 40,1   | 59,9   | 46,6     | 35,9   | 17,5 | 100,0 |       |

Proportion de Thrombocytémie essentielle  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 68,4 |
| Age médian  | 71,0 |
| Femmes      | 72,0 |
| Hommes      | 70,0 |
| Age maximal | 101  |
| Age minimal | 0    |


|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 611                   | 911                   | 710                   | 546                   | 266                   | 1 522                 |
| Taux bruts annuels*           | 3,29                  | 4,61                  | 4,00                  | 4,21                  | 3,51                  | 3,97                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 1,71<br>(1,25 - 2,17) | 2,43<br>(1,89 - 2,97) | 2,24<br>(1,69 - 2,78) | 2,10<br>(1,49 - 2,72) | 1,66<br>(0,95 - 2,37) | 2,07<br>(1,57 - 2,57) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 3,24<br>(3,11 - 3,36) | 4,47<br>(4,33 - 4,62) | 4,19<br>(4,04 - 4,35) | 3,89<br>(3,72 - 4,05) | 3,18<br>(2,99 - 3,38) | 3,87<br>(3,73 - 4,01) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 2,58<br>(2,45 - 2,72) | 3,56<br>(3,4 - 3,71)  | 3,33<br>(3,17 - 3,5)  | 3,09<br>(2,92 - 3,27) | 2,52<br>(2,31 - 2,72) | 3,08<br>(2,93 - 3,22) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |            |            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans     |
| Femmes          | 12,42               | 0,96 (868)                       | 0,93 (813) | 0,81 (614) | 0,62 (343) | 0,42 (155) |
| Hommes          | 9,33                | 0,94 (573)                       | 0,9 (532)  | 0,73 (364) | 0,47 (162) | 0,31 (71)  |
| Significativité | p<0,01              | NS                               | NS         | p<0,001    | p<0,001    | p<0,001    |


Polyglobulie de Vaquez

Code ICDO : 99503

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 16     | 13     | 7        | 10     | 12   | 29    | 4,0   |
| 1998  | 9      | 6      | 6        | 8      | 1    | 15    | 2,1   |
| 1999  | 16     | 17     | 16       | 10     | 7    | 33    | 4,6   |
| 2000  | 7      | 5      | 7        | 4      | 1    | 12    | 1,7   |
| 2001  | 13     | 10     | 8        | 12     | 3    | 23    | 3,2   |
| 2002  | 15     | 7      | 4        | 10     | 8    | 22    | 3,0   |
| 2003  | 14     | 11     | 10       | 9      | 6    | 25    | 3,5   |
| 2004  | 11     | 8      | 7        | 8      | 4    | 19    | 2,6   |
| 2005  | 11     | 12     | 8        | 9      | 6    | 23    | 3,2   |
| 2006  | 17     | 13     | 11       | 11     | 8    | 30    | 4,2   |
| 2007  | 9      | 11     | 6        | 10     | 4    | 20    | 2,8   |
| 2008  | 12     | 12     | 13       | 7      | 4    | 24    | 3,3   |
| 2009  | 20     | 10     | 12       | 13     | 5    | 30    | 4,2   |
| 2010  | 18     | 10     | 12       | 10     | 6    | 28    | 3,9   |
| 2011  | 11     | 14     | 14       | 7      | 4    | 25    | 3,5   |
| 2012  | 20     | 14     | 20       | 9      | 5    | 34    | 4,7   |
| 2013  | 14     | 14     | 9        | 11     | 8    | 28    | 3,9   |
| 2014  | 15     | 16     | 16       | 11     | 4    | 31    | 4,3   |
| 2015  | 19     | 18     | 14       | 16     | 7    | 37    | 5,1   |
| 2016  | 27     | 16     | 20       | 8      | 15   | 43    | 6,0   |
| 2017  | 10     | 17     | 13       | 7      | 7    | 27    | 3,7   |
| 2018  | 19     | 16     | 19       | 9      | 7    | 35    | 4,8   |
| 2019  | 12     | 18     | 16       | 7      | 7    | 30    | 4,2   |
| 2020  | 22     | 13     | 19       | 12     | 4    | 35    | 4,8   |
| 2021  | 19     | 13     | 21       | 8      | 3    | 32    | 4,4   |
| 2022  | 19     | 13     | 19       | 7      | 6    | 32    | 4,4   |
| Total | 395    | 327    | 327      | 243    | 152  | 722   | 100,0 |
| %     | 54,7   | 45,3   | 45,3     | 33,7   | 21,1 | 100,0 |       |

Proportion de Polyglobulie de Vaquez  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 69,1 |
| Age médian  | 71,0 |
| Femmes      | 73,0 |
| Hommes      | 68,0 |
| Age maximal | 103  |
| Age minimal | 18   |


|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 395                   | 327                   | 327                   | 243                   | 152                   | 722                   |
| Taux bruts annuels*           | 2,13                  | 1,66                  | 1,84                  | 1,87                  | 2,00                  | 1,88                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 1,09<br>(0,74 - 1,44) | 0,78<br>(0,5 - 1,06)  | 0,99<br>(0,64 - 1,33) | 0,86<br>(0,49 - 1,22) | 0,95<br>(0,44 - 1,45) | 0,93<br>(0,62 - 1,25) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 2,09<br>(1,99 - 2,2)  | 1,57<br>(1,49 - 1,66) | 1,93<br>(1,82 - 2,03) | 1,70<br>(1,59 - 1,81) | 1,83<br>(1,68 - 1,97) | 1,82<br>(1,73 - 1,92) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 1,67<br>(1,57 - 1,78) | 1,22<br>(1,13 - 1,31) | 1,51<br>(1,41 - 1,62) | 1,34<br>(1,22 - 1,45) | 1,46<br>(1,3 - 1,61)  | 1,44<br>(1,34 - 1,54) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |            |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans     | 15 ans    |
| Femmes          | 12,05               | 0,95 (310)                       | 0,91 (286) | 0,78 (218) | 0,55 (108) | 0,37 (54) |
| Hommes          | 12,06               | 0,97 (382)                       | 0,93 (359) | 0,79 (262) | 0,59 (148) | 0,39 (60) |
| Significativité | NS                  | NS                               | NS         | NS         | NS         | NS        |

# Leucémie myéloïde chronique

Codes ICDO : 98633, 98753

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 10     | 10     | 7        | 10     | 3    | 20    | 3,9   |
| 1998  | 8      | 6      | 9        | 5      | 0    | 14    | 2,7   |
| 1999  | 15     | 10     | 11       | 9      | 5    | 25    | 4,8   |
| 2000  | 8      | 4      | 4        | 4      | 4    | 12    | 2,3   |
| 2001  | 6      | 12     | 2        | 11     | 5    | 18    | 3,5   |
| 2002  | 7      | 5      | 7        | 2      | 3    | 12    | 2,3   |
| 2003  | 11     | 5      | 6        | 5      | 5    | 16    | 3,1   |
| 2004  | 10     | 7      | 8        | 5      | 4    | 17    | 3,3   |
| 2005  | 11     | 8      | 7        | 6      | 6    | 19    | 3,7   |
| 2006  | 8      | 6      | 6        | 5      | 3    | 14    | 2,7   |
| 2007  | 9      | 3      | 6        | 3      | 3    | 12    | 2,3   |
| 2008  | 9      | 13     | 4        | 13     | 5    | 22    | 4,2   |
| 2009  | 9      | 3      | 6        | 5      | 1    | 12    | 2,3   |
| 2010  | 6      | 5      | 4        | 2      | 5    | 11    | 2,1   |
| 2011  | 8      | 9      | 8        | 4      | 5    | 17    | 3,3   |
| 2012  | 18     | 15     | 16       | 9      | 8    | 33    | 6,4   |
| 2013  | 9      | 15     | 11       | 9      | 4    | 24    | 4,6   |
| 2014  | 16     | 11     | 14       | 9      | 4    | 27    | 5,2   |
| 2015  | 8      | 6      | 8        | 4      | 2    | 14    | 2,7   |
| 2016  | 22     | 7      | 16       | 9      | 4    | 29    | 5,6   |
| 2017  | 8      | 14     | 10       | 8      | 4    | 22    | 4,2   |
| 2018  | 12     | 11     | 11       | 9      | 3    | 23    | 4,4   |
| 2019  | 14     | 8      | 9        | 9      | 4    | 22    | 4,2   |
| 2020  | 17     | 12     | 17       | 8      | 4    | 29    | 5,6   |
| 2021  | 21     | 12     | 19       | 10     | 4    | 33    | 6,4   |
| 2022  | 14     | 8      | 13       | 7      | 2    | 22    | 4,2   |
| Total | 294    | 225    | 239      | 180    | 100  | 519   | 100,0 |
| %     | 56,6   | 43,4   | 46,1     | 34,7   | 19,3 | 100,0 |       |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Leucémie myéloïde chronique  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025



2,0%


|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 60,0 |
| Age médian  | 62,0 |
| Femmes      | 65,0 |
| Hommes      | 61,0 |
| Age maximal | 95   |
| Age minimal | 5    |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 294                   | 225                   | 239                   | 180                   | 100                   | 519                   |
| Taux bruts annuels*           | 1,58                  | 1,14                  | 1,35                  | 1,39                  | 1,32                  | 1,35                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 1,04<br>(0,64 - 1,44) | 0,75<br>(0,42 - 1,08) | 0,90<br>(0,53 - 1,28) | 0,87<br>(0,44 - 1,31) | 0,92<br>(0,31 - 1,53) | 0,90<br>(0,53 - 1,26) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 1,61<br>(1,52 - 1,7)  | 1,15<br>(1,08 - 1,23) | 1,42<br>(1,33 - 1,51) | 1,35<br>(1,25 - 1,45) | 1,33<br>(1,2 - 1,46)  | 1,37<br>(1,29 - 1,46) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 1,39<br>(1,29 - 1,49) | 0,99<br>(0,9 - 1,07)  | 1,22<br>(1,12 - 1,32) | 1,16<br>(1,05 - 1,27) | 1,16<br>(1,01 - 1,31) | 1,18<br>(1,09 - 1,28) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)

\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |            |           |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans      | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | > 15 ans            | 0,98 (221)                       | 0,93 (205) | 0,82 (155) | 0,68 (95) | 0,52 (45) |
| Hommes          | 14,43               | 0,96 (282)                       | 0,91 (261) | 0,78 (181) | 0,59 (98) | 0,48 (51) |
| Significativité |                     | NS                               | NS         | NS         | p<0,01    | p<0,001   |


Syndrome myélodysplasique myéloprolifératif

Codes ICDO : 98763, 99453, 99463, 99753

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 5      | 4      | 4        | 3      | 2    | 9     | 1,8   |
| 1998  | 2      | 7      | 6        | 2      | 1    | 9     | 1,8   |
| 1999  | 4      | 3      | 4        | 3      | 0    | 7     | 1,4   |
| 2000  | 9      | 7      | 4        | 10     | 2    | 16    | 3,2   |
| 2001  | 3      | 3      | 3        | 2      | 1    | 6     | 1,2   |
| 2002  | 6      | 1      | 4        | 0      | 3    | 7     | 1,4   |
| 2003  | 6      | 4      | 4        | 2      | 4    | 10    | 2,0   |
| 2004  | 1      | 7      | 4        | 3      | 1    | 8     | 1,6   |
| 2005  | 9      | 7      | 8        | 3      | 5    | 16    | 3,2   |
| 2006  | 1      | 2      | 1        | 2      | 0    | 3     | 0,6   |
| 2007  | 11     | 6      | 8        | 9      | 0    | 17    | 3,4   |
| 2008  | 7      | 4      | 5        | 4      | 2    | 11    | 2,2   |
| 2009  | 12     | 6      | 6        | 4      | 8    | 18    | 3,6   |
| 2010  | 15     | 8      | 11       | 10     | 2    | 23    | 4,7   |
| 2011  | 8      | 3      | 5        | 4      | 2    | 11    | 2,2   |
| 2012  | 10     | 4      | 7        | 5      | 2    | 14    | 2,8   |
| 2013  | 18     | 7      | 5        | 17     | 3    | 25    | 5,1   |
| 2014  | 10     | 7      | 5        | 7      | 5    | 17    | 3,4   |
| 2015  | 10     | 8      | 8        | 8      | 2    | 18    | 3,6   |
| 2016  | 21     | 10     | 13       | 14     | 4    | 31    | 6,3   |
| 2017  | 16     | 10     | 12       | 8      | 6    | 26    | 5,3   |
| 2018  | 21     | 16     | 25       | 8      | 4    | 37    | 7,5   |
| 2019  | 23     | 13     | 18       | 11     | 7    | 36    | 7,3   |
| 2020  | 28     | 12     | 19       | 13     | 8    | 40    | 8,1   |
| 2021  | 24     | 11     | 13       | 11     | 11   | 35    | 7,1   |
| 2022  | 28     | 16     | 24       | 14     | 6    | 44    | 8,9   |
| Total | 308    | 186    | 226      | 177    | 91   | 494   | 100,0 |
| %     | 62,3   | 37,7   | 45,7     | 35,8   | 18,4 | 100,0 |       |

Proportion de Syndrome myélodysplasique myéloprolifératif  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 75,9 |
| Age médian  | 78,0 |
| Femmes      | 78,0 |
| Hommes      | 78,0 |
| Age maximal | 99   |
| Age minimal | 0    |


|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 308                   | 186                   | 226                   | 177                   | 91                    | 494                   |
| Taux bruts annuels*           | 1,66                  | 0,94                  | 1,27                  | 1,36                  | 1,20                  | 1,29                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,65<br>(0,41 - 0,9)  | 0,38<br>(0,18 - 0,57) | 0,56<br>(0,31 - 0,81) | 0,49<br>(0,25 - 0,74) | 0,44<br>(0,12 - 0,75) | 0,51<br>(0,29 - 0,73) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 1,53<br>(1,45 - 1,62) | 0,86<br>(0,79 - 0,92) | 1,29<br>(1,2 - 1,37)  | 1,17<br>(1,08 - 1,26) | 1,02<br>(0,91 - 1,13) | 1,19<br>(1,11 - 1,26) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 1,15<br>(1,06 - 1,23) | 0,61<br>(0,56 - 0,67) | 0,93<br>(0,85 - 1,01) | 0,83<br>(0,75 - 0,91) | 0,76<br>(0,65 - 0,87) | 0,86<br>(0,79 - 0,93) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |           |          |          |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans     | 10 ans   | 15 ans   |
| Femmes          | 2,47                | 0,7 (127)                        | 0,56 (100) | 0,34 (48) | 0,2 (13) | 0,08 (4) |
| Hommes          | 2,40                | 0,71 (216)                       | 0,55 (156) | 0,25 (54) | 0,04 (6) |          |
| Significativité | NS                  | NS                               | NS         | NS        | NS       | NS       |

# Syndrome myéloprolifératif (SMP) avec myélofibrose

Code ICDO : 99613

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 6      | 5      | 4        | 6      | 1    | 11    | 4,5   |
| 1998  | 4      | 3      | 2        | 4      | 1    | 7     | 2,8   |
| 1999  | 5      | 1      | 2        | 4      | 0    | 6     | 2,4   |
| 2000  | 7      | 5      | 8        | 3      | 1    | 12    | 4,9   |
| 2001  | 3      | 3      | 1        | 4      | 1    | 6     | 2,4   |
| 2002  | 2      | 2      | 2        | 1      | 1    | 4     | 1,6   |
| 2003  | 7      | 4      | 2        | 3      | 6    | 11    | 4,5   |
| 2004  | 5      | 3      | 3        | 3      | 2    | 8     | 3,2   |
| 2005  | 4      | 2      | 3        | 3      | 0    | 6     | 2,4   |
| 2006  | 4      | 4      | 2        | 2      | 4    | 8     | 3,2   |
| 2007  | 10     | 1      | 5        | 2      | 4    | 11    | 4,5   |
| 2008  | 10     | 1      | 2        | 6      | 3    | 11    | 4,5   |
| 2009  | 2      | 0      | 2        | 0      | 0    | 2     | 0,8   |
| 2010  | 6      | 1      | 4        | 3      | 0    | 7     | 2,8   |
| 2011  | 7      | 1      | 1        | 5      | 2    | 8     | 3,2   |
| 2012  | 7      | 5      | 3        | 7      | 2    | 12    | 4,9   |
| 2013  | 3      | 6      | 3        | 5      | 1    | 9     | 3,6   |
| 2014  | 5      | 6      | 2        | 6      | 3    | 11    | 4,5   |
| 2015  | 10     | 4      | 6        | 4      | 4    | 14    | 5,7   |
| 2016  | 8      | 5      | 7        | 2      | 4    | 13    | 5,3   |
| 2017  | 11     | 3      | 4        | 8      | 2    | 14    | 5,7   |
| 2018  | 4      | 3      | 5        | 1      | 1    | 7     | 2,8   |
| 2019  | 12     | 4      | 5        | 6      | 5    | 16    | 6,5   |
| 2020  | 11     | 8      | 5        | 13     | 1    | 19    | 7,7   |
| 2021  | 4      | 0      | 0        | 3      | 1    | 4     | 1,6   |
| 2022  | 7      | 3      | 5        | 2      | 3    | 10    | 4,0   |
| Total | 164    | 83     | 88       | 106    | 53   | 247   | 100,0 |
| %     | 66,4   | 33,6   | 35,6     | 42,9   | 21,5 | 100,0 |       |

Proportion de Syndrome myéloprolifératif (SMP) avec myélofibrose  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 71,1 |
| Age médian  | 72,0 |
| Femmes      | 75,0 |
| Hommes      | 70,5 |
| Age maximal | 96   |
| Age minimal | 36   |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 164                   | 83                    | 88                    | 106                   | 53                    | 247                   |
| Taux bruts annuels*           | 0,88                  | 0,42                  | 0,50                  | 0,82                  | 0,70                  | 0,64                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,43<br>(0,22 - 0,63) | 0,18<br>(0,05 - 0,31) | 0,24<br>(0,08 - 0,4)  | 0,38<br>(0,14 - 0,62) | 0,30<br>(0,04 - 0,56) | 0,30<br>(0,13 - 0,47) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 0,89<br>(0,82 - 0,96) | 0,40<br>(0,36 - 0,44) | 0,52<br>(0,47 - 0,58) | 0,76<br>(0,68 - 0,83) | 0,66<br>(0,57 - 0,75) | 0,63<br>(0,58 - 0,69) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 0,68<br>(0,61 - 0,75) | 0,30<br>(0,25 - 0,34) | 0,39<br>(0,34 - 0,45) | 0,59<br>(0,52 - 0,67) | 0,49<br>(0,4 - 0,57)  | 0,48<br>(0,43 - 0,54) |


\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)

\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |            |           |           |          |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans      | 5 ans     | 10 ans    | 15 ans   |
| Femmes          | 4,63                | 0,83 (68)                        | 0,71 (57)  | 0,48 (34) | 0,27 (13) | 0,12 (5) |
| Hommes          | 3,47                | 0,83 (135)                       | 0,71 (111) | 0,34 (48) | 0,14 (15) | 0,07 (5) |
| Significativité | p<0,01              | NS                               | NS         | NS        | p<0,05    | p<0,05   |

# Autres syndromes myéloprolifératifs chroniques

Codes ICDO : 99603, 99633, 99643


|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 5      | 4      | 1        | 6      | 2    | 9     | 3,8   |
| 1998  | 7      | 1      | 3        | 3      | 2    | 8     | 3,4   |
| 1999  | 2      | 3      | 4        | 1      | 0    | 5     | 2,1   |
| 2000  | 5      | 7      | 3        | 7      | 2    | 12    | 5,1   |
| 2001  | 7      | 5      | 3        | 4      | 5    | 12    | 5,1   |
| 2002  | 8      | 4      | 4        | 7      | 1    | 12    | 5,1   |
| 2003  | 6      | 7      | 5        | 4      | 4    | 13    | 5,5   |
| 2004  | 6      | 6      | 2        | 6      | 4    | 12    | 5,1   |
| 2005  | 10     | 7      | 12       | 2      | 3    | 17    | 7,2   |
| 2006  | 6      | 4      | 6        | 1      | 3    | 10    | 4,2   |
| 2007  | 5      | 4      | 6        | 3      | 0    | 9     | 3,8   |
| 2008  | 8      | 6      | 10       | 1      | 3    | 14    | 5,9   |
| 2009  | 4      | 6      | 8        | 2      | 0    | 10    | 4,2   |
| 2010  | 8      | 5      | 7        | 4      | 2    | 13    | 5,5   |
| 2011  | 5      | 4      | 4        | 2      | 3    | 9     | 3,8   |
| 2012  | 12     | 6      | 11       | 3      | 4    | 18    | 7,6   |
| 2013  | 4      | 4      | 5        | 1      | 2    | 8     | 3,4   |
| 2014  | 11     | 7      | 11       | 1      | 6    | 18    | 7,6   |
| 2015  | 7      | 2      | 4        | 3      | 2    | 9     | 3,8   |
| 2016  | 1      | 1      | 0        | 0      | 2    | 2     | 0,8   |
| 2017  | 0      | 1      | 0        | 1      | 0    | 1     | 0,4   |
| 2018  | 3      | 1      | 0        | 3      | 1    | 4     | 1,7   |
| 2019  | 1      | 2      | 3        | 0      | 0    | 3     | 1,3   |
| 2020  | 3      | 0      | 2        | 1      | 0    | 3     | 1,3   |
| 2021  | 1      | 4      | 3        | 2      | 0    | 5     | 2,1   |
| 2022  | 0      | 1      | 0        | 1      | 0    | 1     | 0,4   |
| Total | 135    | 102    | 117      | 69     | 51   | 237   | 100,0 |
| %     | 57,0   | 43,0   | 49,4     | 29,1   | 21,5 | 100,0 |       |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Autres syndromes myéloprolifératifs chroniques  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 71,5 |
| Age médian  | 74,0 |
| Femmes      | 77,0 |
| Hommes      | 72,0 |
| Age maximal | 96   |
| Age minimal | 22   |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 135                   | 102                   | 117                   | 69                    | 51                    | 237                   |
| Taux bruts annuels*           | 0,73                  | 0,52                  | 0,66                  | 0,53                  | 0,67                  | 0,62                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,34<br>(0,15 - 0,53) | 0,24<br>(0,08 - 0,4)  | 0,34<br>(0,14 - 0,55) | 0,23<br>(0,05 - 0,42) | 0,26<br>(0,01 - 0,51) | 0,29<br>(0,11 - 0,46) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 0,71<br>(0,65 - 0,77) | 0,49<br>(0,44 - 0,54) | 0,69<br>(0,62 - 0,75) | 0,48<br>(0,42 - 0,54) | 0,59<br>(0,5 - 0,67)  | 0,59<br>(0,54 - 0,65) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 0,55<br>(0,49 - 0,62) | 0,37<br>(0,32 - 0,42) | 0,53<br>(0,47 - 0,59) | 0,37<br>(0,31 - 0,43) | 0,44<br>(0,36 - 0,53) | 0,46<br>(0,4 - 0,51)  |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010) \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |           |           |           |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans     | 5 ans     | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | 4,79                | 0,77 (79)                        | 0,74 (75) | 0,49 (48) | 0,29 (27) | 0,21 (10) |
| Hommes          | 3,96                | 0,85 (114)                       | 0,71 (96) | 0,43 (55) | 0,24 (25) | 0,12 (10) |
| Significativité | NS                  | NS                               | NS        | NS        | NS        | NS        |

Leucémie aiguë myéloïde promyélocytaire

Code ICDO : 98663


|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 1998  | 2      | 3      | 3        | 1      | 1    | 5     | 5,3   |
| 1999  | 0      | 1      | 0        | 1      | 0    | 1     | 1,1   |
| 2000  | 3      | 1      | 0        | 3      | 1    | 4     | 4,3   |
| 2001  | 1      | 2      | 1        | 2      | 0    | 3     | 3,2   |
| 2002  | 1      | 0      | 1        | 0      | 0    | 1     | 1,1   |
| 2003  | 3      | 0      | 1        | 2      | 0    | 3     | 3,2   |
| 2004  | 1      | 0      | 0        | 1      | 0    | 1     | 1,1   |
| 2005  | 1      | 1      | 2        | 0      | 0    | 2     | 2,1   |
| 2006  | 1      | 1      | 1        | 0      | 1    | 2     | 2,1   |
| 2007  | 2      | 2      | 2        | 0      | 2    | 4     | 4,3   |
| 2008  | 1      | 2      | 1        | 0      | 2    | 3     | 3,2   |
| 2009  | 2      | 2      | 1        | 3      | 0    | 4     | 4,3   |
| 2010  | 3      | 1      | 1        | 2      | 1    | 4     | 4,3   |
| 2011  | 1      | 5      | 1        | 3      | 2    | 6     | 6,4   |
| 2012  | 2      | 0      | 1        | 1      | 0    | 2     | 2,1   |
| 2013  | 3      | 0      | 1        | 2      | 0    | 3     | 3,2   |
| 2014  | 2      | 1      | 2        | 0      | 1    | 3     | 3,2   |
| 2015  | 4      | 3      | 4        | 1      | 2    | 7     | 7,4   |
| 2016  | 4      | 2      | 5        | 1      | 0    | 6     | 6,4   |
| 2017  | 3      | 0      | 3        | 0      | 0    | 3     | 3,2   |
| 2018  | 2      | 5      | 3        | 1      | 3    | 7     | 7,4   |
| 2019  | 2      | 1      | 1        | 2      | 0    | 3     | 3,2   |
| 2020  | 3      | 2      | 2        | 2      | 1    | 5     | 5,3   |
| 2021  | 2      | 5      | 2        | 3      | 2    | 7     | 7,4   |
| 2022  | 1      | 4      | 3        | 1      | 1    | 5     | 5,3   |
| Total | 50     | 44     | 42       | 32     | 20   | 94    | 100,0 |
| %     | 53,2   | 46,8   | 44,7     | 34,0   | 21,3 | 100,0 |       |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Leucémie aiguë myéloïde promyélocytaire parmi l'ensemble des HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




0,4%

|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 51,8 |
| Age médian  | 55,5 |
| Femmes      | 54,5 |
| Hommes      | 57,0 |
| Age maximal | 84   |
| Age minimal | 1    |

|                            | Hommes             | Femmes             | Calvados           | Manche             | Orne              | Total              |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nombre de patients         | 50                 | 44                 | 42                 | 32                 | 20                | 94                 |
| Taux bruts annuels*        | 0,27               | 0,22               | 0,24               | 0,25               | 0,26              | 0,25               |
| Taux standardisés**        |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
| pop mondiale (IC 0,95)     | 0,21 (0,02 - 0,4)  | 0,18 (0,01 - 0,35) | 0,19 (0 - 0,38)    | 0,20 (0 - 0,44)    | 0,19 (0 - 0,47)   | 0,19 (0,01 - 0,38) |
| pop Europe Ouest (IC 0,95) | 0,27 (0,23 - 0,31) | 0,23 (0,2 - 0,27)  | 0,25 (0,21 - 0,29) | 0,25 (0,21 - 0,29) | 0,25 (0,2 - 0,31) | 0,25 (0,21 - 0,29) |
| pop USA (IC 0,95)          | 0,25 (0,21 - 0,3)  | 0,21 (0,17 - 0,25) | 0,23 (0,18 - 0,27) | 0,24 (0,18 - 0,29) | 0,24 (0,17 - 0,3) | 0,23 (0,19 - 0,28) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010) \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane (années) | Probabilité de survie (Effectif) |           |           |           |          |
|-----------------|------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|                 |                  | 1 an                             | 2 ans     | 5 ans     | 10 ans    | 15 ans   |
| Femmes          | > 15 ans         | 0,89 (39)                        | 0,86 (34) | 0,75 (23) | 0,64 (15) | 0,63 (7) |
| Hommes          | > 15 ans         | 0,8 (40)                         | 0,8 (39)  | 0,69 (31) | 0,65 (17) | 0,56 (9) |
| Significativité |                  | NS                               | NS        | NS        | NS        | NS       |

# Mastocytose

Codes ICDO : 97403, 97413, 97423

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 1      | 0      | 1        | 0      | 0    | 1     | 3,3   |
| 1998  | 1      | 0      | 1        | 0      | 0    | 1     | 3,3   |
| 1999  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 2000  | 1      | 1      | 1        | 1      | 0    | 2     | 6,7   |
| 2001  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 2002  | 1      | 2      | 2        | 0      | 1    | 3     | 10,0  |
| 2003  | 0      | 1      | 1        | 0      | 0    | 1     | 3,3   |
| 2004  | 1      | 0      | 1        | 0      | 0    | 1     | 3,3   |
| 2005  | 0      | 3      | 2        | 0      | 1    | 3     | 10,0  |
| 2006  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 2007  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 2008  | 0      | 1      | 1        | 0      | 0    | 1     | 3,3   |
| 2009  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 2010  | 1      | 0      | 0        | 1      | 0    | 1     | 3,3   |
| 2011  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 2012  | 1      | 0      | 0        | 1      | 0    | 1     | 3,3   |
| 2013  | 1      | 0      | 1        | 0      | 0    | 1     | 3,3   |
| 2014  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 2015  | 3      | 2      | 4        | 0      | 1    | 5     | 16,7  |
| 2016  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 2017  | 0      | 2      | 1        | 0      | 1    | 2     | 6,7   |
| 2018  | 3      | 0      | 2        | 1      | 0    | 3     | 10,0  |
| 2019  | 1      | 0      | 0        | 1      | 0    | 1     | 3,3   |
| 2020  | 2      | 0      | 1        | 1      | 0    | 2     | 6,7   |
| 2021  | 1      | 0      | 0        | 0      | 1    | 1     | 3,3   |
| 2022  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| Total | 18     | 12     | 19       | 6      | 5    | 30    | 100,0 |
| %     | 60,0   | 40,0   | 63,3     | 20,0   | 16,7 | 100,0 |       |

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Mastocytose  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)


Période d'incidence : 1997 - 2022

Tous âges au diag

Femmes et Hommes

Orne, Calvados, Manche

Extraction 12.02.2025



0,1%


|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 54,4 |
| Age médian  | 51,5 |
| Femmes      | 47,5 |
| Hommes      | 58,5 |
| Age maximal | 88   |
| Age minimal | 18   |

|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Nombre de patients            | 18                    | 12                    | 19                    | 6                     | 5                     | 30                   |
| Taux bruts annuels*           | 0,10                  | 0,06                  | 0,11                  | 0,05                  | 0,07                  | 0,08                 |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                      |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,06<br>(0 - 0,15)    | 0,06<br>(0 - 0,16)    | 0,08<br>(0 - 0,2)     | 0,03<br>(0 - 0,12)    | 0,05<br>(0 - 0,18)    | 0,06<br>(0 - 0,16)   |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 0,10<br>(0,07 - 0,12) | 0,07<br>(0,05 - 0,08) | 0,11<br>(0,09 - 0,14) | 0,05<br>(0,03 - 0,06) | 0,07<br>(0,04 - 0,11) | 0,08<br>(0,06 - 0,1) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 0,08<br>(0,06 - 0,11) | 0,07<br>(0,04 - 0,09) | 0,10<br>(0,07 - 0,13) | 0,04<br>(0,02 - 0,06) | 0,06<br>(0,03 - 0,1)  | 0,07<br>(0,05 - 0,1) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)

\*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |           |           |          |          |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans     | 5 ans     | 10 ans   | 15 ans   |
| Femmes          | > 15 ans            | 0,88 (11)                        | 0,83 (10) | 0,83 (10) | 0,73 (5) | 0,73 (5) |
| Hommes          | 3,84                | 0,72 (13)                        | 0,63 (12) | 0,49 (8)  | 0,49 (4) | 0,49 (2) |
| Significativité |                     | NS                               | NS        | p<0,01    | p<0,01   | p<0,01   |

# Total hémopathies myéloïdes (/3)

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne  | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------|-------|-------|
| 1997  | 129    | 115    | 96       | 94     | 54    | 244   | 2,7   |
| 1998  | 124    | 116    | 125      | 77     | 38    | 240   | 2,6   |
| 1999  | 143    | 137    | 134      | 96     | 50    | 280   | 3,1   |
| 2000  | 112    | 122    | 101      | 88     | 45    | 234   | 2,6   |
| 2001  | 127    | 133    | 96       | 112    | 52    | 260   | 2,9   |
| 2002  | 130    | 106    | 103      | 89     | 44    | 236   | 2,6   |
| 2003  | 154    | 131    | 123      | 93     | 69    | 285   | 3,1   |
| 2004  | 137    | 126    | 109      | 95     | 59    | 263   | 2,9   |
| 2005  | 148    | 138    | 151      | 78     | 57    | 286   | 3,1   |
| 2006  | 161    | 154    | 148      | 95     | 72    | 315   | 3,5   |
| 2007  | 159    | 162    | 151      | 113    | 57    | 321   | 3,5   |
| 2008  | 177    | 170    | 149      | 107    | 91    | 347   | 3,8   |
| 2009  | 184    | 195    | 165      | 124    | 90    | 379   | 4,2   |
| 2010  | 222    | 192    | 170      | 146    | 98    | 414   | 4,6   |
| 2011  | 189    | 198    | 174      | 123    | 90    | 387   | 4,3   |
| 2012  | 247    | 203    | 218      | 117    | 115   | 450   | 4,9   |
| 2013  | 190    | 222    | 172      | 142    | 98    | 412   | 4,5   |
| 2014  | 213    | 199    | 201      | 129    | 82    | 412   | 4,5   |
| 2015  | 222    | 173    | 173      | 159    | 63    | 395   | 4,3   |
| 2016  | 246    | 208    | 192      | 169    | 93    | 454   | 5,0   |
| 2017  | 185    | 195    | 171      | 137    | 72    | 380   | 4,2   |
| 2018  | 213    | 195    | 206      | 135    | 67    | 408   | 4,5   |
| 2019  | 250    | 193    | 193      | 157    | 93    | 443   | 4,9   |
| 2020  | 228    | 162    | 188      | 143    | 59    | 390   | 4,3   |
| 2021  | 224    | 196    | 198      | 147    | 75    | 420   | 4,6   |
| 2022  | 249    | 190    | 210      | 150    | 79    | 439   | 4,8   |
| Total | 4 763  | 4 331  | 4 117    | 3 115  | 1 862 | 9 094 | 100,0 |
| %     | 52,4   | 47,6   | 45,3     | 34,3   | 20,5  | 100,0 |       |

Proportion de Total hémopathies myéloïdes (/3)  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 71,7 |
| Age médian  | 75,0 |
| Femmes      | 76,0 |
| Hommes      | 74,0 |
| Age maximal | 103  |
| Age minimal | 0    |


|                               | Hommes                   | Femmes                   | Calvados                 | Manche                   | Orne                    | Total                    |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Nombre de patients            | 4 763                    | 4 331                    | 4 117                    | 3 115                    | 1 862                   | 9 094                    |
| Taux bruts annuels*           | 25,66                    | 21,93                    | 23,18                    | 24,02                    | 24,56                   | 23,74                    |
| Taux standardisés**           |                          |                          |                          |                          |                         |                          |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 11,96<br>(10,81 - 13,11) | 10,20<br>(9,14 - 11,26)  | 11,74<br>(10,53 - 12,95) | 10,54<br>(9,23 - 11,86)  | 10,44<br>(8,75 - 12,12) | 11,04<br>(9,93 - 12,14)  |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 24,51<br>(24,16 - 24,85) | 20,66<br>(20,35 - 20,97) | 23,96<br>(23,59 - 24,33) | 21,36<br>(20,98 - 21,74) | 21,61<br>(21,1 - 22,11) | 22,51<br>(22,19 - 22,84) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 19,13<br>(18,77 - 19,48) | 15,85<br>(15,54 - 16,17) | 18,40<br>(18,03 - 18,77) | 16,47<br>(16,08 - 16,86) | 16,59<br>(16,08 - 17,1) | 17,32<br>(16,99 - 17,65) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010) \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale



Répartition par tranches d'âges au diagnostic



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |             |             |            |            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans       | 5 ans       | 10 ans     | 15 ans     |
| Femmes          | 5,00                | 0,76 (3267)                      | 0,66 (2774) | 0,5 (1840)  | 0,33 (911) | 0,22 (396) |
| Hommes          | 3,59                | 0,74 (3484)                      | 0,62 (2858) | 0,41 (1653) | 0,24 (700) | 0,16 (285) |
| Significativité | p<0,001             | p<0,05                           | p<0,001     | p<0,001     | NS         | NS         |


Total autres hémopathies (/3)

Codes ICDO : 97273, 97503, 97513, 97543, 97553, 97563, 97573, 97583, 97593, 98053, 98063, 98073, 98083, 98093, 99653, 99663, 99673

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne | Total | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|------|-------|-------|
| 1997  | 0      | 1      | 1        | 0      | 0    | 1     | 0,9   |
| 1998  | 3      | 3      | 2        | 2      | 2    | 6     | 5,1   |
| 1999  | 2      | 1      | 3        | 0      | 0    | 3     | 2,6   |
| 2000  | 3      | 1      | 0        | 3      | 1    | 4     | 3,4   |
| 2001  | 2      | 1      | 2        | 1      | 0    | 3     | 2,6   |
| 2002  | 1      | 1      | 0        | 2      | 0    | 2     | 1,7   |
| 2003  | 2      | 3      | 2        | 1      | 2    | 5     | 4,3   |
| 2004  | 1      | 3      | 4        | 0      | 0    | 4     | 3,4   |
| 2005  | 1      | 2      | 3        | 0      | 0    | 3     | 2,6   |
| 2006  | 1      | 1      | 1        | 1      | 0    | 2     | 1,7   |
| 2007  | 4      | 0      | 4        | 0      | 0    | 4     | 3,4   |
| 2008  | 5      | 6      | 7        | 3      | 1    | 11    | 9,4   |
| 2009  | 0      | 0      | 0        | 0      | 0    | 0     | 0,0   |
| 2010  | 3      | 1      | 2        | 0      | 2    | 4     | 3,4   |
| 2011  | 2      | 0      | 2        | 0      | 0    | 2     | 1,7   |
| 2012  | 2      | 4      | 3        | 2      | 1    | 6     | 5,1   |
| 2013  | 2      | 4      | 5        | 1      | 0    | 6     | 5,1   |
| 2014  | 3      | 1      | 4        | 0      | 0    | 4     | 3,4   |
| 2015  | 3      | 1      | 3        | 0      | 1    | 4     | 3,4   |
| 2016  | 5      | 4      | 8        | 0      | 1    | 9     | 7,7   |
| 2017  | 5      | 2      | 1        | 4      | 2    | 7     | 6,0   |
| 2018  | 3      | 0      | 1        | 2      | 0    | 3     | 2,6   |
| 2019  | 1      | 1      | 1        | 1      | 0    | 2     | 1,7   |
| 2020  | 4      | 3      | 4        | 1      | 2    | 7     | 6,0   |
| 2021  | 3      | 1      | 3        | 1      | 0    | 4     | 3,4   |
| 2022  | 6      | 5      | 5        | 3      | 3    | 11    | 9,4   |
| Total | 67     | 50     | 71       | 28     | 18   | 117   | 100,0 |
| %     | 57,3   | 42,7   | 60,7     | 23,9   | 15,4 | 100,0 |       |

Proportion de Total autres hémopathies (/3)  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025




0,5%

|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 41,2 |
| Age médian  | 42,0 |
| Femmes      | 38,5 |
| Hommes      | 47,0 |
| Age maximal | 92   |
| Age minimal | 0    |


|                               | Hommes                | Femmes                | Calvados              | Manche                | Orne                  | Total                 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nombre de patients            | 67                    | 50                    | 71                    | 28                    | 18                    | 117                   |
| Taux bruts annuels*           | 0,36                  | 0,25                  | 0,40                  | 0,22                  | 0,24                  | 0,31                  |
| Taux standardisés**           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 0,33<br>(0,06 - 0,61) | 0,27<br>(0,02 - 0,51) | 0,39<br>(0,09 - 0,69) | 0,21<br>(0 - 0,49)    | 0,25<br>(0 - 0,63)    | 0,30<br>(0,04 - 0,56) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 0,35<br>(0,31 - 0,39) | 0,25<br>(0,22 - 0,29) | 0,40<br>(0,36 - 0,45) | 0,20<br>(0,16 - 0,24) | 0,24<br>(0,18 - 0,3)  | 0,30<br>(0,26 - 0,34) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 0,33<br>(0,28 - 0,38) | 0,25<br>(0,21 - 0,3)  | 0,39<br>(0,33 - 0,45) | 0,20<br>(0,15 - 0,24) | 0,24<br>(0,17 - 0,31) | 0,29<br>(0,24 - 0,34) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Probabilité de survie globale




| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |           |           |           |           |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans     | 5 ans     | 10 ans    | 15 ans    |
| Femmes          | 11,18               | 0,72 (36)                        | 0,62 (27) | 0,56 (24) | 0,52 (18) | 0,49 (10) |
| Hommes          | 2,34                | 0,63 (43)                        | 0,51 (33) | 0,46 (25) | 0,44 (18) | 0,41 (11) |
| Significativité | NS                  | NS                               | p<0,05    | p<0,05    | NS        | NS        |

Total /3

|       | Hommes | Femmes | Calvados | Manche | Orne  | Total  | %     |
|-------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 1997  | 380    | 324    | 324      | 253    | 127   | 704    | 2,7   |
| 1998  | 404    | 329    | 336      | 255    | 142   | 733    | 2,9   |
| 1999  | 450    | 350    | 370      | 274    | 156   | 800    | 3,1   |
| 2000  | 407    | 348    | 331      | 282    | 142   | 755    | 2,9   |
| 2001  | 395    | 372    | 311      | 304    | 152   | 767    | 3,0   |
| 2002  | 427    | 330    | 332      | 275    | 150   | 757    | 3,0   |
| 2003  | 445    | 386    | 358      | 297    | 176   | 831    | 3,2   |
| 2004  | 467    | 364    | 369      | 311    | 151   | 831    | 3,2   |
| 2005  | 431    | 383    | 390      | 250    | 174   | 814    | 3,2   |
| 2006  | 483    | 410    | 418      | 282    | 193   | 893    | 3,5   |
| 2007  | 480    | 431    | 416      | 320    | 175   | 911    | 3,6   |
| 2008  | 512    | 505    | 456      | 331    | 230   | 1 017  | 4,0   |
| 2009  | 547    | 486    | 467      | 368    | 198   | 1 033  | 4,0   |
| 2010  | 573    | 511    | 456      | 403    | 225   | 1 084  | 4,2   |
| 2011  | 564    | 505    | 482      | 378    | 209   | 1 069  | 4,2   |
| 2012  | 629    | 481    | 522      | 350    | 238   | 1 110  | 4,3   |
| 2013  | 553    | 541    | 460      | 376    | 258   | 1 094  | 4,3   |
| 2014  | 591    | 489    | 485      | 381    | 214   | 1 080  | 4,2   |
| 2015  | 645    | 475    | 511      | 391    | 218   | 1 120  | 4,4   |
| 2016  | 652    | 524    | 543      | 386    | 247   | 1 176  | 4,6   |
| 2017  | 590    | 513    | 499      | 378    | 226   | 1 103  | 4,3   |
| 2018  | 607    | 468    | 538      | 341    | 196   | 1 075  | 4,2   |
| 2019  | 692    | 534    | 560      | 419    | 247   | 1 226  | 4,8   |
| 2020  | 691    | 510    | 559      | 424    | 218   | 1 201  | 4,7   |
| 2021  | 686    | 532    | 572      | 422    | 224   | 1 218  | 4,8   |
| 2022  | 685    | 515    | 558      | 399    | 243   | 1 200  | 4,7   |
| Total | 13 986 | 11 616 | 11 623   | 8 850  | 5 129 | 25 602 | 100,0 |
| %     | 54,6   | 45,4   | 45,4     | 34,6   | 20,0  | 100,0  |       |


Répartition par tranches d'âges au diagnostic



Proportion de Total /3  
parmi l'ensemble des  
HM Comportement tumoral 3 et LGL (N=25602)

Période d'incidence : 1997 - 2022  
Tous âges au diag  
Femmes et Hommes  
Orne, Calvados, Manche  
Extraction 12.02.2025

100,0  
%




|             |      |
|-------------|------|
| Age moyen   | 68,4 |
| Age médian  | 72,0 |
| Femmes      | 73,0 |
| Hommes      | 71,0 |
| Age maximal | 108  |
| Age minimal | 0    |

|                               | Hommes                   | Femmes                   | Calvados                 | Manche                   | Orne                     | Total                    |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nombre de patients            | 13 986                   | 11 616                   | 11 623                   | 8 850                    | 5 129                    | 25 602                   |
| Taux bruts annuels*           | 75,35                    | 58,82                    | 65,44                    | 68,25                    | 67,64                    | 66,83                    |
| Taux standardisés**           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| pop mondiale<br>(IC 0,95)     | 39,21<br>(36,97 - 41,44) | 30,46<br>(28,51 - 32,41) | 36,44<br>(34,19 - 38,68) | 33,92<br>(31,37 - 36,47) | 32,73<br>(29,51 - 35,95) | 34,72<br>(32,63 - 36,82) |
| pop Europe Ouest<br>(IC 0,95) | 73,21<br>(72,61 - 73,81) | 56,18<br>(55,67 - 56,7)  | 68,01<br>(67,38 - 68,64) | 62,27<br>(61,61 - 62,93) | 60,93<br>(60,08 - 61,78) | 64,38<br>(63,83 - 64,94) |
| pop USA<br>(IC 0,95)          | 58,53<br>(57,9 - 59,16)  | 44,53<br>(43,99 - 45,06) | 53,76<br>(53,12 - 54,4)  | 49,56<br>(48,87 - 50,26) | 48,37<br>(47,48 - 49,26) | 51,07<br>(50,49 - 51,65) |

\* Taux pour 100 000 habitants âgés de 0 à 108 ans (Pop INSEE 2010)      \*\* Standardisation directe sur population OMS 2010

Probabilité de survie globale



| Survie          | Médiane<br>(années) | Probabilité de survie (Effectif) |             |             |             |             |
|-----------------|---------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                     | 1 an                             | 2 ans       | 5 ans       | 10 ans      | 15 ans      |
| Femmes          | 6,66                | 0,8 (9195)                       | 0,72 (8026) | 0,56 (5553) | 0,4 (2927)  | 0,29 (1374) |
| Hommes          | 5,37                | 0,79 (10946)                     | 0,69 (9335) | 0,52 (6081) | 0,34 (2877) | 0,24 (1336) |
| Significativité | p<0,001             | NS                               | p<0,001     | p<0,001     | p<0,001     | p<0,001     |