

Lösungen für Probeklausuren

July 12, 2018


Contents

1	ProbeKlausur Muster SS17	3
1.1	Aufgabe 1	3
1.1.1	a	3
1.1.2	b	3
1.1.3	c	3
1.1.4	d	3
1.1.5	e	3
1.2	Aufgabe 2	3
1.2.1	a	3
1.2.2	b	4
1.2.3	c	4
1.2.4	d	5
1.2.5	Aufgabe 3	6
1.2.6	Aufgabe 4	7
1.2.7	Aufgabe 5	7
1.3	Prüfungs SS17	9
1.3.1	Aufgabe 1	9
1.3.2	Aufgabe 2	9
1.3.3	Aufgabe 3	10
1.3.4	Aufgabe 4	11

1 ProbeKlausur Muster SS17

1.1 Aufgabe 1

1.1.1 a



1.1.2 b

$$x_1 = 1,07449, x_2 = 8,06836$$

1.1.3 c

$$x_1 = 0,590907, x_2 = 8,55195$$

1.1.4 d

$$x_1 = 1,00744, x_2 = 8,13541$$


1.1.5 e

$$p(C_1|x) : x_1 = 0,8805, x_2 = 8.26236$$

$$p(C_2|x) : x_1 = 1,2799, x_2 = 7,8629$$

1.2 Aufgabe 2

1.2.1 a




1.2.2 b

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} -3.5 \\ -3 \end{pmatrix} \quad \mu_2 = \begin{pmatrix} 3.5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$S_w = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$w^* = \begin{pmatrix} 4 \\ -9 \end{pmatrix} \quad w_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



1.2.3 c

$$w^* = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{8}{27} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \quad w_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

1.2.4 d


$$w^* \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - w_0$$

$$\text{Fischer:} = -1$$

$$\text{KLQ:} = -\frac{2}{277}$$

1.2.5 Aufgabe 3


• a:



• b:

$$w(1) = \begin{pmatrix} 4.1 \\ -1.3 \\ -0.7 \end{pmatrix}$$

$$w(2) = \begin{pmatrix} 4.2 \\ -1.1 \\ -0.4 \end{pmatrix}$$




• c: Der Algorithmus endet sobald alle Punkte richtig Klassifiziert werden. Die Schrittweite bestimmt dabei wie schnell/langsam sich die Gerade im Raum bewegt. Bei einer zu großen Schrittweite kann unter Umständen

keine richtige Klassifizierung gefunden werden. Wird die Schrittweite zu klein gewählt so dauert die Berechnung unnötig lang.

- d: $w(2)^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = -\frac{7}{10}$
 $\text{sig}(-\frac{7}{10})$ ist negativ deswegen würde der Punkt auf – Klassifiziert werden.

1.2.6 Aufgabe 4

- a:



- b:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-\frac{2\pi}{3}$	-1.366	-1.866	-3.59	-2.37	-5.83	-3.37
$-\frac{\pi}{3}$	-0.366	0.134	-1.59	0.63	-2.83	1.63
0	1	2	2	3	3	5
$\frac{\pi}{3}$	1.366	1.866	3.59	2.37	5.83	3.37
$\frac{2\pi}{3}$	0.366	-0.134	1.59	-0.63	2.83	-1.63


- c: Dadurch das sich die Funktionen an einem Punkt schneiden um Beispiel (0,3). Dieser Punkt entspricht der Geraden mit der Steigung 0 zwischen den Punkten 4 und 5.
- d: Durch numerische Abweichung kann der Schnitt der Funktionen nicht an genau einem Punkt sein. Auch können mögliche Geraden durch die gewählten Abtastabstände nicht erkannt werden

1.2.7 Aufgabe 5


- a

- $a1 = \sqrt{5}$
- $a2 = 3$
- $a3 = \sqrt{5}$

• b



• c d_{max}




• d: 1 und zweiter Punkt tauschen

1.3 Prüfungs SS17

1.3.1 Aufgabe 1


- a:



- b: $x = \frac{1}{2}$
- c: $x \approx 0.38448$. Das Merkmal $x = 0.3$ wird nach C_1 klassifiziert.
- d: $x \approx 0.4574$
- e: $x_1 \approx 0.3844, x_2 \approx 0.6155$

1.3.2 Aufgabe 2

- a




- b

$$\mu_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \mu_2 = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S_w = \begin{pmatrix} 10 & -4 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$w^* = \begin{pmatrix} 6 \\ 12\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad w_0 = 85.75$$



- c

Aufgabe c:

1.3.3 Aufgabe 3

- a: $X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 6 & 8 \\ 3 & 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$


$$t = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$w = -\frac{1}{5}x + 7 \quad w = \begin{pmatrix} 7 \\ -\frac{1}{5} \\ -1 \end{pmatrix}$$

- b: $w(1) = \begin{pmatrix} 6.9 \\ -\frac{1}{2} \\ -1.3 \end{pmatrix}$

$$\text{normiert: } w(1) = \begin{pmatrix} \frac{69}{13} \\ -\frac{2}{13} \\ -1 \end{pmatrix}$$


Die Gerade klassifiziert jedoch alle Punkte falsch. Wenn $w(1)$ mit minus 1 multipliziert wird, dreht sich die Klassifizierung.



- c: wenn wir den Vektor mit -1 multiplizieren ja. Wenn nicht nein.
- d:


1.3.4 Aufgabe 4

- a:



- b:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$-\pi/2$	-2	-3	-4	-6	-2	-2
$-\pi/4$	0	0.7071	0	-1.414	3.5355	5.6569
0	2	3	4	6	2	2
$\pi/4$	2.8284	4.9497	5.6569	7.0711	6.3640	8.4853
$\pi/2$	2	3	4	6	2	2



- c:
- d: Das nur die Geraden erkannt werden welche in der Abtastung enthalten sind.