

Wir haben eine DGL + Anfangswert gegeben. Ist die DGL nicht in expliziter Form gegeben, also ist y' nicht freigestellt, so können wir sie nicht ohne weiteres lösen.

Ist sie in expliziter Form gegeben, also in der Form $y'(x) = f(x, y(x))$.

Mitschrift Fortsetzung vom 06.06.2023

[D]

Wenn nicht der Form $y'(x) = p(x) \cdot y + g(x)$, dann untersuchen wir, ob die DGL in einer speziellen Form vorliegt.

Liegt eine Bernoulli DGL vor?

$$\begin{aligned}y'(x) + f(x) \cdot y(x) &= g(x) \cdot y^\alpha \\y'(x) + p(x) \cdot y(x) &= q(x) \cdot y(x)^\alpha\end{aligned}$$

Wenn ja:

$$\begin{aligned}z(x) &= y(x)^{1-\alpha} \\z'(x) &= \underbrace{(1-\alpha) \cdot p(x)}_{=\tilde{p}} \cdot z(x) + \underbrace{(1-\alpha) \cdot q(x)}_{=\tilde{q}}\end{aligned}$$

Wir erhalten die Form wie [C.1] und lösen entsprechend.

Beispiel:

$$(1+x) \cdot y' + y = -(1+x)^2 \cdot y^4, \quad y(0) = 1$$

Um zu erkennen, dass es sich um eine Bernoulli DGL handelt, formen wir wie folgt um:

$$\begin{aligned}(1+x) \cdot y' + y &= -(1+x)^2 \cdot y^4 \\ \Leftrightarrow y' &= \frac{-y}{1+x} - \frac{(1+x)^2}{1+x} \cdot y^4, \quad x \neq -1 \\ \Leftrightarrow y' &= \underbrace{\frac{-1}{1+x}}_{p(x)} \cdot y - \underbrace{\frac{(1+x)^2}{1+x}}_{q(x)} \cdot y^4, \quad \alpha = 4\end{aligned}$$

Substituiere: $z(x) = y(x)^{1-\alpha} = y(x)^{-3}$

$$\begin{aligned}z'(x) &= (1-\alpha) \cdot p(x) \cdot z(x) + (1-\alpha) \cdot q(x) \\ &= -3\left(\frac{-1}{1+x}z(x) + 3(1+x)\right), \quad z(0) = y(0)^{-3} = 1\end{aligned}$$

Mit

$$\begin{aligned} P(x) &= \int_0^x p(\tau) \, d\tau \\ &= \int_0^x \frac{3}{1+\tau} \, d\tau \\ &= 3 \ln(1+x) - 0 \\ &= 3 \ln(1+x) \end{aligned}$$

bestimmen wir:

$$\begin{aligned} z_h(x) &= 1 \cdot e^{P(x)} \\ &= 1 \cdot e^{\ln(1+x)^3} \\ &= (1+x)^3 \end{aligned}$$

Die Bestimmung der homogenen Lösung z_h , weicht am Standort Aachen dadurch ab, dass wir $f(x) = -p(x)$ setzen. Ansonsten sind die Verfahren gleich.

$$\begin{aligned} z_h'(x) + f(x) \cdot z(x) &= 0 \\ z_h'(x) - \frac{3}{1+x} \cdot z(x) &= 0 \\ z_h'(x) &= \frac{3}{1+x} z(x) \\ \int \frac{1}{z} \, dz &= \int \frac{3}{1+x} \, dx \\ \ln(z_h) &= \int \frac{3}{1+x} \, dx \\ z_h(x) &= e^{\int \frac{3}{1+x} \, dx} \\ &= e^{3 \ln(1+x) + \tilde{c}} \\ &= c \cdot e^{\ln((1+x)^3)} \\ &= c \cdot (1+x)^3 \\ z_h(0) &= c \cdot 1 \Leftrightarrow c = 1 \\ z_h(x) &= (1+x)^3 \end{aligned}$$

Zur Bestimmung der partikulären Lösung. Dies lässt sich auch mit Ansatz vom Typ der

rechten Seite machen. Wir wählen jedoch Variation der Konstanten:

$$\begin{aligned} z_p(x) &= e^{P(x)} \cdot c(x) \\ &= e^{P(x)} \cdot \int_0^x q(\tau) e^{-P(\tau)} d\tau \\ &= (1+x)^3 \int_0^x 3(1+\tau) e^{-\ln((1+\tau)^3)} d\tau \\ &= (1+x)^3 \int_0^x 3(1+\tau) e^{\ln \frac{1}{(1+\tau)^3}} d\tau \\ &= (1+x)^3 \int_0^x 3(1+\tau) \frac{1}{(1+\tau)^3} d\tau \\ &= (1+x)^3 \int_0^x \frac{3}{(1+\tau)^2} d\tau \\ &= (1+x)^3 \left[-\frac{1}{1+\tau} \right]_0^x \\ &= -3(1+x)^2 + 3(1+x)^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z(x) &= z_h(x) + z_p(x) \\ &= (1+x)^3 - 3(1+x)^2 + 3(1+x)^3 \\ &= 4(1+x)^3 - 3(1+x)^2 \end{aligned}$$

Rücksubstitution:

$$\begin{aligned} y(x) &= \frac{1}{\sqrt[3]{z(x)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt[3]{4(1+x)^3 - 3(1+x)^2}} \end{aligned}$$

[E]

Ist die DGL in der Form?

$$P(x,y) + Q(x,y) \cdot y' = 0$$

Wenn ja, ist die Integrabilitätsbedingung erfüllt?

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x,y) \stackrel{?}{=} \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y)$$

Beispiel:

$$x^2 - y = (x + \sin^2(y)) \cdot y'$$

Wir stellen um, damit sich diese Form ergibt:

$$\Leftrightarrow \underbrace{(x^2 - y)}_{P(x,y)} + \underbrace{(-(x + \sin^2(y)))}_{Q(x,y)} \cdot y' = 0$$

Integrabilitätsbedingung erfüllt?

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x,y) = -1$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) = -1$$

\Rightarrow Ja, Integrabilitätsbedingung erfüllt.

$$\begin{aligned} F(x,y) &= \int P(x,y) \, dx = \int x^2 - y \, dx \\ &= \frac{x^3}{3} - yx + c_1(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(x,y) &= \int Q(x,y) \, dy = \int -x - \sin^2(y) \, dy \\ &= -yx - \frac{1}{2}y + \frac{1}{y} \sin(2y) + c_2(x) \end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich gibt uns die Potentialfunktion $F(x,y)$

$$F(x,y) = \frac{x^3}{3} - xy - \frac{1}{2}y + \frac{1}{y} \sin(2y) = c$$

In Aachen setzen wir üblicherweise $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} \stackrel{!}{=} Q(x,y)$ gleich und lösen dann die Gleichung nach $c_1 * y'$ auf.

[F]

Oder in der Form?

$$P(x,y) + Q(x,y) \cdot y' = f(x)$$

Beispiel:

$$\underbrace{y}_{P(x,y)} - \underbrace{(2x + y)}_{Q(x,y)} \cdot y' = 0$$

Integrabilitätsbedingung:

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x,y) = 1$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) = -2$$

Nein, ist nicht erfüllt. -> Finde den integrierenden Faktor:

$$\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} = 3$$

Versuche:

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{P} = \frac{3}{y} =: g(y)$$

Suche nach einer Funktion in Abhängigkeit von y .

$$\mu(y) = e^{-\int g(y) dy} = e^{-3 \ln y} = \frac{1}{y^3}$$

$$\begin{aligned} & y - (2x + y) \cdot y' = 0 \\ \Rightarrow & \underbrace{\frac{1}{y^2}}_{P(x,y)} - \underbrace{\left(\frac{2x}{y^3} + \frac{1}{y^2}\right)}_{Q(x,y)} = 0 \end{aligned}$$

Neue Integrabilitätsbedingung:

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y}(x,y) &= -\frac{2}{y^3} \\ \frac{\partial Q}{\partial x}(x,y) &= -\frac{2}{y^3}\end{aligned}$$

IB ist nun erfüllt.

$$\begin{aligned}F(x,y) &= \int \frac{1}{y^2} dx = \frac{x}{y^2} + c_1(y) + 0 \\ F(x,y) &= \int -\frac{2}{y^3} - \frac{1}{y^2} dy = \frac{x}{y^2} + \frac{1}{y} + c_2(x)\end{aligned}$$

Koeffizientenvergleich liefert

$$F(x,y) = \frac{x}{y^2} + \frac{1}{y} = c$$

Können wir nach y freistellen? Nein, also fertig.

DGLs 2. Ordnung

[2.A]

Homogene DGL 2. Ordnung. (für inhomogene DGLs 2. Ordnung ist auch eine Lösung mit Variation der Konstanten möglich).

$$y'' + ay' + by = 0 \quad y(\zeta) = \eta_1, y'(\zeta) = \eta_2$$

Ansatz: $y(x) = e^{\lambda x}$.

$$\begin{aligned}\lambda^2 e^{\lambda x} + a\lambda e^{\lambda x} + b e^{\lambda x} &= 0 \\ \Leftrightarrow e^{\lambda x} \cdot \underbrace{(\lambda^2 + a\lambda + b)}_{=0} &= 0\end{aligned}$$

charakteristische Gleichung

Entscheidung anhand der Diskriminanten der Charakteristischen Gleichung.

$$D = \frac{a^2}{4} - b \tag{1}$$

(2)

Analysis 2 Lösen von Differentialgleichungen

Wenn $D > 0$ haben wir zwei reelle Nullstellen, λ_1, λ_2 .

$$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$$

Wenn $D = 0$ haben wir eine reelle (doppelte) Nullstelle λ .

$$y(x) = c_1 e^{\lambda x} + c_2 \cdot x \cdot e^{\lambda x}$$

Wenn $D < 0$ liegen zwei komplexe Nullstellen vor. $\lambda_1 = w + iv$, $\lambda_2 = w - iv$

$$y(x) = e^{wx} \cdot (c_1 \cos(vx) + c_2 \sin(vx))$$