Ausgabe: 27.03.2023

Abgabe: 02.04.2023

Aufgabe 8

Gegeben sei die Abbildung $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ mit $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_3, 4x_2)$.

- a) Zeigen Sie, dass f linear ist.
- b) Bestimmen Sie den ker(f) und geben Sie die dim(ker(f)) an.
- c) Berechnen Sie die $\dim(Bild(f))$ bzw. rang(f) und bestimmen Sie das Bild(f).
- d) Ist die Abbildung f injektiv oder surjektiv?

Lösung 8a

Additivität:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_3, 4x_2)$$

$$f(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) = (x_1 + y_1 - 2(x_3 + y_3), 4(x_2 + y_2))$$

$$f(x_1, x_2, x_3) + f(y_1, y_2, y_3) = (x_1 - 2x_3, 4x_2) + (y_1 - 2y_3, 4y_2)$$

$$= (x_1 - 2x_3 + y_1 - 2y_3, 4x_2 + 4y_2)$$

$$= (x_1 + y_1 - 2(x_3 + y_3), 4(x_2 + y_2))$$

$$\Rightarrow f(x_1, x_2, x_3) + f(y_1, y_2, y_3) = f(x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3) \checkmark$$

Homogenität:

$$f(\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3) = (\lambda \cdot x_1 - 2 \cdot \lambda \cdot x_3, 4 \cdot \lambda \cdot x_2)$$

$$= (\lambda \cdot (x_1 - 2 \cdot x_3), 4 \cdot \lambda \cdot x_2)$$

$$\lambda f(x_1, x_2, x_3) = \lambda \cdot (x_1 - 2x_3, 4x_2)$$

$$= (\lambda \cdot (x_1 - 2x_3), 4 \cdot \lambda \cdot x_2)$$

$$\Rightarrow f(\lambda x_1, \lambda x_2) = \lambda f(x_1, x_2) \checkmark$$

Die Abbildung ist linear.