

Extremwertprobleme mit Nebenbedingung

Lagrange-Multiplikator

Extremstellen von Funktionen mit mehreren Veränderlichen

Stetigkeit

Taylorpolynom

Vektorfelder

Tangentialebenen, Richtungsableitungen

Gradient

$$\text{grad } (f(x, y)) = \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} f_x(x, y) \\ f_y(x, y) \end{pmatrix}$$

Tangentialebene

$$T(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0)$$

$$T(x, y) = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ f(x_0, y_0) \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x(x_0, y_0) \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

Richtungsableitung

$$D_{\vec{v}} (f(x_0, y_0)) = \frac{\partial f}{\partial \vec{v}} = \langle \nabla f, \vec{v} \rangle \quad \text{mit} \quad \|\vec{v}\| = 1$$

Normieren

$$\vec{v} = \frac{\vec{a}}{\|\vec{a}\|}$$

Richtung des steilsten Anstiegs

$$\vec{v}_{\max} = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|}$$

Wert der maximalen Steigung

$$D_{\vec{v}_{\max}}(f(x_0, y_0)) = \langle \nabla f, \vec{v}_{\max} \rangle = \|\nabla f(x_0, y_0)\|$$

Kurvenintegral, Potentialfunktion

Mehrdimensionale Integration

Polarkoordinaten

$$\iint f(x, y) \, d(x, y) = \iint f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \cdot r \, d(\varphi, r)$$

Kreisfläche: $A = \pi \cdot r^2$

Kugelkoordinaten

$$\iiint f(x, y, z) \, d(x, y, z) = \iiint f(r \cos \varphi \sin \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \theta) |r^2 \sin \theta| \, d(\theta, \varphi, r)$$

Kugelvolumen: $V = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3$

Schwerpunkte

Implizite Funktionen

Differenzialgleichungen und Anfangswertprobleme