Πολυώνυμα Βασικά

Κωνσταντίνος Λόλας

- ① Ορισμοί
- ② Μορφές
- ③ Πράξεις
- 4 Ρίζες
- ⑤ Παραγοντοποίηση
- ⑤ Πρόσημο

- Φισμοί
- ② Μορφές
- ③ Πράξεις
- 4 Ρίζες
- ⑤ Παραγοντοποίηση
- ⑤ Πρόσημο

- Φισμοί
- ② Μορφές
- ③ Πράξεις
- 4 Ρίζες
- ⑤ Παραγοντοποίηση
- Πρόσημο

- Φισμοί
- ② Μορφές
- ③ Πράξεις
- Φ Ρίζες
- ⑤ Παραγοντοποίηση
- Πρόσημο

- Φισμοί
- ② Μορφές
- ③ Πράξεις
- Φ Ρίζες
- Παραγοντοποίηση
- Πρόσημο

- Φισμοί
- ② Μορφές
- ③ Πράξεις
- Φ Ρίζες
- Παραγοντοποίηση
- 📵 Πρόσημο

Παλιά, Ξινά σταφύλλια

Μονώνυμο του x

Καλούμε μονώνυμο κάθε παράσταση της μορφής $\alpha\cdot x^{\nu}$, όπου $\alpha\in\mathbb{R}$ και $\nu\in\mathbb{N}$

Πολυώνυμο του x

Καλούμε πολυώνυμο κάθε παράσταση της μορφής

$$\alpha_{\nu}x^{\nu} + \alpha_{\nu-1}x^{\nu-1} + \dots + \alpha_1x + \alpha_0$$

με $\nu \in \mathbb{N}$ και $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $0 \le i \le \nu$

Παλιά, Ξινά σταφύλλια

Μονώνυμο του x

Καλούμε μονώνυμο κάθε παράσταση της μορφής $\alpha\cdot x^{\nu}$, όπου $\alpha\in\mathbb{R}$ και $\nu\in\mathbb{N}$

Πολυώνυμο του x

Καλούμε πολυώνυμο κάθε παράσταση της μορφής

$$\alpha_{\nu}x^{\nu} + \alpha_{\nu-1}x^{\nu-1} + \dots + \alpha_{1}x + \alpha_{0}$$

με
$$\nu \in \mathbb{N}$$
 και $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $0 \le i \le \nu$

Παλιά, Ξινά σταφύλλια

Ορισμοί στα πολυώνυμα

- Οροι: Τα μονώνυμα $\alpha_i x^i$, $0 \le i \le \nu$
- Συντελεστές: Οι πραγματικοί α_i , $0 \le i \le \nu$
- Σταθερός όρος: Το α_0
- ullet Σταθερό πολυώνυμο: το πολυώνυμο $lpha_0$
- ullet Μηδενικό πολυώνυμο: το πολυώνυμο με όλα τα $\alpha_i=0$, $0\leq i\leq
 u$
- Βαθμός πολυωνύμου: ο μεγαλύτερος εκθέτης από τους μη μηδενικούς όρους

Ισότητα

Ισότητα Πολυωνύμων

Δύο πολυώνυμα

$$\alpha_{\nu}x^{\nu}+\alpha_{\nu-1}x^{\nu-1}+\cdots+\alpha_{1}x+\alpha_{0} \text{ kal } \beta_{\kappa}x^{\kappa}+\beta_{\kappa-1}x^{\kappa-1}+\cdots+\beta_{1}x+\beta_{0}$$

 $\text{ fe }\nu\geq\kappa$

είναι ίσα όταν

$$\alpha_0=\overline{\beta_0}$$
, $\alpha_0=\beta_0$, ..., $\alpha_\kappa=\beta_\kappa$ και $\beta_{\kappa+1}=\beta_{\kappa+2}=\cdots=\beta_{\nu}=0$

Πολυώνυμο = Συνάρτηση, άρα...

Αριθμητική Τιμή

Εστω ένα πολυώνυμο $P(x)=\alpha_{\nu}x^{\nu}+\alpha_{\nu-1}x^{\nu-1}+\cdots+\alpha_{1}x+\alpha_{0}$ Αριθμητική τιμή ή απλά τιμή του είναι κάθε αριθμός $P(\rho)$ με $\rho\in\mathbb{R}$

$$P(\rho) = \alpha_{\nu}\rho^{\nu} + \alpha_{\nu-1}\rho^{\nu-1} + \dots + \alpha_{1}\rho + \alpha_{0}$$

Ρίζα

Εστω ένα πολυώνυμο $P(x)=\alpha_{\nu}x^{\nu}+\alpha_{\nu-1}x^{\nu-1}+\cdots+\alpha_1x+\alpha_0$ <u>Ρίζα</u> του είναι κάθε $\rho\in\mathbb{R}$ με $P(\rho)=0$

Λόλας Πολυώνυμα 6/21

- Πρόσθεση
- Αφαίρεση
- Πολλαπλασιασμός
- Διαίρεση!!!!!

- 💿 Πρόσθεση
- Αφαίρεση
- Πολλαπλασιασμός
- Διαίρεση!!!!!

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση

Ασκήσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^4 - 3x + 2$

- ① Να βρείτε την τιμή του πολυωνύμου για x=2
- ② Να εξετάσετε ποιοι από τους αριθμούς 1 και -1 είναι ρίζες του

Λόλας Πολυώνυμα 8/21

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^4 - 3x + 2$

- Να βρείτε την τιμή του πολυωνύμου για x=2
- Να εξετάσετε ποιοι από τους αριθμούς 1 και -1 είναι ρίζες του

Λόλας Πολυώνυμα 8/21

Να βρείτε τις τιμές των α και β για τις οποίες η αριθμητική τιμή του πολυωνύμου

$$P(x) = \alpha x^3 + \beta x + 1$$

για x=2 είναι 5 και ο αριθμός 1 είναι ρίζα του

Λόλας Πολυώνυμα 9/21

Δίνονται τα πολυώνυμα $P(x)=x^3-x$ και Q(x)=2x-1. Να βρείτε τα παρακάτω πολυώνυμα και τον βαθμό τους:

$$P(x) = P(x) \cdot Q(x)$$

Λόλας Πολυώνυμα 10/21

Δίνονται τα πολυώνυμα $P(x)=x^3-x$ και Q(x)=2x-1. Να βρείτε τα παρακάτω πολυώνυμα και τον βαθμό τους:

- **1** R(x) = 2P(x) 3Q(x)
- $P(x) = P(x) \cdot Q(x)$

Λόλας Πολυώνυμα 10/21

Δίνονται τα πολυώνυμα $P(x)=x^3-x$ και Q(x)=2x-1. Να βρείτε τα παρακάτω πολυώνυμα και τον βαθμό τους:

- **1** R(x) = 2P(x) 3Q(x)
- $P(x) = P(x) \cdot Q(x)$
- **3** $\Phi(x) = (Q(x))^2$

Λόλας Πολυώνυμα 10/21

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = (x+1)\lambda^2 + (x^2-1)\lambda - x^2 - x + 2$.

- ② Να δείξετε ότι ο σταθερός όρος του είναι μη μηδενικός για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$
- ③ Να βρείτε τις τιμές του λ , για τις οποίες το πολυώνυμο P(x) είναι σταθερό πολυώνυμο

Λόλας Πολυώνυμα 11/21

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = (x+1)\lambda^2 + (x^2-1)\lambda - x^2 - x + 2$.

- $\ \, \textbf{Φ}$ Να βρείτε τους συντελεστές του πολυωνύμου P(x) και το σταθερό όρο του
- ② Να δείξετε ότι ο σταθερός όρος του είναι μη μηδενικός για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$
- 3 Να βρείτε τις τιμές του λ , για τις οποίες το πολυώνυμο P(x) είναι σταθερό πολυώνυμο

Λόλας Πολυώνυμα 11/21

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = (x+1)\lambda^2 + (x^2-1)\lambda - x^2 - x + 2$.

- Να βρείτε τους συντελεστές του πολυωνύμου P(x) και το σταθερό όρο του
- Να δείξετε ότι ο σταθερός όρος του είναι μη μηδενικός για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$
- Να βρείτε τις τιμές του λ , για τις οποίες το πολυώνυμο P(x) είναι σταθερό πολυώνυμο

Λόλας Πολυώνυμα 11/21

Να βρείτε τιμές του μ , για τις οποίες το πολυώνυμο

$$P(x) = (\mu^3 - 1)x^3 + (\mu^2 - \mu)x + |\mu| - 1$$

είναι το μηδενικό πολυώνυμο

Λόλας Πολυώνυμα 12/21

Να βρείτε τις τιμές των πραγματικών αριθμών α , β και γ για τις οποίες τα πολυώνυμα

$$P(x) = (\alpha - 2)x^2 - 3x$$
 και $Q(x) = (\beta - 1)x + \gamma - \alpha$

είναι ίσα

Λόλας Πολυώνυμα 13/21

Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α , β , γ και δ για τους οποίους το πολυώνυμο $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$ παίρνει τη μορφή:

$$f(x) = \alpha x(x^2 - 1) + \beta x^2 + \gamma x + \delta$$

Λόλας Πολυώνυμα 14/21

Εστω το πολυώνυμο $P(x) = (\lambda^2 - 4)x - \lambda + 2$. Να βρείτε τις τιμές του λ , για τις οποίες:

- Το P(x) είναι 1ου βαθμού

Λόλας Πολυώνυμα 15/21

Εστω το πολυώνυμο $P(x) = (\lambda^2 - 4)x - \lambda + 2$. Να βρείτε τις τιμές του λ , νια τις οποίες:

- Το P(x) είναι 1ου βαθμού
- Το P(x) είναι μηδενικού βαθμού

Λόλας Πολυώνυμα 15/21

Εστω το πολυώνυμο $P(x)=(\lambda^2-4)x-\lambda+2$. Να βρείτε τις τιμές του λ , για τις οποίες:

- lacktriangle Το P(x) είναι 1ου βαθμού
- $oldsymbol{2}$ Το P(x) είναι μηδενικού βαθμού
- lacksquare Δεν ορίζεται βαθμός του P(x)

Λόλας Πολυώνυμα 15/21

Να βρείτε πολυώνυμο 2ου βαθμού με ρίζες τους αριθμούς -1, 0 και να ισχύει P(1) = 4

> Λόλας Πολυώνυμα 16/21

Να βρείτε το βαθμό του πολυωνύμου

$$P(x) = (\lambda^3 - 4\lambda)x^3 + (\lambda^2 - 2\lambda)x - \lambda + 2$$

για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$

Λόλας Πολυώνυμα 17/21

Να βρείτε πολυώνυμο P(x) για το οποίο ισχύει:

$$(x^2+1)P(x) = 2x^3 - x(x-2) - 1$$

Λόλας Πολυώνυμα 18/21

Αν το πολυώνυμο P(x) έχει ρίζα το 1, να δείξετε ότι το πολυώνυμο

$$Q(x) = P(x^2 - 3) + (x - 2)P(3x)$$

έχει ρίζα το 2

Λόλας Πολυώνυμα 19/21

Να βρείτε το πολυώνυμο P(x) για το οποίο ισχύει

$$P(x+1) = x^3 - 3x + 1$$

Λόλας Πολυώνυμα 20/21

Να βρείτε πολυώνυμο P(x), για το οποίο ισχύει

$$[P(x)]^2 - P(x) = x^2 + x$$

Λόλας Πολυώνυμα 21/21