Συναρτήσεις Κυρτότηα, Σημεία Καμπής

Κωνσταντίνος Λόλας

 10^o ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Τι μπορούμε να "χαράξουμε"

- Το πεδίο ορισμού
- ② Τα σημεία τομής με άξονες
- **③** Τη συμμετρία ως προς x'x ή y'y
- Φ Τη συνέχεια
- Την παραγωγισιμότητα
- ⑤ Τη μονοτονία
- Τα ακρότατα

Εμειναν

Το πώς "ανέρχεται" ή "κατέρχεται" (κυρτότητα)

Αν πλησιάζει προς ευθείες (ασύμπτωτες)

Τι μπορούμε να "χαράξουμε"

- Το πεδίο ορισμού
- ② Τα σημεία τομής με άξονες
- **③** Τη συμμετρία ως προς x'x ή y'y
- Φ Τη συνέχεια
- 💿 Την παραγωγισιμότητα
- **6** Τη μονοτονία
- Τα ακρότατα

Εμειναν

- Το πώς "ανέρχεται" ή "κατέρχεται" (κυρτότητα)
- Αν πλησιάζει προς ευθείες (ασύμπτωτες)

Λόλας $(10^o$ ΓΕΛ) Συναρτήσεις 2/22

Τι μπορούμε να "χαράξουμε"

- Το πεδίο ορισμού
- ② Τα σημεία τομής με άξονες
- **③** Τη συμμετρία ως προς x'x ή y'y
- Φ Τη συνέχεια
- Την παραγωγισιμότητα
- ⑤ Τη μονοτονία
- Τα ακρότατα

Εμειναν

- Το πώς "ανέρχεται" ή "κατέρχεται" (κυρτότητα)
- Αν πλησιάζει προς ευθείες (ασύμπτωτες)

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 2/22

Τι μπορούμε να "χαράξουμε"

- Το πεδίο ορισμού
- ② Τα σημεία τομής με άξονες
- 3 Τη συμμετρία ως προς x'x ή y'y
- Φ Τη συνέχεια
- Την παραγωγισιμότητα
- ⑤ Τη μονοτονία
- Τα ακρότατα

Εμειναν

- Το πώς "ανέρχεται" ή "κατέρχεται" (κυρτότητα)
- Αν πλησιάζει προς ευθείες (ασύμπτωτες)

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 2/22

Ορισμός

Ενα σχήμα λέγεται κυρτό, αν-ν κάθε ευθύγραμμο τμήμα με άκρα εσωτερικά σημεία του σχήματος, βρίσκεται εξολοκλήρου στο σχήμα

π.χ.

ο Κυρτή νωνία

Ορισμός

Ενα σχήμα λέγεται κυρτό, αν-ν κάθε ευθύγραμμο τμήμα με άκρα εσωτερικά σημεία του σχήματος, βρίσκεται εξολοκλήρου στο σχήμα

- Κυρτή γωνία $180 < \theta < 360$
- Κυρτή παραβολή
- Κυρτή συνάρτηση?

Ορισμός

Ενα σχήμα λέγεται κυρτό, αν-ν κάθε ευθύγραμμο τμήμα με άκρα εσωτερικά σημεία του σχήματος, βρίσκεται εξολοκλήρου στο σχήμα

- Κυρτή γωνία $180 < \theta < 360$
- Κυρτή παραβολή
- Κυρτή συνάρτηση?

Ορισμός

Ενα σχήμα λέγεται κυρτό, αν-ν κάθε ευθύγραμμο τμήμα με άκρα εσωτερικά σημεία του σχήματος, βρίσκεται εξολοκλήρου στο σχήμα

- Κυρτή γωνία $180 < \theta < 360$
- Κυρτή παραβολή $\alpha x^2 + \beta x + \gamma \mu \varepsilon \alpha > 0$
- Κυρτή συνάρτηση?

Ορισμός

Ενα σχήμα λέγεται κυρτό, αν-ν κάθε ευθύγραμμο τμήμα με άκρα εσωτερικά σημεία του σχήματος, βρίσκεται εξολοκλήρου στο σχήμα

- Κυρτή γωνία $180 < \theta < 360$
- Κυρτή παραβολή $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ με $\alpha > 0$
- Κυρτή συνάρτηση?

Ορισμός

Ενα σχήμα λέγεται κυρτό, αν-ν κάθε ευθύγραμμο τμήμα με άκρα εσωτερικά σημεία του σχήματος, βρίσκεται εξολοκλήρου στο σχήμα

- Κυρτή γωνία $180 < \theta < 360$
- Κυρτή παραβολή $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ με $\alpha > 0$
- Κυρτή συνάρτηση?

Ορισμός

Ενα σχήμα λέγεται κυρτό, αν-ν κάθε ευθύγραμμο τμήμα με άκρα εσωτερικά σημεία του σχήματος, βρίσκεται εξολοκλήρου στο σχήμα

- Κυρτή γωνία $180 < \theta < 360$
- Κυρτή παραβολή $\alpha x^2 + \beta x + \gamma$ με $\alpha > 0$
- Κυρτή συνάρτηση?

Συναρτήσεων

Εστω μια συνάρτηση f συνεχής σε ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ . Θα λέμε ότι:

- ullet η συνάρτηση στρέφει τα κοίλα προς τα άνω ή είναι κυρτή στο Δ , αν η f' είναι γνησίως αύξουσα στο εσωτερικό του Δ
- ullet η συνάρτηση στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κοίλη στο Δ , αν η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο εσωτερικό του Δ

Συναρτήσεις 4/22

Και άρα στο εύκολο

Κυρτότητα από f''(x)

Εστω μια συνάρτηση f συνεχής σ' ένα διάστημα Δ και δυο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ

- \bullet Αν f''(x)>0 για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ τότε είναι <u>κυρτή</u> στο Δ
- \bullet Αν f''(x) < 0 για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ τότε είναι κοίλη στο Δ

Προσοχή, δεν είναι αυτός ο ορισμός. Ούτε ισχύει το αντίστροφο

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 5/22

Και άρα στο εύκολο

Κυρτότητα από f''(x)

Εστω μια συνάρτηση f συνεχής σ' ένα διάστημα Δ και δυο φορές παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ

- \bullet Αν f''(x)>0 για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ τότε είναι <u>κυρτή</u> στο Δ
- \bullet Αν f''(x) < 0 για κάθε εσωτερικό σημείο του Δ τότε είναι κοίλη στο Δ

Προσοχή, δεν είναι αυτός ο ορισμός. Ούτε ισχύει το αντίστροφο

Και ένα σχόλιο

Φτιάξτε μία κυρτή συνάρτηση και μελετήστε ΚΑΘΕ εφαπτομένη της!

Ανίσωση SOS

Αν μία συνάρτηση είναι κυρτή σ' ένα διάστημα Δ τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται "κάτω" από τη γραφική της παράσταση. Αντίστοιχα από "πάνω" όταν είναι κοίλη.

Η απόδειξη είναι πολύ εύκολη και γίνεται με ΘΜΤ ή με ακρότατα.

Λόλας (10^{o} ΓΕΛ) Συναρτήσεις 6/22

Και ένα σχόλιο

Φτιάξτε μία κυρτή συνάρτηση και μελετήστε ΚΑΘΕ εφαπτομένη της!

Ανίσωση SOS

Αν μία συνάρτηση είναι κυρτή σ' ένα διάστημα Δ τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται "κάτω" από τη γραφική της παράσταση. Αντίστοιχα από "πάνω" όταν είναι κοίλη.

Η απόδειξη είναι πολύ εύκολη και γίνεται με ΘΜΤ ή με ακρότατα.

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 6/22

Και ένα σχόλιο

Φτιάξτε μία κυρτή συνάρτηση και μελετήστε ΚΑΘΕ εφαπτομένη της!

Ανίσωση SOS

Αν μία συνάρτηση είναι κυρτή σ' ένα διάστημα Δ τότε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f σε κάθε σημείο του Δ βρίσκεται "κάτω" από τη γραφική της παράσταση. Αντίστοιχα από "πάνω" όταν είναι κοίλη.

Η απόδειξη είναι πολύ εύκολη και γίνεται με ΘΜΤ ή με ακρότατα.

Σημείο Καμπής

Ορισμός

Εστω μία συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα (α, β) με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 . Αν

- ullet η f είναι κυρτή στο (α, x_0) και κοίλη στο (x_0, β) ή αντιστρόφως, και
- ullet η C_f έχει εφαπτόμενη στο σημείο ${\bf A}(x_0,f(x_0))$

τότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ ονομάζεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f

Συναρτήσεις 7/22

Θεώρημα Σημείου Καμπής

Ιδιότητα

Αν το ${\bf A}(x_0,f(x_0))$ είναι σημείο καμπής της C_f και η f είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, τότε $f''(x_0)=0.$

Απόδειξη

Πού κρύβονται?

①
$$f''(x_0) = 0$$

$$f''(x_0)$$
 δεν ορίζεται

Πού κρύβονται?

- **1** $f''(x_0) = 0$
- $2 f''(x_0)$ δεν ορίζεται

Πού κρύβονται?

- **1** $f''(x_0) = 0$
- $2 f''(x_0)$ δεν ορίζεται

Πείτε το, αφού δεν κρατιέστε! Τα σημεία καμπής είναι τα ακρότατα της f', χωρίς τα άκρα!

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς την κυρτότητα

- **1** $f(x) = x^2 \ln x$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς την κυρτότητα

$$f(x) = x^2 - \ln x$$

2
$$f(x) = \sqrt{x} - e^x$$

$$f(x) = x^4 - 2x + 1$$

$$f(x) = x \ln x - e^{-x}$$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς την κυρτότητα

1
$$f(x) = x^2 - \ln x$$

2
$$f(x) = \sqrt{x} - e^x$$

$$f(x) = x^4 - 2x + 1$$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς την κυρτότητα

- **1** $f(x) = x^2 \ln x$
- 2 $f(x) = \sqrt{x} e^x$
- $f(x) = x^4 2x + 1$
- $f(x) = x \ln x e^{-x}$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - x$.

- Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα και την κυρτότητα

Συναρτήσεις 11/22

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - x$.

- Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα και την κυρτότητα
- Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του πεδίου ορισμού της, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - x$.

- Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα και την κυρτότητα
- Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του πεδίου ορισμού της, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και να σχεδιάσετε τη C_f
- Nα λύσετε την εξίσωση $f(x) = \sigma v \nu x$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία οι παρακάτω συναρτήσεις είναι κυρτές ή κοίλες και να προσδιορίσετε (αν υπάρχουν) τα σημεία καμπής

$$(x) = x^3 - 3x^2 + 5$$

$$(2) f(x) = 3x^5 - 5x^4$$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία οι παρακάτω συναρτήσεις είναι κυρτές ή κοίλες και να προσδιορίσετε (αν υπάρχουν) τα σημεία καμπής

- $(x) = x^3 3x^2 + 5$
- $f(x) = 3x^5 5x^4$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία οι παρακάτω συναρτήσεις είναι κυρτές ή κοίλες και να προσδιορίσετε (αν υπάρχουν) τα σημεία καμπής

①
$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$$

② $f(x) = x + \frac{1}{x}$

$$f(x) = x + \frac{1}{x}$$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία οι παρακάτω συναρτήσεις είναι κυρτές ή κοίλες και να προσδιορίσετε (αν υπάρχουν) τα σημεία καμπής

- ① $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ② $f(x) = x + \frac{1}{x}$

Να βρείτε τις θέσεις των σημείων καμπής των συναρτήσεων:

$$(2) f(x) = 2x(\ln x - 1) - \ln^2 x$$

Να βρείτε τις θέσεις των σημείων καμπής των συναρτήσεων:

①
$$f(x) = \sigma v \nu x - \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{2} - 1$$

② $f(x) = 2x(\ln x - 1) - \ln^2 x$

$$f(x) = 2x(\ln x - 1) - \ln^2 x$$

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία οι παρακάτω συναρτήσεις είναι κυρτές ή κοίλες και να προσδιορίσετε (αν υπάρχουν) τα σημεία καμπής

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 15/22

Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία οι παρακάτω συναρτήσεις είναι κυρτές ή κοίλες και να προσδιορίσετε (αν υπάρχουν) τα σημεία καμπής

- 2 $f(x) = \varepsilon \varphi x x + 2\ln(\sigma v \nu x), x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 15/22

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- ② Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f

Λόλας $(10^{o}$ ΓΕΛ) Συναρτήσεις 16/22

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x$

- Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα και τα σημεία καμπής
- Να βρείτε τις οριακές τιμές της f στα άκρα του διαστήματος του πεδίου ορισμού της, να κάνετε τον πίνακα μεταβολών της f και με βάση τις απαντήσεις σας στα προηγούμενα ερωτήματα, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f

Συναρτήσεις 16/22

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + \ln x$. Να δείξετε ότι:

- f 1 Η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής το ${\bf A}(x_0,f(x_0))$

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 17/22

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + \ln x$. Να δείξετε ότι:

- f 1 Η C_f έχει μοναδικό σημείο καμπής το ${\bf A}(x_0,f(x_0))$
- $x_0 < \frac{4}{5}$

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 17/22

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 6e^x - x^3 - 4x^2$. Να δείξετε ότι η f έχει ακριβώς δύο σημεία καμπής

Συναρτήσεις 18/22

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^4}{12} - \frac{\alpha^2 x^3}{3} + \frac{\alpha x^2}{2} - 3x + 1$$

Nα βρείτε τις τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$ για τις οποίες:

- **1** Η f παρουσιάζει καμπή στο $x_0 = 1$

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 19/22

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^4}{12} - \frac{\alpha^2 x^3}{3} + \frac{\alpha x^2}{2} - 3x + 1$$

Nα βρείτε τις τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$ για τις οποίες:

- \blacksquare Η f παρουσιάζει καμπή στο $x_0=1$
- ② Η C_f έχει ακριβώς δύο σημεία καμπής

Συναρτήσεις 19/22

Να αποδείξετε ότι για κάθε $\alpha \in (-2,2)$ η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 2\alpha x^3 + 6x^2 - 1$ είναι κυρτή σε όλο το $\mathbb R$

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 20/22

Εστω $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$f''(x) + f(x) \neq 2f'(x)$$
, για κάθε $x \in \mathbb{R}$

Να δείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = e^{-x} f(x)$, $x \in \mathbb{R}$ δεν έχει σημεία καμπής.

Συναρτήσεις 21/22

Εστω $f:(1,3)\to\mathbb{R}$ μία συνάρτηση, η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη και ισχύει:

$$f^2(x)+xf(x)+x^2-3x+1=0$$
, για κάθε $x\in(1,3)$

Να δείξετε ότι η συνάρτηση f, δεν παρουσιάζει καμπή

Λόλας (10^o ΓΕΛ) Συναρτήσεις 22/22

Εστω ότι η f έχει σημείο καμπής στο x_0 με κυρτή αριστερά και κοίλη δεξιά του σημείου.

Αρα $f'(x) < f'(x_0)$ για κάθε $x < x_0$ και $f'(x) < f'(x_0)$ για κάθε $x > x_0$ Αφού f' παραγωγίσιμη, θα υπάρχει το όριο

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \ge 0$$

όμοια

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \le 0$$

Αρα $f''(x_0)=0$ Πίσω στη θεωρία

Λόλας $(10^o$ ΓΕΛ) Συναρτήσεις 1/1

Εστω ότι η f έχει σημείο καμπής στο x_0 με κυρτή αριστερά και κοίλη δεξιά του σημείου.

Αρα $f'(x) < f'(x_0)$ για κάθε $x < x_0$ και $f'(x) < f'(x_0)$ για κάθε $x > x_0$ Αφού f' παραγωγίσιμη, θα υπάρχει το όριο

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \ge 0$$

όμοια

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \le 0$$

$$\mathsf{A}\mathsf{p} lpha \, f''(x_0) = 0$$
 Πίσω στη θεωρία

Λόλας $(10^{o}$ ΓΕΛ) Συναρτήσεις 1/1

Εστω ότι η f έχει σημείο καμπής στο x_0 με κυρτή αριστερά και κοίλη δεξιά του σημείου.

Αρα $f'(x) < f'(x_0)$ για κάθε $x < x_0$ και $f'(x) < f'(x_0)$ για κάθε $x > x_0$ Αφού f' παραγωγίσιμη, θα υπάρχει το όριο

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \ge 0$$

όμοια

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \le 0$$

Αρα $f''(x_0)=0$ Πίσω στη θεωρία

Λόλας $(10^{o}$ ΓΕΛ) Συναρτήσεις 1/1

Εστω ότι η f έχει σημείο καμπής στο x_0 με κυρτή αριστερά και κοίλη δεξιά του σημείου.

Αρα $f'(x) < f'(x_0)$ για κάθε $x < x_0$ και $f'(x) < f'(x_0)$ για κάθε $x > x_0$ Αφού f' παραγωγίσιμη, θα υπάρχει το όριο

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \ge 0$$

όμοια

$$f''(x_0) = \lim_{x \to x_0^+} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} \le 0$$

Αρα $f''(x_0)=0$ Πίσω στη θεωρία

Λόλας $(10^{o}$ ΓΕΛ) Συναρτήσεις 1/1