# Συναρτήσεις

Κωνσταντίνος. Λόλας

# Ορισμός

#### Ορισμός

Έστω A ένα υποσύνολο του  $\mathbb{R}$ . Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A μια διαδικασία (κανόνα) f, με την οποία κάθε στοιχείο  $x \in A$  αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό y. Το y ονομάζεται τιμή της f στο x και συμβολίζεται με f(x).

# Τρόπος ορισμού

• Απλός τύπος

$$f(x)=x^2+2, x\in\mathbb{R}\quad g(a)=\frac{2}{\eta\mu a}, a\leq 1$$

# Τρόπος ορισμού

• Απλός τύπος

$$f(x) = x^2 + 2, x \in \mathbb{R} \quad g(a) = \frac{2}{\eta \mu a}, a \le 1$$

• Ορισμένη κατά "κλάδους"

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x < 2\\ \frac{2}{\eta \mu x}, & x > 5\\ -\sqrt{2}, & x = 3 \end{cases}$$

# Τρόπος ορισμού

• Απλός τύπος

$$f(x)=x^2+2, x\in\mathbb{R}\quad g(a)=\frac{2}{\eta\mu a}, a\leq 1$$

• Ορισμένη κατά "κλάδους"

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & x < 2\\ \frac{2}{\eta \mu x}, & x > 5\\ -\sqrt{2}, & x = 3 \end{cases}$$

• Περιγραφικά



# Συμβολισμοί

- $f: A \to \mathbb{R}$
- $\bullet$   $x \to f(x)$
- $f(A) = \{y|y = f(x)$  για κάποιο  $x \in A\}$

• Διαίρεση

$$\frac{a}{b}, b \neq 0$$

$$\frac{a}{b}, b \neq 0$$

$$\sqrt[n]{a}, a \ge 0$$

• Διαίρεση

$$\frac{a}{b}, b \neq 0$$

• Ρίζες

$$\sqrt[n]{a}, a \ge 0$$

• Λογάριθμοι

$$\ln a, a > 0$$

$$\frac{a}{b}, b \neq 0$$

• Ρίζες

$$\sqrt[n]{a}, a \ge 0$$

• Λογάριθμοι

$$\ln a, a > 0$$

• Κρυφά

$$\varepsilon \varphi x, \quad x^x \dots$$

### Προαπαιτούμενα

### Πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά

- Εξισώσεις
- Ανισώσεις

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^3 - x + a$  με f(-1) = 1

Να βρείτε την τιμή του a.

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^3 - x + a$  με f(-1) = 1

- **1** Να βρείτε την τιμή του *a*.
- ② Να λύσετε την εξίσωση f(x) = 1.

Για τη συνάρτηση 
$$f(x) = \begin{cases} 2x + a^2, & x < 3 \\ x - 3 + b^2, & x \ge 3 \end{cases}$$
, ισχύει  $f(0) + f(3) = 0$ .

Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

Για τη συνάρτηση 
$$f(x) = \begin{cases} 2x + a^2, & x < 3 \\ x - 3 + b^2, & x \ge 3 \end{cases}$$
, ισχύει  $f(0) + f(3) = 0$ .

- Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.
- **2** Να υπολογίσετε τα *a* και *b*.

Για τη συνάρτηση 
$$f(x)=\begin{cases} 2x+a^2,&x<3\\ x-3+b^2,&x\geq 3 \end{cases}$$
, ισχύει  $f(0)+f(3)=0.$ 

- Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.
- ② Να υπολογίσετε τα a και b.
- **3** Να βρείτε τις τιμές  $f(\pi)$  και f(e).



$$\frac{1}{x-1}$$

$$\frac{1}{x-1}$$

$$\frac{2x}{x^2 - 3x + 2}$$

- $\frac{2x}{x^2 3x + 2}$

- $\frac{1}{x-1}$
- $\frac{2x}{x^2 3x + 2}$

- $\frac{1}{x-1}$
- $\frac{2x}{x^2 3x + 2}$

- $\frac{1}{x-1}$
- $\frac{2x}{x^2 3x + 2}$
- **4**  $\ln(x-1)$

- $\frac{2x}{x^2 3x + 2}$

- $\frac{2x}{x^2 3x + 2}$
- $\ln(x-1)$

- $\frac{2x}{x^2 3x + 2}$
- $\ln(x-1)$
- **5**  $\sqrt{x-1} \sqrt[3]{2-x}$

- $\frac{1}{x-1}$
- $\frac{2x}{x^2 3x + 2}$
- $\ln(x-1)$
- **5**  $\sqrt{x-1} \sqrt[3]{2-x}$

$$\sqrt[3]{x-1}$$

$$\ln(x-1)$$

**1** 
$$\ln(\sqrt{x-1}-x+3)$$

Δίνεται η συνάρτηση 
$$f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \leq 1 \\ \ln(x-1), & x > 1 \end{cases}$$

- Να βρείτε τις τιμές
  - $\qquad \qquad \mathbf{0} \quad f(\eta \mu a) \text{, } a \in \mathbb{R}$

Δίνεται η συνάρτηση 
$$f(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x \leq 1 \\ \ln(x-1), & x > 1 \end{cases}$$

- Να βρείτε τις τιμές

  - $f(x^2+1), x \neq 0$
- ② Να λύσετε την εξίσωση f(x) = 0