Συναρτήσεις Μονοτονία

Κωνσταντίνος Λόλας

Κάτι που αφήσαμε πιο πριν...

Δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε όλων των συναρτήσεων την μονοτονία π.χ.

- $e^x x$
- $2 x^3 2x + 1$
- 3 $\ln x x^2$

- Προσέγγιση συνάρτησης
 - Για υπολονισμούς κοντά στο x_0 , π.χ. $\sqrt{4.05}$
 - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο α
 - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

- Προσέγγιση συνάρτησης
 - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0 , π.χ. $\sqrt{4,05}$
 - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
 - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

- Προσέγγιση συνάρτησης
 - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0 , π.χ. $\sqrt{4,05}$
 - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
 - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

- Προσέγγιση συνάρτησης
 - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0 , π.χ. $\sqrt{4,05}$
 - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
 - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

- Προσέγγιση συνάρτησης
 - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0 , π.χ. $\sqrt{4,05}$
 - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
 - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

- Προσέγγιση συνάρτησης
 - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0 , π.χ. $\sqrt{4,05}$
 - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
 - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

- Προσέγγιση συνάρτησης
 - Για υπολογισμούς κοντά στο x_0 , π.χ. $\sqrt{4,05}$
 - Για να ξέρουμε αν θα μειώσει ή θα αυξηθεί κοντά στο x_0
 - Για υπολογισμό εμβαδού κάτω από την γραφική
- Εύρεση ριζών
- Φυσική (ρυθμός μεταβολής)

Μονοτονία

Μονοτονία

Έστω μία συνάρτηση f συνεχής στο Δ . Αν f'(x)>0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ

Όμοια για
$$f'(x) < 0$$



Μονοτονία

Μονοτονία

Έστω μία συνάρτηση f συνεχής στο Δ . Αν f'(x)>0 σε κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , τότε η f είναι γνησίως αύξουσα στο Δ

Όμοια για f'(x) < 0

Απόδειξη

- Ξαναλύνουμε όλες τις ασκήσεις με μονοτονία, τώρα όμως ΟΛΕΣ
- Όσοι δεν τα μάθανε καλά, είναι ευκαιρία τώρα να επιστρέψουν
- ③ Όσοι τα είχατε καταλάβει ευκαιρία για επανάληψη
- ④ Θα ασχολούμαστε με πρόσημα!!!!

- Ξαναλύνουμε όλες τις ασκήσεις με μονοτονία, τώρα όμως ΟΛΕΣ
- Όσοι δεν τα μάθανε καλά, είναι ευκαιρία τώρα να επιστρέψουν
- ③ Όσοι τα είχατε καταλάβει ευκαιρία για επανάληψη
- ④ Θα ασχολούμαστε με πρόσημα!!!!

- Ξαναλύνουμε όλες τις ασκήσεις με μονοτονία, τώρα όμως ΟΛΕΣ
- Όσοι δεν τα μάθανε καλά, είναι ευκαιρία τώρα να επιστρέψουν
- Όσοι τα είχατε καταλάβει ευκαιρία για επανάληψη
- ④ Θα ασχολούμαστε με πρόσημα!!!!

- Ξαναλύνουμε όλες τις ασκήσεις με μονοτονία, τώρα όμως ΟΛΕΣ
- Όσοι δεν τα μάθανε καλά, είναι ευκαιρία τώρα να επιστρέψουν
- 🗿 Όσοι τα είχατε καταλάβει ευκαιρία για επανάληψη
- ④ Θα ασχολούμαστε με πρόσημα!!!!

- **1** Aν f' > 0 τότε $f \uparrow$
- ② Aν $f \uparrow τότε f' > 0$
- ③ Aν $f \uparrow τότε f' \ge 0$
- **4** Aν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

- **1** Aν f' > 0 τότε $f \uparrow \Delta A\Theta O \Sigma!!!!!!!!!!!$
- ② Aν $f \uparrow τότε f' > 0$
- 3 Aν $f \uparrow τότε f' \ge 0$
- **4** Aν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

- **1** Aν f' > 0 τότε $f \uparrow$
- ② Aν $f \uparrow τότε f' > 0$
- ③ Aν $f \uparrow τότε f' \ge 0$
- 4 Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

- **1** Aν f' > 0 τότε $f \uparrow$
- ② Αν $f \uparrow \tau$ ότε f' > 0 <u>ΛΑΘΟΣ!!!!!!!!!</u>
- ③ Aν $f \uparrow τότε f' \ge 0$
- **4** Aν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

- **1** Aν f' > 0 τότε $f \uparrow$
- ② Aν $f \uparrow \tau \acute{o} \tau \epsilon f' > 0$
- ③ Aν $f \uparrow \tau \acute{o} \tau \epsilon f' \geq 0$
- 4 Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονς

- ① Aν f' > 0 τότε $f \uparrow$
- ② Aν $f \uparrow \tau \acute{o} \tau \epsilon f' > 0$
- ③ Αν $f \uparrow \tau \acute{o} \tau \epsilon f' \geq 0$ ΛΑΘΟΣ!!!!!!!!!!
- **4** Aν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

- **1** Aν f' > 0 τότε $f \uparrow$
- ② Aν $f \uparrow \tau \acute{o} \tau \epsilon f' > 0$
- ③ Aν $f \uparrow$ τότε $f' \ge 0$
- **4** Aν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη

- **1** Aν f' > 0 τότε $f \uparrow$
- ② Aν $f \uparrow \tau \acute{o} \tau \epsilon f' > 0$
- ③ Aν $f \uparrow$ τότε $f' \ge 0$
- 4 Αν $f' \neq 0$ τότε f γνησίως μονότονη ΛΑΘΟΣ!!!!!!!!!!

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

$$(2) f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$$

$$(3) f(x) = \eta \mu x - 2x$$

$$(5) f(x) = x - \eta \mu x - 1$$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

①
$$f(x) = e^x + x - 1$$

$$(2) f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$$

$$(3) f(x) = \eta \mu x - 2x$$

$$(4) f(x) = (x-1)^3 - 2$$

$$(5) f(x) = x - \eta \mu x - 1$$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

$$f(x) = e^x + x - 1$$

$$(2) f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$$

$$(4) f(x) = (x-1)^3 - 2$$

$$(5) f(x) = x - \eta \mu x - 1$$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

$$f(x) = e^x + x - 1$$

$$(2) f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$$

$$(4) f(x) = (x-1)^3 - 2$$

$$f(x) = x - \eta \mu x - 1$$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

$$f(x) = e^x + x - 1$$

$$(2) f(x) = x^3 - x^2 + x - 1$$

$$(4) f(x) = (x-1)^3 - 2$$

$$f(x) = x - \eta \mu x - 1$$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

②
$$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x - 1$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x - 1$$

$$f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{7}{2}x^2 + 6x - 1$$

$$(5) f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

2
$$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x - 1$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x - 1$$

$$f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{7}{2}x^2 + 6x - 1$$

$$(5) f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x - 1$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x - 1$$

$$f(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{7}{2}x^2 + 6x - 1$$

$$(5) f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x - 1$$

$$(5) f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$$

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x - 1$$

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 1$$

- $(x) = x \ln(x^2 + 1)$

2
$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$$

3 $f(x) = \ln|x| + \frac{1}{2x^2}$

(3)
$$f(x) = \ln|x| + \frac{1}{2x^2}$$

- $(x) = x \ln(x^2 + 1)$
- ② $f(x) = \frac{x^2 x + 1}{x 1}$ ③ $f(x) = \ln|x| + \frac{1}{2x^2}$

1
$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

$$(3) f(x) = x\sqrt{x+1}$$

1
$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

②
$$f(x) = x - 2\sqrt{x}$$

$$(3) f(x) = x\sqrt{x+1}$$

1
$$f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$$

②
$$f(x) = x - 2\sqrt{x}$$

3
$$f(x) = x\sqrt{x+1}$$

- $f(x) = 2e^x x + 1$

- $f(x) = 2e^x x + 1$
- 2 $f(x) = x^x, x > 0$

- $f(x) = 2e^x x + 1$
- ② $f(x) = x^x, x > 0$
- 3 $f(x) = (x-2)e^x \frac{x^2}{2} + x + 1$

- ② $f(x) = \frac{1}{1 + \eta \mu x}, x \in [0, \pi]$

- ② $f(x) = \frac{1}{1 + \eta \mu x}, x \in [0, \pi]$

- ② $f(x) = \frac{1}{1 + \eta \mu x}, x \in [0, \pi]$
- 3 $f(x) = \varepsilon \varphi x x, x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

①
$$f(x) = \begin{cases} 1 - \ln(x^2 + 1) & , x < 0 \\ e^x - x & , x \ge 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & , x < 0 \\ 32x^3 - 3x^2 & , x \ge 0 \end{cases}$$

Λόλας Συναρτήσεις 13/1


Να μελετήσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς τη μονοτονία

①
$$f(x) = \begin{cases} 1 - \ln(x^2 + 1) & , x < 0 \\ e^x - x & , x \ge 0 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2x & , x < 0 \\ 32x^3 - 3x^2 & , x \ge 0 \end{cases}$$

Συναρτήσεις Λόλας 13/1

Έστω $f:[0,4]\to\mathbb{R}$ μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής και η γραφική παράσταση της f' φαίνεται στο σχήμα. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f.



Λόλας 14/1 Συναρτήσεις

Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης $f(x) = e^x + 2x - 1$

Λόλας

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης $f(x) = e^x - e \ln x$

Λόλας

①
$$f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x}$$
②
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta \mu x}{x} & , x \in (0, \pi) \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$$

①
$$f(x) = \ln x - \frac{\ln x}{x}$$

② $f(x) = \begin{cases} \frac{\eta \mu x}{x} & , x \in (0, \pi) \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$

- $(2) f(x) = 2x \ln x x^2$
- (3) $f(x) = e^{-x} + \ln x$

- 2 $f(x) = 2x \ln x x^2$
- $(3) f(x) = e^{-x} + \ln x$

- 2 $f(x) = 2x \ln x x^2$
- 3 $f(x) = e^{-x} + \ln x$

- 2 $f(x) = 2x \ln x x^2$
- 3 $f(x) = e^{-x} + \ln x$

1
$$f(x) = -2\sigma v \nu x - x, x \in [0, \pi]$$

$$2 f(x) = e^x \sigma v \nu x, x \in [0, \pi)$$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

$$(2) f(x) = \frac{\sigma \varphi x}{x}, x \in (0, \pi)$$

Λόλας 20/1 Συναρτήσεις

2
$$f(x) = \frac{\sigma \varphi x}{x}$$
, $x \in (0, \pi)$

Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας των συναρτήσεων

1
$$f(x) = x\sqrt{4-x^2}$$

②
$$f(x) = x - \sqrt{x^2 - 1}$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x^{\frac{3}{2}} + 2x^2$$

21/1

- 1 $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$
- 2 $f(x) = x \sqrt{x^2 1}$

- 1 $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$
- 2 $f(x) = x \sqrt{x^2 1}$

Έστω $f:[1,+\infty)\to\mathbb{R}$ μία συνάρτηση η οποία είναι δύο φορές παραγωγίσιμη με f(1)=f'(1)=0 και ισχύει f''(x)>0 για κάθε x>1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x)=egin{cases} \frac{f(x)}{x-1} & ,x>1\\ 0 & ,x=1 \end{cases}$ είναι γνησίως αύξουσα

Λόλας Συναρτήσεις 22/1

Έστω $f:[0,+\infty)\to\mathbb{R}$ μία συνάρτηση με f(0)=0 η οποία είναι παραγωγίσιμη με f'(0)=0 και η f' είναι γνησίως αύξουσα. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x)=\begin{cases} \frac{f(x)}{x} &, x>0\\ 0 &, x=0 \end{cases}$, είναι γνησίως φθίνουσα

Λόλας Συναρτήσεις 23/1

Nα βρείτε τις τιμές του $a \in \mathbb{R}^*$, για τις οποίες η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{ax^3}{3} + x^2 + x - 1$$

είναι γνησίως αύξουσα

Λόλας

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + \sigma v \nu x$ είναι γνησίως αύξουσα

Λόλας Συναρτήσεις 25/1

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις

$$f(x) = \ln x + x + e^{-x}$$

26/1

Να μελετήσετε ως προς τη μονοτονία τις συναρτήσεις

$$(x) = e^x - x + \ln(1 + x^2)$$

②
$$f(x) = \ln x + x + e^{-x}$$

Λόλας

Θα δείξουμε ότι για κάθε $x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2)$. Στο $[x_1,x_2]$ είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ

Υπάρχει
$$\xi \in \Delta$$
 ώστε $f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ Αλλά $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in \Delta$ Αρα $f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$ $f(x_2) > f(x_1)$

Λόλας Συναρτήσεις

1/0

Θα δείξουμε ότι για κάθε $x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2)$. Στο $[x_1,x_2]$ είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ Υπάρχει $\xi \in \Delta$ ώστε $f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. Αλλά f'(x) > 0 για κάθε $x \in \Delta$ Αρα $f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$

```
Θα δείξουμε ότι για κάθε x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2). Στο [x_1,x_2] είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ Υπάρχει \xi \in \Delta ώστε f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. Αλλά f'(x) > 0 για κάθε x \in \Delta Αρα f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0 f(x_2) > f(x_1)
```

```
Θα δείξουμε ότι για κάθε x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2). 
 Στο [x_1, x_2] είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ 
 Υπάρχει \xi \in \Delta ώστε f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}. 
 Αλλά f'(x) > 0 για κάθε x \in \Delta 
 Άρα f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0 
 f(x_2) > f(x_1)
```

Θα δείξουμε ότι για κάθε $x_1 < x_2 \in \Delta \implies f(x_1) < f(x_2)$. Στο $[x_1,x_2]$ είναι παραγωγίσιμη, άρα θα ισχύει το ΘΜΤ $\text{Υπάρχει } \xi \in \Delta \text{ ώστε } f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$ $\text{Αλλά } f'(x) > 0 \text{ για κάθε } x \in \Delta$ $\text{Άρα } f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > 0$ $f(x_2) > f(x_1)$