

# Συναρτήσεις

## Εφαπτομένη

Κωνσταντίνος Λόλας

# Τι μάθαμε?

Ξέρουμε την κλίση ΚΑΘΕ συνάρτησης σε ΚΑΘΕ σημείο. Σημείο - Κλίση...

Εφαπτομένη

Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της  $f$  στο σημείο  $x_0$  είναι η

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

# Τι μάθαμε?

Ξέρουμε την κλίση ΚΑΘΕ συνάρτησης σε ΚΑΘΕ σημείο. Σημείο - Κλίση...

Εφαπτομένη

Η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της  $f$  στο σημείο  $x_0$  είναι η

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

# Μελέτη τύπου

- ① Αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα σημείο είναι OK
- ② Ο μόνος άγνωστος είναι το  $x_0$ 
  - ① είτε θα δίνεται
  - ② είτε δίνεται το  $f(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ③ είτε δίνεται το  $f'(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ④ είτε η εφαπτόμενη είναι παράλληλη σε ευθεία
  - ⑤ είτε η εφαπτόμενη είναι κάθετη σε ευθεία
  - ⑥ είτε δίνεται η εφαπτόμενη
  - ⑦ είτε διέρχεται από ένα σημείο...

# Μελέτη τύπου

- ① Αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα σημείο είναι OK
- ② Ο μόνος άγνωστος είναι το  $x_0$ 
  - ① είτε θα δίνεται
  - ② είτε δίνεται το  $f(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ③ είτε δίνεται το  $f'(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ④ είτε η εφαπτόμενη είναι παράλληλη σε ευθεία
  - ⑤ είτε η εφαπτόμενη είναι κάθετη σε ευθεία
  - ⑥ είτε δίνεται η εφαπτόμενη
  - ⑦ είτε διέρχεται από ένα σημείο...

# Μελέτη τύπου

- ① Αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα σημείο είναι OK
- ② Ο μόνος άγνωστος είναι το  $x_0$ 
  - ① είτε θα δίνεται
  - ② είτε δίνεται το  $f(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ③ είτε δίνεται το  $f'(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ④ είτε η εφαπτόμενη είναι παράλληλη σε ευθεία
  - ⑤ είτε η εφαπτόμενη είναι κάθετη σε ευθεία
  - ⑥ είτε δίνεται η εφαπτόμενη
  - ⑦ είτε διέρχεται από ένα σημείο...

# Μελέτη τύπου

- ① Αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα σημείο είναι OK
- ② Ο μόνος άγνωστος είναι το  $x_0$ 
  - ① είτε θα δίνεται
  - ② είτε δίνεται το  $f(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ③ είτε δίνεται το  $f'(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ④ είτε η εφαπτόμενη είναι παράλληλη σε ευθεία
  - ⑤ είτε η εφαπτόμενη είναι κάθετη σε ευθεία
  - ⑥ είτε δίνεται η εφαπτόμενη
  - ⑦ είτε διέρχεται από ένα σημείο...

# Μελέτη τύπου

- ① Αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα σημείο είναι OK
- ② Ο μόνος άγνωστος είναι το  $x_0$ 
  - ① είτε θα δίνεται
  - ② είτε δίνεται το  $f(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ③ είτε δίνεται το  $f'(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ④ είτε η εφαπτόμενη είναι παράλληλη σε ευθεία
  - ⑤ είτε η εφαπτόμενη είναι κάθετη σε ευθεία
  - ⑥ είτε δίνεται η εφαπτόμενη
  - ⑦ είτε διέρχεται από ένα σημείο...



# Μελέτη τύπου

- ① Αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα σημείο είναι OK
- ② Ο μόνος άγνωστος είναι το  $x_0$ 
  - ① είτε θα δίνεται
  - ② είτε δίνεται το  $f(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ③ είτε δίνεται το  $f'(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ④ είτε η εφαπτόμενη είναι παράλληλη σε ευθεία
  - ⑤ είτε η εφαπτόμενη είναι κάθετη σε ευθεία
  - ⑥ είτε δίνεται η εφαπτόμενη
  - ⑦ είτε διέρχεται από ένα σημείο...

# Μελέτη τύπου

- ① Αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα σημείο είναι OK
- ② Ο μόνος άγνωστος είναι το  $x_0$ 
  - ① είτε θα δίνεται
  - ② είτε δίνεται το  $f(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ③ είτε δίνεται το  $f'(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ④ είτε η εφαπτόμενη είναι παράλληλη σε ευθεία
  - ⑤ είτε η εφαπτόμενη είναι κάθετη σε ευθεία
  - ⑥ είτε δίνεται η εφαπτόμενη
  - ⑦ είτε διέρχεται από ένα σημείο...

# Μελέτη τύπου

- ① Αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα σημείο είναι OK
- ② Ο μόνος άγνωστος είναι το  $x_0$ 
  - ① είτε θα δίνεται
  - ② είτε δίνεται το  $f(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ③ είτε δίνεται το  $f'(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ④ είτε η εφαπτόμενη είναι παράλληλη σε ευθεία
  - ⑤ είτε η εφαπτόμενη είναι κάθετη σε ευθεία
  - ⑥ είτε δίνεται η εφαπτόμενη
  - ⑦ είτε διέρχεται από ένα σημείο...

# Μελέτη τύπου

- ① Αν έχουμε μία συνάρτηση και ένα σημείο είναι OK
- ② Ο μόνος άγνωστος είναι το  $x_0$ 
  - ① είτε θα δίνεται
  - ② είτε δίνεται το  $f(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ③ είτε δίνεται το  $f'(x_0)$  και θα βρεθεί
  - ④ είτε η εφαπτόμενη είναι παράλληλη σε ευθεία
  - ⑤ είτε η εφαπτόμενη είναι κάθετη σε ευθεία
  - ⑥ είτε δίνεται η εφαπτόμενη
  - ⑦ είτε διέρχεται από ένα σημείο...

# Εξάσκηση 1

Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης  $\varepsilon$  της γραφικής παράστασης της συνάρτησης  $f(x) = x^2 - x + 2$  στο σημείο της με τετμημένη  $x_0 = 1$ .

## Εξάσκηση 2

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x \ln x$ . Να βρείτε την εφαπτομένη  $\varepsilon$  της  $C_f$  που σχηματίζει με τον άξονα  $x'x$  γωνία  $\omega = 45^\circ$

## Εξάσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = -x^2 + 2x$ .

- 1 Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων στη γραφική παράσταση της συνάρτησης, που διέρχονται από το σημείο  $M(1, 2)$
- 2 Να σχεδιάσετε τη  $C_f$  και να βρείτε το εμβαδόν  $E$  του τριγώνου που σχηματίζουν οι εφαπτόμενες του ερωτήματος 1, με τον άξονα  $x'x$

## Εξάσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = -x^2 + 2x$ .

- 1 Να βρείτε τις εξισώσεις των εφαπτομένων στη γραφική παράσταση της συνάρτησης, που διέρχονται από το σημείο  $M(1, 2)$
- 2 Να σχεδιάσετε τη  $C_f$  και να βρείτε το εμβαδόν  $E$  του τριγώνου που σχηματίζουν οι εφαπτόμενες του ερωτήματος 1, με τον άξονα  $x'x$



## Εξάσκηση 4

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^2 - 2x + 3$ . Να βρείτε τις τετμημένες  $x$  των σημείων της γραφικής παράστασης της  $f$  που οι εφαπτόμενες σε αυτά:

- ① Έχουν κλίση 2
- ② Σχηματίζουν με τον άξονα  $x'x$  γωνία  $\omega$  ώστε:
  - ①  $\omega = \frac{3\pi}{4}$
  - ②  $\varepsilon\varphi\omega > 1$
  - ③  $\omega$ :αμβλεία

## Εξάσκηση 4

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^2 - 2x + 3$ . Να βρείτε τις τετμημένες  $x$  των σημείων της γραφικής παράστασης της  $f$  που οι εφαπτόμενες σε αυτά:

- ① Έχουν κλίση 2
- ② Σχηματίζουν με τον άξονα  $x'x$  γωνία  $\omega$  ώστε:
  - ①  $\omega = \frac{3\pi}{4}$
  - ②  $\varepsilon_{\varphi\omega} > 1$
  - ③  $\omega$ :αμβλεία

## Εξάσκηση 4

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^2 - 2x + 3$ . Να βρείτε τις τετμημένες  $x$  των σημείων της γραφικής παράστασης της  $f$  που οι εφαπτόμενες σε αυτά:

- ① Έχουν κλίση 2
- ② Σχηματίζουν με τον άξονα  $x'x$  γωνία  $\omega$  ώστε:
  - ①  $\omega = \frac{3\pi}{4}$
  - ②  $\varepsilon\varphi\omega > 1$
  - ③  $\omega$ :αμβλεία

## Εξάσκηση 4

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^2 - 2x + 3$ . Να βρείτε τις τετμημένες  $x$  των σημείων της γραφικής παράστασης της  $f$  που οι εφαπτόμενες σε αυτά:

- ① Έχουν κλίση 2
- ② Σχηματίζουν με τον άξονα  $x'x$  γωνία  $\omega$  ώστε:
  - ①  $\omega = \frac{3\pi}{4}$
  - ②  $\varepsilon\varphi\omega > 1$
  - ③  $\omega$ :αμβλεία

## Εξάσκηση 5

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 1$ . Να βρείτε τα σημεία της  $C_f$ , που οι εφαπτόμενες σ' αυτά είναι:

- 1 Κάθετες στην ευθεία  $\varepsilon : x + 2y - 1 = 0$
- 2 Παράλληλες στον άξονα  $x'x$

## Εξάσκηση 5

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 1$ . Να βρείτε τα σημεία της  $C_f$ , που οι εφαπτόμενες σ' αυτά είναι:

- ① Κάθετες στην ευθεία  $\varepsilon : x + 2y - 1 = 0$
- ② Παράλληλες στον άξονα  $x'x$

## Εξάσκηση 6

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \alpha x^3 + \beta \ln x - \ln \beta$ . Να βρείτε τις τιμές των  $\alpha$  και  $\beta$  για τις οποίες η εφαπτομένη της  $C_f$  στο σημείο  $A(1, 1)$  έχει κλίση 4.

## Εξάσκηση 7

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^2 + x - 1$ . Να δείξετε ότι η ευθεία  $\varepsilon : y = 3x - 2$  εφάπτεται της  $C_f$  και να βρείτε το σημείο επαφής.



## Εξάσκηση 8

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^2 + \lambda x + 2$  και η ευθεία  $\varepsilon : y = -x + \lambda$ .  
Να βρείτε τις τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$ , για τις οποίες η ευθεία  $\varepsilon$  εφάπτεται  
της  $C_f$

## Εξάσκηση 9

Έστω οι συναρτήσεις  $f(x) = \alpha x^2 + \beta x + 3$  και  $g(x) = x^2 - \alpha x - \beta$ .  
Να βρείτε τις τιμές των  $\alpha$  και  $\beta$  για τις οποίες οι  $C_f$  και  $C_g$  να  
έχουν κοινή εφαπτόμενη στο σημείο τους με τετμημένη  $x_0 = -2$

## Εξάσκηση 10

Δίνονται οι συναρτήσεις  $f(x) = x^2 + 3x + 3$  και  $g(x) = -\frac{1}{x}$ . Να αποδείξετε ότι οι  $C_f$  και  $C_g$  έχουν κοινές εφαπτόμενες στα κοινά τους σημεία

## Εξάσκηση 11

Έστω οι συναρτήσεις  $f(x) = x^2 + 1$  και  $g(x) = 2x^2 + 2x$ . Να βρείτε τις κοινές εφαπτόμενες των  $C_f$  και  $C_g$

## Εξάσκηση 12

Να δείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα  $x_0 \in (0, 1)$ , ώστε η εφαπτομένη στη γραφική παράσταση της συνάρτησης  $f(x) = -2x^2 + \ln x$  στο σημείο της με τετμημένη  $x_0$ , να διέρχεται από την αρχή των αξόνων

## Εξάσκηση 13

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \frac{x^3}{3} + x - 1$ .

- 1 Να βρείτε το σύνολο τιμών της  $f'$
- 2 Να βρείτε τις δυνατές τιμές της γωνίας  $\omega$  που σχηματίζει η εφαπτόμενη της  $C_f$  στο σημείο  $M(x, f(x))$  με τον άξονα  $x'x$

## Εξάσκηση 13

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = \frac{x^3}{3} + x - 1$ .

- ① Να βρείτε το σύνολο τιμών της  $f'$
- ② Να βρείτε τις δυνατές τιμές της γωνίας  $\omega$  που σχηματίζει η εφαπτόμενη της  $C_f$  στο σημείο  $M(x, f(x))$  με τον άξονα  $x'x$

## Εξάσκηση 14

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^3 + x + 1$ .

- 1 Να δείξετε ότι η  $f$  αντιστρέφεται και να βρείτε το  $D_{f^{-1}}$
- 2 Αν θεωρήσουμε γνωστό ότι η συνάρτηση  $f^{-1}$  είναι παραγωγίσιμη, να βρείτε την εφαπτόμενη της  $C_{f^{-1}}$  στο σημείο με τετμημένη  $x_0 = 3$



## Εξάσκηση 14

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x) = x^3 + x + 1$ .

- 1 Να δείξετε ότι η  $f$  αντιστρέφεται και να βρείτε το  $D_{f^{-1}}$
- 2 Αν θεωρήσουμε γνωστό ότι η συνάρτηση  $f^{-1}$  είναι παραγωγίσιμη, να βρείτε την εφαπτόμενη της  $C_{f^{-1}}$  στο σημείο με τετμημένη  $x_0 = 3$