

Διανύσματα

Εσωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων

Κωνσταντίνος Λόλας

10^ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

Τι, δεν τελειώσαμε με τα διανύσματα?

Αν προσέχατε μιλήσαμε για:

- ① τι είναι
- ② μέτρο
- ③ άθροισμα - διαφορά
- ④ πολλαπλασιασμό με αριθμό
- ⑤ ισότητα
- ⑥ παραλληλία

Τι, δεν τελειώσαμε με τα διανύσματα?

Αν προσέχατε μιλήσαμε για:

- 1 τι είναι
- 2 μέτρο
- 3 άθροισμα - διαφορά
- 4 πολλαπλασιασμό με αριθμό
- 5 ισότητα
- 6 παραλληλία
- 7 τι έμεινε...



Τι, δεν τελειώσαμε με τα διανύσματα?

Αν προσέχατε μιλήσαμε για:

- ① τι είναι
- ② μέτρο
- ③ άθροισμα - διαφορά
- ④ πολλαπλασιασμό με αριθμό
- ⑤ ισότητα
- ⑥ παραλληλία
- ⑦ γωνίες, καθετότητα...

Νέος κόσμος

Κάθε διανυσματικός χώρος (?), εφοδιάζεται με ένα δικό του εσωτερικό γινόμενο. Για εμάς, να ναι καλά ο Ευκλείδης!

Ευκλείδειο Εσωτερικό Γινόμενο

Εστω $\vec{\alpha} = (x_\alpha, y_\alpha)$ και $\vec{\beta} = (x_\beta, y_\beta)$. Ορίζουμε εσωτερικό γινόμενο την πράξη $\mathbb{R}^2 \cdot \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = x_\alpha x_\beta + y_\alpha y_\beta$$


Η απλά για τους ποσάδες: εσωτερικό γινόμενο

Ναι αλλά πού είναι η γωνία?



Για δυνατούς λύτες

Αν μάθατε τον τύπο των συνημιτόνων:



$$|AB|^2 = |OA|^2 + |OB|^2 - 2|OA| \cdot |OB| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$$

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}^2 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}^2 + \sqrt{x_2^2 + y_2^2}^2 - 2|OA| \cdot |OB| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$$

$$-2(x_1x_2 + y_1y_2) = -2|OA| \cdot |OB| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$$

$$x_1x_2 + y_1y_2 = |OA| \cdot |OB| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$$

Τι, δεύτερος τύπος?

Στο βιβλίο τον μαθαίνετε ως πρώτο (και stick to it)

Ευκλείδειο Εσωτερικό Γινόμενο

Εστω $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ δύο μη μηδενικά διανύσματα. Ορίζουμε εσωτερικό γινόμενο την πράξη

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$$

Τι, δεύτερος τύπος?

Στο βιβλίο τον μαθαίνετε ως πρώτο (και stick to it)

Ευκλείδειο Εσωτερικό Γινόμενο

Εστω $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ δύο μη μηδενικά διανύσματα. Ορίζουμε εσωτερικό γινόμενο την πράξη

$$\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$$

Problems, problems, problems!

Τι γίνεται αν $\vec{\alpha} = \vec{0}$ ή $\vec{\beta} = \vec{0}$?

Και ναι ήρθε η ώρα!

Απλά από τον προηγούμενο τύπο $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$

- $\vec{\alpha} \uparrow\uparrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \updownarrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$
- $\vec{\alpha}^2 = |\vec{\alpha}|^2$
- $\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|}$

Και ναι ήρθε η ώρα!

Απλά από τον προηγούμενο τύπο $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$

- $\vec{\alpha} \uparrow\uparrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$
- $\vec{\alpha}^2 = |\vec{\alpha}|^2$
- $\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|}$

Και ναι ήρθε η ώρα!

Απλά από τον προηγούμενο τύπο $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$

- $\vec{\alpha} \uparrow\uparrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$
- $\vec{\alpha}^2 = |\vec{\alpha}|^2$
- $\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|}$

Και ναι ήρθε η ώρα!

Απλά από τον προηγούμενο τύπο $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sigmaυνθ$

- $\vec{\alpha} \uparrow\uparrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$
- $\vec{\alpha}^2 = |\vec{\alpha}|^2$
- $\sigmaυνθ = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|}$

Και ναι ήρθε η ώρα!

Απλά από τον προηγούμενο τύπο $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sigmaυνθ$

- $\vec{\alpha} \uparrow\uparrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$
- $\vec{\alpha}^2 = |\vec{\alpha}|^2$ και το αστέρι μας...

- $\sigmaυνθ = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|}$

Και ναι ήρθε η ώρα!

Απλά από τον προηγούμενο τύπο $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \sigma\upsilon\nu\theta$

- $\vec{\alpha} \uparrow\uparrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = |\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|$
- $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta} \iff \vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = 0$
- $\vec{\alpha}^2 = |\vec{\alpha}|^2$
- $\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta}}{|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}|}$

Και λίγο ιδιότητες της νέας πράξης

Η αποδείξεις είναι απλές...

- $\vec{\alpha}(\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{\alpha}\vec{\beta} + \vec{\alpha}\vec{\gamma}$ (Επιμεριστική)
- $\vec{\alpha}\vec{\beta} = \vec{\beta}\vec{\alpha}$ (Αντιμεταθετική)
- $\lambda(\vec{\alpha}\vec{\beta}) = \vec{\alpha}(\lambda\vec{\beta}) = \lambda\vec{\alpha}\vec{\beta}$ (Προσεταιριστική με πραγματικό)
- Γενικά $\vec{\alpha}(\vec{\beta}\vec{\gamma}) \neq (\vec{\alpha}\vec{\beta})\vec{\gamma}$, αλλά γιατί?

Και λίγο ιδιότητες της νέας πράξης

Η αποδείξεις είναι απλές...

- $\vec{\alpha}(\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{\alpha}\vec{\beta} + \vec{\alpha}\vec{\gamma}$ (Επιμεριστική)
- $\vec{\alpha}\vec{\beta} = \vec{\beta}\vec{\alpha}$ (Αντιμεταθετική)
- $\lambda(\vec{\alpha}\vec{\beta}) = \vec{\alpha}(\lambda\vec{\beta}) = \lambda\vec{\alpha}\vec{\beta}$ (Προσεταιριστική με πραγματικό)
- Γενικά $\vec{\alpha}(\vec{\beta}\vec{\gamma}) \neq (\vec{\alpha}\vec{\beta})\vec{\gamma}$, αλλά γιατί?

Και λίγο ιδιότητες της νέας πράξης

Η αποδείξεις είναι απλές...

- $\vec{\alpha}(\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{\alpha}\vec{\beta} + \vec{\alpha}\vec{\gamma}$ (Επιμεριστική)
- $\vec{\alpha}\vec{\beta} = \vec{\beta}\vec{\alpha}$ (Αντιμεταθετική)
- $\lambda(\vec{\alpha}\vec{\beta}) = \vec{\alpha}(\lambda\vec{\beta}) = \lambda\vec{\alpha}\vec{\beta}$ (Προσεταιριστική με πραγματικό)
- Γενικά $\vec{\alpha}(\vec{\beta}\vec{\gamma}) \neq (\vec{\alpha}\vec{\beta})\vec{\gamma}$, αλλά γιατί?

Και λίγο ιδιότητες της νέας πράξης

Η αποδείξεις είναι απλές...

- $\vec{\alpha}(\vec{\beta} + \vec{\gamma}) = \vec{\alpha}\vec{\beta} + \vec{\alpha}\vec{\gamma}$ (Επιμεριστική)
- $\vec{\alpha}\vec{\beta} = \vec{\beta}\vec{\alpha}$ (Αντιμεταθετική)
- $\lambda(\vec{\alpha}\vec{\beta}) = \vec{\alpha}(\lambda\vec{\beta}) = \lambda\vec{\alpha}\vec{\beta}$ (Προσεταιριστική με πραγματικό)
- Γενικά $\vec{\alpha}(\vec{\beta}\vec{\gamma}) \neq (\vec{\alpha}\vec{\beta})\vec{\gamma}$, αλλά γιατί?



Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση

Εξάσκηση 1

Δίνονται δύο διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{\alpha}| = 2, |\vec{\beta}| = 1$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{3}$. Να υπολογίσετε:

1 $\vec{\alpha}\vec{\beta}$

2 $\vec{\alpha}^2$

Εξάσκηση 1

Δίνονται δύο διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{\alpha}| = 2, |\vec{\beta}| = 1$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{3}$. Να υπολογίσετε:

- ① $\vec{\alpha}\vec{\beta}$
- ② $\vec{\alpha}^2$

Εξάσκηση 2

Αν $\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\beta}$, $|\vec{\alpha}| = 3$ και $\vec{\alpha}\vec{\beta} = -6$, να βρείτε το $|\vec{\beta}|$

Εξάσκηση 3

Αν $\vec{\alpha} \perp \vec{\beta}$, $\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\gamma}$ και $|\vec{\alpha}| = |\vec{\gamma}| = 1$, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

$$(\vec{\alpha}\vec{\beta})^{2023} + |\vec{\alpha}\vec{\gamma}|$$

Εξάσκηση 4

Αν $\vec{\alpha} = (2, 3)$ και $\vec{\beta} = (4, 5)$ να υπολογίσετε τα:

① $\vec{\alpha}\vec{\beta}$

② $\vec{\alpha}^2$

Εξάσκηση 4

Αν $\vec{\alpha} = (2, 3)$ και $\vec{\beta} = (4, 5)$ να υπολογίσετε τα:

① $\vec{\alpha}\vec{\beta}$

② $\vec{\alpha}^2$

Εξάσκηση 5

Αν τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (x - 1, -4)$, $\vec{\beta} = (6, x)$ είναι κάθετα, να βρείτε το x

Εξάσκηση 6

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (1, 3)$, $\vec{\beta} = (1, -2)$ και $\vec{\gamma} = (4, -3)$. Να βρείτε διάνυσμα $\vec{v} = \kappa\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}$, ώστε να είναι κάθετο στο $\vec{\gamma}$ και να έχει μέτρο 5.

Εξάσκηση 7

Δίνονται δύο διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{\alpha}| = 2, |\vec{\beta}| = 3$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{2\pi}{3}$. Να υπολογίσετε:

① $(\vec{\alpha} - 2\vec{\beta})(3\vec{\alpha} + \vec{\beta})$

② $(3\vec{\alpha} - \vec{\beta})^2$

Εξάσκηση 7

Δίνονται δύο διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{\alpha}| = 2, |\vec{\beta}| = 3$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{2\pi}{3}$. Να υπολογίσετε:

- ① $(\vec{\alpha} - 2\vec{\beta})(3\vec{\alpha} + \vec{\beta})$
- ② $(3\vec{\alpha} - \vec{\beta})^2$

Εξάσκηση 8

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (-2, 1)$, $\vec{\beta} = (3, 1)$ και $\vec{\gamma} = (0, -3)$. Να βρείτε τα:

- ① $(3\vec{\alpha})(-\vec{\gamma})$
- ② $\vec{\alpha}(\vec{\beta} - 2\vec{\gamma})$
- ③ $(|\vec{\gamma}\vec{\alpha}|)\vec{\beta}$

Εξάσκηση 8

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (-2, 1)$, $\vec{\beta} = (3, 1)$ και $\vec{\gamma} = (0, -3)$. Να βρείτε τα:

- ① $(3\vec{\alpha})(-\vec{\gamma})$
- ② $\vec{\alpha}(\vec{\beta} - 2\vec{\gamma})$
- ③ $(|\vec{\gamma}\vec{\alpha}|)\vec{\beta}$

Εξάσκηση 8

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha} = (-2, 1)$, $\vec{\beta} = (3, 1)$ και $\vec{\gamma} = (0, -3)$. Να βρείτε τα:

- ① $(3\vec{\alpha})(-\vec{\gamma})$
- ② $\vec{\alpha}(\vec{\beta} - 2\vec{\gamma})$
- ③ $(|\vec{\gamma}\vec{\alpha}|)\vec{\beta}$

Εξάσκηση 9

Δίνονται δύο κάθετα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ με $|\vec{\alpha}| = \sqrt{2}$, $|\vec{\beta}| = \sqrt{3}$. Να δείξετε ότι τα διανύσματα $\vec{v} = \vec{\alpha} - 2\vec{\beta}$ και $\vec{u} = 3\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ είναι κάθετα.

Εξάσκηση 10

Αν $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 3$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{5\pi}{6}$. Να βρείτε το μέτρο του διανύσματος

$$\vec{v} = 2\vec{\alpha} - 3\vec{\beta}$$

Εξάσκηση 11

Δίνονται δύο διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ για τα οποία ισχύουν $|\vec{\alpha}| = 1, |\vec{\beta}| = \sqrt{2}$ και $(\vec{\alpha}, \vec{\beta}) = 45^\circ$ και το παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $\widehat{AB} = \lambda\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ και $\widehat{A\Delta} = \vec{\alpha} + \vec{\beta}$. Να βρείτε το λ ώστε το μήκος της διαγωνίου AG να είναι 2.

Εξάσκηση 12

- ① Αν \vec{v} και \vec{u} δύο διανύσματα, να αποδείξετε ότι

$$|\vec{v} + \vec{u}|^2 + |\vec{v} - \vec{u}|^2 = 2|\vec{v}|^2 + 2|\vec{u}|^2$$

- ② Αν για τα διανύσματα \vec{v} και \vec{u} ισχύουν $|\vec{v}| = 1$, $|\vec{u}| = 2$ και $|\vec{v} + \vec{u}| = 3$, να βρείτε το $|\vec{v} - \vec{u}|$

Εξάσκηση 12

- ① Αν \vec{v} και \vec{u} δύο διανύσματα, να αποδείξετε ότι

$$|\vec{v} + \vec{u}|^2 + |\vec{v} - \vec{u}|^2 = 2|\vec{v}|^2 + 2|\vec{u}|^2$$

- ② Αν για τα διανύσματα \vec{v} και \vec{u} ισχύουν $|\vec{v}| = 1$, $|\vec{u}| = 2$ και $|\vec{v} + \vec{u}| = 3$, να βρείτε το $|\vec{v} - \vec{u}|$

Εξάσκηση 13

Αν $|\vec{\alpha}| = 1$, $|\vec{\beta}| = 2$ και $|\vec{\alpha} - \vec{\beta}| = \sqrt{7}$. Να βρείτε τη γωνία των διανυσμάτων $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})}$

Εξάσκηση 14

Δίνονται τα σημεία $A(-3, 2)$ και $B(1, -2)$. Να βρείτε σημείο M του άξονα $y'y$, ώστε το τρίγωνο MAB να είναι ισοσκελές με βάση την AB

Εξάσκηση 15

Δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, όπου το $\vec{\alpha}$ είναι μοναδιαίο, $|\vec{\beta}| = 2$ και η γωνία των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\alpha}$ είναι 120° . Να βρείτε την γωνία των διανυσμάτων $\vec{\delta}$ και $\vec{\alpha}$, όπου $\vec{\delta} = 2\vec{\alpha} - \vec{\beta}$.

Εξάσκηση 16

Αν $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 1$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{2\pi}{3}$ και $\vec{\alpha} + 2\vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$, να υπολογίσετε:

- ① το μέτρο του $\vec{\gamma}$
- ② την τιμή της παράστασης $\vec{\alpha}\vec{\gamma} + \vec{\beta}\vec{\gamma}$

Εξάσκηση 16

Αν $|\vec{\alpha}| = 2$, $|\vec{\beta}| = 1$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{2\pi}{3}$ και $\vec{\alpha} + 2\vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$, να υπολογίσετε:

- ① το μέτρο του $\vec{\gamma}$
- ② την τιμή της παράστασης $\vec{\alpha}\vec{\gamma} + \vec{\beta}\vec{\gamma}$

Εξάσκηση 17

Αν για τα μη μηδενικά διανύσματα $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$, ισχύουν

$$\frac{|\vec{\alpha}|}{2} = \frac{2|\vec{\beta}|}{3} = \frac{|\vec{\gamma}|}{5} \text{ και } \vec{\alpha} - 2\vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$$

να αποδείξετε ότι:

① $\vec{\alpha} = -\frac{4}{3}\vec{\beta}$

② $\vec{\beta} \parallel \vec{\gamma}$

Εξάσκηση 17

Αν για τα μη μηδενικά διανύσματα $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$, ισχύουν

$$\frac{|\vec{\alpha}|}{2} = \frac{2|\vec{\beta}|}{3} = \frac{|\vec{\gamma}|}{5} \text{ και } \vec{\alpha} - 2\vec{\beta} + \vec{\gamma} = \vec{0}$$

να αποδείξετε ότι:

$$\textcircled{1} \quad \vec{\alpha} = -\frac{4}{3}\vec{\beta}$$

$$\textcircled{2} \quad \vec{\beta} \parallel \vec{\gamma}$$

Εξάσκηση 18

Εστω τα διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ με $|\vec{\alpha}| = 2, |\vec{\beta}| = 1$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{2\pi}{3}$

- ① Να αποδείξετε ότι: $\vec{\alpha} - 2\vec{\beta} \neq \vec{0}$
- ② Να βρείτε διάνυσμα \vec{x} , ώστε:
 - $\vec{x} \parallel (\vec{\alpha} - 2\vec{\beta})$ και
 - $\vec{\beta} \perp (\vec{\alpha} - \vec{x})$

Εξάσκηση 18

Εστω τα διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ με $|\vec{\alpha}| = 2, |\vec{\beta}| = 1$ και $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{2\pi}{3}$

- ① Να αποδείξετε ότι: $\vec{\alpha} - 2\vec{\beta} \neq \vec{0}$
- ② Να βρείτε διάνυσμα \vec{x} , ώστε:
 - $\vec{x} \parallel (\vec{\alpha} - 2\vec{\beta})$ και
 - $\vec{\beta} \perp (\vec{\alpha} - \vec{x})$

Εξάσκηση 19

Αν $\vec{\alpha} = (x, 3)$ και $\vec{\beta} = (1, 7)$, να βρείτε την τιμή του x ώστε $\widehat{(\vec{\alpha}, \vec{\beta})} = \frac{\pi}{4}$

Εξάσκηση 20

Δίνονται τα σταθερά σημεία Α και Β. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων Μ του επιπέδου, για τα οποία ισχύει

$$|\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}| = \sqrt{\overrightarrow{MA}^2 + 4\overrightarrow{MB}^2}$$

Εξάσκηση 21

Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $(AB) = 6$. Να βρείτε το γεωμετρικό τόπο των σημείων M του επιπέδου, για τα οποία ισχύει:

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{M\Gamma} = 7 + \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{B\Gamma}$$