CALCUL LITTÉRAL

Cours — Seconde

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. En calcul littéral, on écrit toutes les étapes : une ligne sautée est la première cause d'erreur de signe.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Réduire, substituer

Définition 1 — Termes semblables

Dans une **expression littérale**, des lettres remplacent des nombres. On n'écrit pas le $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $5 \times x = 5x$; de plus $1x = x$ et $x \times x = x^2$.

Des termes **semblables** ont la même partie littérale : $4x$ et $-9x$ sont semblables ; $3x^2$ et $3x$ ne le sont pas.

Propriété 1 — Réduire

Réduire une somme, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs nombres : $6a + 1 + 4a = 10a + 1$. **Réduire un produit**, c'est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles : $3x \times (-2x) = -6x^2$.

On peut **toujours** réduire un produit. On ne peut **pas toujours** réduire une somme : $5 + 2x$ n'a pas de termes semblables, elle reste ainsi.

Trois pièges

$5 + 2x$ ne se réduit pas ; $5x + 2x = 7x$, mais $5x \times 2x = 10x^2$; $x^2 + x^2 = 2x^2$, et non x^4.

Méthode 1 — Réduire une expression

Exemples *(au tableau)*

Réduire :

a) $A = 4x + 7 - 9x + 3$

b) $B = 2x^2 + 5x - x^2 - 3x$

c) $C = 5x \times (-2x)$

À vous de jouer

Réduire, si possible :

$$D = 7a - 5 + 2a - 8 \qquad E = -4y^2 + 5y - 3y^2 - 5y + 2 \qquad F = 4x \times 7x$$

$$G = -5 \times (-3x) \qquad H = 5 + 2x \qquad K = x^2 + 5x^2$$

Méthode 2 — Substituer

Substituer, c'est remplacer la lettre par une valeur : on l'écrit **entre parenthèses**, on rétablit les $\times$, puis on calcule avec les priorités.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exemples *(au tableau)*

Calculer $B = 2x^2 - 5x + 3$ pour $x = 4$, pour $x = -1$, puis pour $x = \frac{1}{2}$.

À vous de jouer

1°) Calculer $E = -x^2 + 4x - 2$ pour $x = 3$, pour $x = -2$, puis pour $x = \frac{1}{2}$.

2°) Calculer $F = 3x^2 - x + 5$ pour $x = 2$, puis pour $x = -1$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Développer

Propriété 2 — Distributivité

Développer, c'est transformer un produit en une somme. Pour tous nombres k, a, b, c, d :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad k(a-b) = ka - kb \qquad (a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

Un signe $-$ devant une parenthèse change le signe de chaque terme : $-(a-b) = -a + b$. Pour soustraire un produit, on le développe d'abord **entre crochets**.

Méthode 3 — Développer et réduire

Exemples *(au tableau)*

Développer et réduire :

a) $A = -4(3x - 2)$

b) $B = (2x + 5) \times 3$

c) $C = 7 - (2x - 3)$

d) $D = 3x(2x - 5) + 4x$

e) $E = (3x + 2)(x - 5)$

f) $F = 4x^2 - (3x - 2)(x + 4)$

g) $G = 3(x + 2)(x - 4)$

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$H = -6(2x - 3) \qquad K = (3x + 5) \times 4 \qquad L = 9 - (5x - 2) \qquad M = 2x(4x + 3) - 5x$$

$$N = (2x - 3)(5x + 1) \qquad P = 3x - (x - 4)(2x + 3) \qquad Q = 2(x - 3)(x + 5)$$

$$R = (3x + 1)(x + 2) - (x - 4)(2x + 1)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 5 à 9.

III — Identités remarquables

Propriété 3 — Identités remarquables

Pour tous nombres a et b :

- 1re identité remarquable : $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;
- 2e identité remarquable : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
- 3e identité remarquable : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Démonstration. $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2+ab+ba+b^2$, soit $a^2+2ab+b^2$; les deux autres se démontrent de même.

L'erreur la plus fréquente

$(a+b)^2 \neq a^2+b^2$: on oublie le **double produit** $2ab$. Par exemple $(2+5)^2 = 49$, alors que $2^2+5^2 = 29$.

Méthode 4 — Développer avec une identité remarquable

Exemples *(au tableau)*

Développer :

a) $(x-4)^2$

b) $(5x+2)^2$

c) $(3x-1)(3x+1)$

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$A = (x+7)^2 \qquad B = (4x-3)^2 \qquad C = (2-5x)^2$$
$$D = (6x+5)(6x-5) \qquad E = (3x+2)^2-(x-2)(x+2)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 13.

IV — Factoriser

Définition 2 — Factoriser

Factoriser, c'est transformer une somme en un produit : c'est l'inverse de développer. Le facteur présent dans chaque terme est le **facteur commun** :

$$\underbrace{ka+kb}_{\text{forme développée}} \underset{\text{développer}}{\overset{\text{factoriser}}{\rightleftarrows}} \underbrace{k(a+b)}_{\text{forme factorisée}}$$

Méthode 5 — Factoriser avec un facteur commun

On repère le facteur commun (un nombre, x ou une parenthèse entière), au besoin en décomposant chaque terme (les tables de multiplication à l'envers), puis on écrit ce qui reste de chaque terme entre crochets, avec son signe.

Exemples *(au tableau)*

Factoriser :

a) $A = 15x+20$

b) $B = 7x^2-2x$

c) $C = (3x+2)(x-1)+(3x+2)(2x+5)$

d) $D = (x+4)(3x-2)-(x+4)(x-5)$

Remarque

On factorise le plus possible : $8x^2-12x = x(8x-12)$ est juste mais incomplet ; on écrit $8x^2-12x = 4x(2x-3)$.

À vous de jouer

Factoriser :

$$E = 6\times x-6\times 5 \qquad F = 10a-15b \qquad G = 9x^2+4x \qquad H = 10x^2-15x$$

$$K = (3x-2)(x+4)+(3x-2)(2x-5) \qquad L = (x-3)(4x+1)-(x-3)(x-4)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 16.

V — Factoriser avec une identité remarquable

Propriété 4 — Les identités, de droite à gauche

$$a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2 \qquad a^2-2ab+b^2 = (a-b)^2 \qquad a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$$

Méthode 6 — Reconnaître une identité remarquable

Deux carrés séparés par un $-$: c'est a^2-b^2. Trois termes dont deux carrés : on trouve d'abord a et b, puis on **contrôle le double produit** $2ab$.

Exemples *(au tableau)*

Factoriser :

a) $A = x^2-36$

b) $B = 9x^2-49$

c) $C = 16x^2+24x+9$

d) $D = 25x^2-20x+4$

Ce qui ne se factorise pas

Une somme de deux carrés comme $4x^2+25$; ou $4x^2-10x+25$: $(2x)^2$ et 5^2, mais $2\times 2x\times 5 = 20x \neq 10x$.

À vous de jouer

Factoriser, si possible :

$$E = 49x^2-1 \qquad F = 4-25x^2 \qquad G = x^2+10x+25$$
$$H = 9x^2-12x+4 \qquad K = 16x^2+9 \qquad L = 25-30x+9x^2$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

VI — Factorisations avancées

Propriété 5 — Faire apparaître le facteur commun

- Une identité sur des expressions : $(\dots)^2-(\dots)^2$, avec a et b entre crochets.
- Le « 1 » caché : $(x+4) = 1\times(x+4)$; il reste 1 dans le crochet, pas 0.
- Des facteurs opposés : $3-x = -(x-3)$.
- Une identité dans un seul morceau : $x^2-16 = (x+4)(x-4)$ fait apparaître $(x+4)$.

Méthode 7 — Choisir une stratégie de factorisation

Exemples *(au tableau)*

Factoriser :

a) $A = (x+5)^2-16$

b) $B = 3(x+1)(x+4)-(x+4)$

c) $C = (2x+1)(x-3)+x(3-x)$

d) $D = x^2-16+(x+4)(3x-1)$

À vous de jouer

Factoriser :

$$E = (2x+3)^2 - (x-1)^2 \qquad F = (x+2)^2 + (x+2)(3x-5) \qquad G = (6x-4)(x+2) + (3x-2)(x-1)$$

$$H = (4x-1) - 3(4x-1)^2 \qquad K = 9x^2 - 1 - (3x-1)(x+2)$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 23.

VII — Fractions rationnelles

Définition 3 — Fraction rationnelle, valeur interdite

Une **fraction rationnelle** est un quotient d'expressions dont le dénominateur contient la lettre : $\dfrac{x-1}{x+3}$, $\dfrac{2}{5-x}$.

Une valeur de x qui **annule le dénominateur** est **interdite** : pour $\dfrac{x-1}{x+3}$, c'est -3.

Propriété 6 — Mêmes règles que les fractions de nombres

Pour b et d non nuls : $\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{a\times d}{b\times d} + \dfrac{c\times b}{d\times b}$. On ne simplifie que des facteurs : $\dfrac{x+5}{5} \neq x$.

Méthode 8 — Écrire avec une seule fraction

On donne les valeurs interdites, on met au même dénominateur, puis on réduit le numérateur seulement.

Exemples *(au tableau)*

Donner les valeurs interdites, puis écrire avec une seule fraction :

a) $A = 2 + \dfrac{3x}{x+2}$

b) $B = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+2}$

À vous de jouer

1°) Donner les valeurs interdites, puis écrire avec une seule fraction : $C = \dfrac{3}{x} + \dfrac{1}{2}$ $D = \dfrac{3}{x-2} - \dfrac{2}{x+1}$ $E = x - \dfrac{4}{x}$

2°) **Bonus.** À l'aide de B, calculer $\dfrac{2}{1\times 3} + \dfrac{2}{3\times 5} + \dfrac{2}{5\times 7} + \cdots + \dfrac{2}{99\times 101}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

VIII — Équations du premier degré

Définition 4 — Équation, solution

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu. Une **solution** est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. Résoudre, c'est trouver toutes les solutions ; on les écrit dans l'ensemble S.

Propriété 7 — Règles de résolution

On garde les mêmes solutions en ajoutant (ou soustrayant) un même nombre aux deux membres, et en multipliant (ou divisant) les deux membres par un même nombre **non nul**. On se ramène à $ax = b$:

- si $a \neq 0$: $S = \left\{\dfrac{b}{a}\right\}$;
- si $a = 0$ et $b \neq 0$ ($0x = b$ est toujours faux) : $S = \varnothing$;
- si $a = 0$ et $b = 0$ ($0x = 0$ est toujours vrai) : $S = \mathbb{R}$.

Méthode 9 — Résoudre une équation du premier degré

On supprime les parenthèses, puis les fractions (on multiplie **chaque terme** par le dénominateur commun), on regroupe les x d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de x.

Exemples *(au tableau)*

Résoudre :

a) $4x - 5 = 9 - 2(3-x)$

b) $\dfrac{x}{3} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{x-1}{6} + 3$

c) $3(x+2) + 1 - 5x = 2(4-x) + 3$

> **Égalité de deux fractions**
>
> Pour $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$, le produit en croix (chapitre 1) donne directement $a \times d = b \times c$.

À vous de jouer

Résoudre :

$$1°)\ 5x - 4 = 2x + 14 \qquad 2°)\ 2(x-3) - (x+5) = 4x - 2 \qquad 3°)\ \frac{7}{6} - \frac{x}{4} = \frac{1}{3}$$

$$4°)\ \frac{x+2}{3} = \frac{3x-1}{4} \qquad 5°)\ 2(3x+5) - 4x = 12 - 2(1-x)$$

Méthode 10 — Inconnue au dénominateur

On donne les valeurs interdites, on fait un produit en croix, on résout, puis on vérifie que la solution n'est pas interdite.

Exemples *(au tableau)*

Résoudre $\dfrac{3x-2}{x-2} = \dfrac{5}{2}$.

À vous de jouer

Résoudre $\dfrac{3x+1}{x+2} = 2$ puis $\dfrac{4}{x+3} = \dfrac{1}{x}$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 33.

IX — Équations produit

Propriété 8 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

Méthode 11 — Résoudre une équation produit, ou s'y ramener

On met tout dans le membre de gauche ($\ldots = 0$), on factorise, puis on écrit « facteur $= 0$ » pour chaque facteur.

Exemples *(au tableau)*

Résoudre :

a) $(x+3)(3x-7)=0$
b) $4x^2-6x=0$
c) $(x+2)(3x-1)=(x+2)(x+5)$
d) $(2x-1)^2-9=0$

À vous de jouer

Résoudre :

1°) $(4x-3)(5-2x)=0$ 2°) $2x^2+8x=0$
3°) $(x+4)(3x-2)-(1-x)(3x-2)=0$ 4°) $(x-2)(2x+1)=3(2x+1)$

Méthode 12 — Choisir la forme adaptée

Pour calculer une image : la forme où le calcul est le plus simple ; pour $f(x)=0$: la forme factorisée ; pour $f(x)=k$: la forme où les nombres s'éliminent.

Exemples *(au tableau)*

Soit $f(x)=(x+1)^2-9$.

a) Développer, puis factoriser $f(x)$.
b) Calculer $f(0)$, puis résoudre $f(x)=0$, $f(x)=-8$ et $f(x)=-9$.

À vous de jouer

Soit $g(x)=(2x-1)^2-16$.

1°) Développer, puis factoriser $g(x)$.
2°) Avec la forme adaptée : calculer $g(0)$; résoudre $g(x)=0$, $g(x)=-15$ et $g(x)=-16$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 38.

X — Équations $x^2=a$ et équations quotient

Propriété 9 — Deux cas particuliers

- $x^2=a$: pas de solution si $a<0$ (un carré est positif) ; la seule solution 0 si $a=0$; deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a>0$.
- $\dfrac{A}{B}=0$ équivaut à $A=0$ et $B\neq 0$: un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul.

Pourquoi deux solutions ?

$5^2=25$ et $(-5)^2=25$: deux nombres opposés ont le même carré. En factorisant : $x^2-25=(x-5)(x+5)$.

Méthode 13 — Résoudre $x^2=a$

Exemples *(au tableau)*

Résoudre :

a) $x^2=25$
b) $x^2=-3$
c) $3x^2-15=0$
d) $(x-1)^2=16$

À vous de jouer

Résoudre :

$x^2=64$ $x^2+9=0$ $2x^2=72$ $(x+2)^2=9$

Méthode 14 — Résoudre une équation quotient $A/B=0$

On cherche d'abord la valeur interdite ($B=0$), puis on résout $A=0$, et on retire la valeur interdite des solutions.

Exemples *(au tableau)*

Résoudre :

a) $\dfrac{2x-5}{x+3}=0$
b) $\dfrac{x^2-16}{x-4}=0$

À vous de jouer

Résoudre :

$\dfrac{(3x-1)(x+5)}{x-2}=0$ $\dfrac{x^2-1}{x+1}=0$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

XI — Mise en équation

Méthode 15 — Résoudre un problème par une équation

On choisit l'inconnue et on l'annonce (« Soit x … »), on traduit l'énoncé par une équation, on la résout, puis on conclut par une phrase, après avoir vérifié que le résultat a un sens.

Exemples *(au tableau)*

a) Trois amies vendent des gâteaux pour financer une sortie. Léa récolte 30 € de plus que Nina, et Inès le double de Léa. À elles trois, elles récoltent 330 €. Combien chacune a-t-elle récolté ?
b) Une salle d'escalade propose deux tarifs : 12 € l'entrée, ou un abonnement de 40 € puis 7 € l'entrée. Pour combien d'entrées les deux tarifs coûtent-ils autant ?

À vous de jouer

1°) La somme de trois entiers consécutifs vaut 258. Quels sont-ils ?
2°) Un classeur coûte 2 € de plus qu'un cahier. Quatre cahiers et trois classeurs coûtent 27 €. Quel est le prix d'un cahier ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.


XII — Problèmes de géométrie

Méthode 16 — Mettre en équation un problème de géométrie

On place x sur la figure et on précise ses valeurs possibles, on exprime les longueurs, puis les aires ou les périmètres, on écrit l'équation et on la résout ; souvent, les x^2 s'éliminent. On vérifie enfin que la solution est possible.

Exemples *(au tableau)*

a) Un rectangle a pour longueur 10 cm et pour largeur x cm ; un carré a pour côté $x+3$ cm. Pour quelle valeur de x ont-ils le même périmètre ?
b) Le rectangle $ABCD$ a pour dimensions $AB=3$ cm et $BC=6$ cm. Le point M est sur $[AB]$ avec $AM=x$ ($x\neq 0$). On construit le carré $AMNP$ et le rectangle $NQCR$ (figure). Où placer M pour que le carré et le rectangle aient la même aire ?



À vous de jouer

1°) La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 5 cm, et son périmètre vaut 42 cm. Quelles sont ses dimensions ?

2°) Quand on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire augmente de 32 cm^2. Quelle est l'aire du carré de départ ?

3°) Un rectangle a pour dimensions $x+8$ et x ; un carré a pour côté $x+3$ (en cm, $x > 0$). a) Pour quelle valeur de x ont-ils la même aire ? b) Peuvent-ils avoir le même périmètre ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 50.

XIII — Isoler une grandeur

Définition 5 — Isoler une grandeur

Une formule relie plusieurs grandeurs. **Isoler** une grandeur, c'est réécrire la formule sous la forme « grandeur = … » : on résout une équation dont l'inconnue est cette grandeur, les autres lettres jouant le rôle de nombres connus.

Méthode 17 — Isoler une grandeur

On ajoute, on soustrait, on multiplie ou on divise les deux membres par une même quantité non nulle ; pour deux fractions égales, le produit en croix est souvent le plus rapide ; pour une grandeur positive au carré, on finit par une racine carrée.

Exemples *(au tableau)*

a) Puissance $P = \dfrac{W}{t}$: isoler W, puis t.

b) $\dfrac{h}{H} = \dfrac{\ell}{L}$: isoler L.

c) Périmètre d'un triangle isocèle $P = 2a + b$: isoler a.

d) Volume d'un cône $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$: isoler le rayon r.

À vous de jouer

1°) Loi d'Ohm $U = RI$: isoler I, puis R.

2°) Périmètre d'un cercle $C = 2\pi r$: isoler r.

3°) Masse volumique $\rho = \dfrac{m}{V}$: isoler m, puis V.

4°) Aire d'un trapèze $\mathcal{A} = \dfrac{(B+b)\times h}{2}$: isoler h.

5°) Conversion des températures $F = \dfrac{9}{5}C + 32$: isoler C.

6°) Énergie cinétique $E = \dfrac{1}{2}mv^2$: isoler v (avec $v > 0$).

7°) On a $3x - 2y + 5z = 12$. Exprimer x en fonction de y et z, puis calculer x pour $y = 3$ et $z = 0$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 51 à 54 ; pour préparer le devoir commun : exercices 55 à 60.