POURCENTAGES

Cours — Seconde

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples corrigés** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

I — Appliquer et calculer un pourcentage

Définition 1 — Prendre un pourcentage

Prendre t % d'une quantité, c'est multiplier cette quantité par $\dfrac{t}{100}$.

Par exemple, 20 % de 45 : $\dfrac{20}{100} \times 45 = 0{,}2 \times 45 = 9$.

Remarque

100 % d'une quantité, c'est toute la quantité ; 50 %, c'est la moitié ; 25 %, le quart ; 200 %, le double.

Méthode 1 — Appliquer un pourcentage

Exemples corrigés

a) Un lycée compte 1 250 élèves, dont 36 % sont demi-pensionnaires. Combien d'élèves sont demi-pensionnaires ?

b) Une console de jeux coûte 380 € ; elle a une réduction de 15 %. Calculer le montant de la réduction, puis le prix payé.

c) Calculer 4,5 % de 2 000, puis 150 % de 40.

a)

$$36\,\%\text{ de }1\,250 = \frac{36}{100} \times 1\,250 \qquad \textit{prendre 36 \%, c'est multiplier par } \frac{36}{100}$$

$$36\,\%\text{ de }1\,250 = 0{,}36 \times 1\,250 \qquad \frac{36}{100} = 0{,}36$$

$$36\,\%\text{ de }1\,250 = 450$$

Le lycée compte 450 demi-pensionnaires. *on conclut par une phrase*

b)

$$\text{réduction} = 15\,\%\text{ de }380 \qquad \textit{la réduction est 15 \% du prix}$$

$$\text{réduction} = 0{,}15 \times 380 \qquad \frac{15}{100} = 0{,}15$$

$$\text{réduction} = 57$$

$$\text{prix payé} = 380 - 57 \qquad \textit{on retire la réduction du prix}$$

$$\text{prix payé} = 323$$

La réduction est de 57 € ; la console est payée 323 €. *une phrase par question*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

c)

$4{,}5\,\%$ de $2\,000 = 0{,}045 \times 2\,000$ $\quad \frac{4{,}5}{100} = 0{,}045$

$4{,}5\,\%$ de $2\,000 = 90$

$150\,\%$ de $40 = 1{,}5 \times 40$ $\quad \frac{150}{100} = 1{,}5$ *: plus de 100 %, plus que 40*

$150\,\%$ de $40 = 60$

À vous de jouer

a) Un village compte 1 400 habitants, dont 45 % ont moins de 30 ans. Combien d'habitants ont moins de 30 ans ?

b) Un jean coûte 60 € ; il a une réduction de 30 %. Calculer le montant de la réduction, puis le prix payé.

c) Calculer 2,5 % de 800, puis 120 % de 35.

Réponses : a) 630 habitants ; b) réduction 18 €, prix payé 42 € ; c) 20 et 42.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 et 2.

Propriété 1 — Quel pourcentage ?

Dans un groupe de N individus, n ont un caractère commun. Ils représentent $\frac{n}{N}$ du groupe ; écrit en centièmes, ce quotient donne le pourcentage.

Par exemple, 3 élèves sur 4 : $\frac{3}{4} = 0{,}75 = \frac{75}{100} = 75\,\%$.

Méthode 2 — Calculer un pourcentage

Exemples corrigés

a) Dans une classe de 25 élèves, 9 font du théâtre. Quel pourcentage des élèves font du théâtre ?

b) Sur un salaire de 1 600 €, Inès paie un loyer de 520 €. Quel pourcentage de son salaire représente son loyer ?

c) Le club de foot A compte 18 filles sur 40 licenciés ; le club B, 27 filles sur 75 licenciés. Quel club a la plus forte part de filles ?

a)

$\frac{9}{25} = 0{,}36$ *les 9 élèves, divisés par l'effectif de la classe*

$\frac{9}{25} = 36\,\%$ $\quad 0{,}36 = \frac{36}{100}$

36 % des élèves font du théâtre. *on conclut par une phrase*

b)

$\frac{520}{1\,600} = 0{,}325$ *le loyer, divisé par le salaire (calculatrice)*

$\frac{520}{1\,600} = 32{,}5\,\%$ $\quad 0{,}325 = \frac{32{,}5}{100}$

Le loyer représente 32,5 % du salaire. *on conclut par une phrase*

c)

$\frac{18}{40} = 0{,}45$ *club A*

$\frac{18}{40} = 45\,\%$

$\frac{27}{75} = 0{,}36$ *club B*

$\frac{27}{75} = 36\,\%$

$45\,\% > 36\,\%$: le club A a la plus forte part de filles, alors qu'il en compte moins. *on compare les pourcentages, pas les effectifs*

À vous de jouer

a) Dans une classe de 35 élèves, 21 viennent au lycée en bus. Quel pourcentage des élèves vient en bus ?

b) Sur un budget mensuel de 1 850 €, une famille dépense 296 € en transports. Quel pourcentage du budget représentent les transports ?

c) Le lycée A compte 84 internes sur 600 élèves ; le lycée B, 117 internes sur 900 élèves. Quel lycée a la plus forte part d'internes ?

Réponses : a) 60 % ; b) 16 % ; c) A : 14 % et B : 13 %, donc le lycée A.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 3 à 6.

II — Proportions


Définition 2 — Proportion

La **population de référence** est le groupe entier, d'effectif N ; une **sous-population** en est une partie, d'effectif n.

La **proportion** de la sous-population dans la population de référence est

$$p = \frac{n}{N}.$$

C'est un nombre compris entre 0 et 1, qu'on écrit en fraction, en écriture décimale ou en pourcentage.



Propriété 2 — Effectif et effectif total

Quand on connaît la proportion p :

- l'effectif de la sous-population est $n = p \times N$ (c'est la méthode 1) ;
- l'effectif total N vérifie $p \times N = n$, donc $N = \frac{n}{p}$.

Méthode 3 — Associer effectif, proportion et effectif total

Exemples corrigés

Un club d'escalade compte 240 licenciés, dont 45 % sont mineurs. Parmi les licenciés, 96 sont des femmes, et 48 d'entre elles sont mineures.

a) Combien de licenciés sont mineurs ?

b) Quelle est la proportion de femmes parmi les licenciés ?

c) Quelle est la proportion de mineures parmi les femmes ? La comparer à la proportion de mineurs dans tout le club.

d) Un autre club compte 63 licenciés mineurs, soit 35 % de ses licenciés. Combien ce club a-t-il de licenciés ?

a)

Population de référence : les 240 licenciés ; sous-population : les mineurs. *on repère d'abord les deux populations*

$n = p \times N$ *on cherche l'effectif de la sous-population*

$n = 0{,}45 \times 240$

$n = 108$

Le club compte 108 licenciés mineurs. *on conclut par une phrase*

b)

Population de référence : les 240 licenciés ; sous-population : les 96 femmes.

$p = \dfrac{n}{N}$ *on cherche une proportion*

$p = \dfrac{96}{240}$

$p = 0{,}4$

$p = 40\,\%$

Les femmes représentent 40 % des licenciés. *on conclut par une phrase*

c)

Population de référence : les 96 femmes ; sous-population : les 48 mineures. *la population de référence a changé*

$p = \dfrac{48}{96}$ $\dfrac{n}{N}$

$p = 0{,}5$

$p = 50\,\%$

50 % des femmes sont mineures, contre 45 % dans tout le club : les femmes du club sont plus souvent mineures. *on compare deux proportions*

d)

Population de référence : les licenciés du second club, en nombre N inconnu ; sous-population : les 63 mineurs. *c'est N qu'on cherche*

$p \times N = n$ *la formule de la propriété 2*

$0{,}35 \times N = 63$

$N = \dfrac{63}{0{,}35}$ *on divise les deux membres par 0,35*

$N = 180$

Ce club compte 180 licenciés. *on peut vérifier : $0{,}35 \times 180 = 63$*

À vous de jouer

Un lycée compte 800 élèves, dont 30 % sont externes. Parmi les élèves, 440 sont des filles, et 154 d'entre elles sont externes.

a) Combien d'élèves sont externes ?

b) Quelle est la proportion de filles parmi les élèves ?

c) Quelle est la proportion d'externes parmi les filles ? La comparer à la proportion d'externes dans tout le lycée.

d) Un autre lycée compte 91 latinistes, soit 14 % de ses élèves. Combien ce lycée a-t-il d'élèves ?

Réponses : a) 240 ; b) 55 % ; c) 35 %, plus que 30 % ; d) 650 élèves.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 7 à 11.

III — Proportions échelonnées

Exemple — Un pourcentage d'un pourcentage

Dans un car de 50 passagers, 40 % sont des scolaires, et 60 % des scolaires sont des filles.

$$\begin{aligned} \text{scolaires} &= 0{,}4 \times 50 && \textit{40 \% des passagers} \\ \text{scolaires} &= 20 \\ \text{filles scolaires} &= 0{,}6 \times 20 && \textit{60 \% des scolaires} \\ \text{filles scolaires} &= 12 \end{aligned}$$


Dans le car, la proportion de filles scolaires est $\dfrac{12}{50} = 0{,}24$; or $0{,}6 \times 0{,}4 = 0{,}24$: il suffisait de multiplier les deux proportions.

Propriété 3 — Proportions échelonnées

A est une partie de B, et B une partie de C.

- p_1 est la proportion de A dans B ;
- p_2 est la proportion de B dans C.

Alors la proportion de A dans C est $p = p_1 \times p_2$.



Démonstration. On note n_A, n_B et n_C les effectifs de A, de B et de C.

$$\begin{aligned} p &= \frac{n_A}{n_C} && \textit{proportion de } A \textit{ dans } C \\ p &= \frac{n_A}{n_B} \times \frac{n_B}{n_C} && \textit{en simplifiant par } n_B\textit{, on retrouve } \frac{n_A}{n_C} \\ p &= p_1 \times p_2 && \frac{n_A}{n_B} = p_1 \textit{ et } \frac{n_B}{n_C} = p_2 \end{aligned}$$

Conclusion : la proportion de A dans C est le produit $p_1 \times p_2$.

Méthode 4 — Calculer une proportion échelonnée

Exemples corrigés

a) Dans un lycée, 40 % des élèves sont inscrits à l'association sportive, et 35 % des inscrits font du volley-ball. Quelle proportion des élèves du lycée fait du volley-ball à l'association sportive ?

b) Ce lycée compte 1 500 élèves. Combien font du volley-ball à l'association sportive ?

c) Dans une ville, 50 % des habitants ont un vélo ; 60 % d'entre eux vont au travail à vélo, et 30 % de ces derniers ont un vélo électrique. Quelle proportion des habitants va au travail en vélo électrique ?

a)

Les volleyeurs sont une partie des inscrits, qui sont une partie des élèves. *on repère les populations emboîtées*

$$\begin{aligned} p &= p_1 \times p_2 && \textit{propriété 3} \\ p &= 0{,}35 \times 0{,}4 && \textit{35 \% des inscrits, 40 \% des élèves} \\ p &= 0{,}14 \\ p &= 14\,\% \end{aligned}$$

14 % des élèves du lycée font du volley-ball à l'association sportive. *on conclut par une phrase*

b)

$n = p \times N$ *proportion trouvée en a)*

$n = 0{,}14 \times 1\,500$

$n = 210$

210 élèves font du volley-ball à l'association sportive. *on conclut par une phrase*

c)

Trois populations emboîtées dans celle des habitants : on multiplie les trois proportions. *la propriété se prolonge*

$p = 0{,}3 \times 0{,}6 \times 0{,}5$ *du plus petit groupe au plus grand*

$p = 0{,}09$

$p = 9\,\%$

9 % des habitants vont au travail en vélo électrique. *on conclut par une phrase*

À vous de jouer

a) Dans une entreprise, 60 % des salariés viennent en train, et 45 % de ceux-ci ont un abonnement annuel. Quelle proportion des salariés vient en train avec un abonnement annuel ?

b) Cette entreprise compte 2 400 salariés. Combien viennent en train avec un abonnement annuel ?

c) Dans un lycée, 80 % des élèves ont un téléphone portable ; 75 % d'entre eux ont une application de révision, et 40 % de ces derniers l'utilisent chaque jour. Quelle proportion des élèves utilise chaque jour une application de révision ?

Réponses : a) 27 % ; b) 648 salariés ; c) 24 %.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 15.

IV — Coefficient multiplicateur

Dans la méthode 1, la console à 380 €, qui a une réduction de 15 %, coûte $380 - 57 = 323$ €. On paie $100\,\% - 15\,\% = 85\,\%$ du prix : une seule multiplication suffit, $0{,}85 \times 380 = 323$.

Définition 3 — Taux d'évolution

Une hausse de 15 % a pour **taux d'évolution** $t = +15\,\% = 0{,}15$; une baisse de 15 % a pour taux d'évolution $t = -15\,\% = -0{,}15$.

Le taux d'évolution est positif pour une hausse, négatif pour une baisse.

Propriété 4 — Coefficient multiplicateur

Une évolution de taux t multiplie la valeur par $C_m = 1 + t$, le **coefficient multiplicateur** de l'évolution : la valeur de départ V_0 devient $V_1 = V_0 \times C_m$.

Hausse de 15 % : $C_m = 1 + 0{,}15 = 1{,}15$; baisse de 15 % : $C_m = 1 - 0{,}15 = 0{,}85$.



Démonstration. Pour une baisse, t est négatif : ajouter $t \times V_0$, c'est retirer.

$V_1 = V_0 + t \times V_0$ *on ajoute $t \times V_0$: 15 % de V_0 si $t = 0{,}15$ (partie I)*

$V_1 = V_0 \times (1 + t)$ *on factorise par V_0*

Conclusion : une évolution de taux t multiplie la valeur par $1 + t$.

Évolution	Taux t	Coefficient $C_m = 1 + t$
hausse de 12 %	0,12	$1 + 0{,}12 = 1{,}12$
hausse de 5 %	0,05	$1 + 0{,}05 = 1{,}05$
baisse de 30 %	$-0{,}3$	$1 - 0{,}3 = 0{,}7$
baisse de 2 %	$-0{,}02$	$1 - 0{,}02 = 0{,}98$

Un coefficient C_m plus grand que 1 traduit une hausse ; plus petit que 1, une baisse.

Méthode 5 — Passer du taux d'évolution au coefficient multiplicateur, et inversement

Exemples corrigés

a) Donner le coefficient multiplicateur C_m d'une hausse de 8 %.
b) Donner le coefficient multiplicateur C_m d'une baisse de 35 %.
c) Un prix est multiplié par 1,4. Quel est son taux d'évolution ?
d) Un prix est multiplié par 0,93. Quel est son taux d'évolution ?

a)

$C_m = 1 + t$ *propriété 4*
$C_m = 1 + 0{,}08$ *hausse de 8 % : $t = 0{,}08$*
$C_m = 1{,}08$

b)

$C_m = 1 + t$ *propriété 4*
$C_m = 1 - 0{,}35$ *baisse de 35 % : $t = -0{,}35$*
$C_m = 0{,}65$

c)

$C_m = 1{,}4$ *plus grand que 1 : une hausse*
$C_m = 1 + 0{,}4$ *on écrit C_m sous la forme $1 + t$*

$t = 0{,}4 = +40\,\%$: le prix augmente de 40 %. *on conclut par une phrase*

d)

$C_m = 0{,}93$ *plus petit que 1 : une baisse*
$C_m = 1 - 0{,}07$ *on écrit C_m sous la forme $1 + t$, avec t négatif*

$t = -0{,}07 = -7\,\%$: le prix baisse de 7 %. *on conclut par une phrase*

À vous de jouer

a) Donner le coefficient multiplicateur C_m d'une hausse de 7 %.
b) Donner le coefficient multiplicateur C_m d'une baisse de 22 %.
c) Un prix est multiplié par 1,15. Quel est son taux d'évolution ?
d) Un prix est multiplié par 0,6. Quel est son taux d'évolution ?

Réponses : a) 1,07 ; b) 0,78 ; c) +15 % ; d) −40 %.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 et 17.

Méthode 6 — Calculer une valeur d'arrivée ou de départ

Exemples corrigés

a) La console à 380 € a une réduction de 15 %. Calculer le prix payé avec le coefficient multiplicateur.
b) Un loyer de 650 € augmente de 3 %. Calculer le nouveau loyer.
c) Après une hausse de 20 %, un vélo coûte 540 €. Quel était son prix avant la hausse ?

a)

$V_1 = V_0 \times C_m$ *la valeur d'arrivée est cherchée*
$V_1 = 380 \times 0{,}85$ *baisse de 15 % : $C_m = 1 - 0{,}15$*
$V_1 = 323$

La console est payée 323 €, comme dans la méthode 1. *une seule multiplication*

b)

$V_1 = V_0 \times C_m$
$V_1 = 650 \times 1{,}03$ *hausse de 3 % : $C_m = 1 + 0{,}03$*
$V_1 = 669{,}5$

Le nouveau loyer est de 669,50 €. *on conclut par une phrase*

c)

$V_0 \times C_m = V_1$ *c'est la valeur de départ qui est cherchée*
$V_0 \times 1{,}2 = 540$ *hausse de 20 % : $C_m = 1 + 0{,}2$*
$V_0 = \dfrac{540}{1{,}2}$ *on divise par C_m*
$V_0 = 450$

Le vélo coûtait 450 € avant la hausse. *retirer 20 % de 540 donnerait 432 : faux*

À vous de jouer

a) Un manteau à 240 € est soldé de 25 %. Calculer le prix soldé avec le coefficient multiplicateur.
b) Un salaire de 1 500 € augmente de 4 %. Calculer le nouveau salaire.
c) Après une baisse de 10 %, un casque coûte 63 €. Quel était son prix avant la baisse ?

Réponses : a) 180 € ; b) 1 560 € ; c) 70 €.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 20.

V — Calculer un taux d'évolution

Définition 4 — Variation absolue

Une grandeur passe de la valeur de départ V_0 à la valeur d'arrivée V_1. Sa **variation absolue** est $V_1 - V_0$; elle a l'unité de la grandeur.

Propriété 5 — Calculer un taux d'évolution

Le taux d'évolution (partie IV) de V_0 à V_1 est

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}.$$

Il n'a pas d'unité et s'écrit souvent en pourcentage ; positif pour une hausse, négatif pour une baisse.

Remarque

On a toujours $C_m = 1 + t$ (propriété 4) : une hausse de 12,5 % a pour coefficient 1,125 ; une baisse de 15 %, $1 + (-0{,}15) = 0{,}85$.

Méthode 7 — Calculer un taux d'évolution

Exemples corrigés

Pour chaque grandeur, calculer le taux d'évolution, en pourcentage.

a) Un abonnement de musique en ligne passe de 12 € à 13,50 € par mois.

b) Un musée reçoit 48 000 visiteurs une année, puis 40 800 l'année suivante.

c) Une commune passe de 2 400 à 2 530 habitants (arrondir au dixième de pourcentage).

a)

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0} \qquad V_0 = 12 \text{ (départ) et } V_1 = 13{,}5 \text{ (arrivée)}$$

$$t = \frac{13{,}5 - 12}{12}$$

$$t = \frac{1{,}5}{12} \qquad \text{variation absolue : } 1{,}50\ €$$

$$t = 0{,}125$$

$$t = 12{,}5\,\%$$

L'abonnement augmente de 12,5 %. *t positif : une hausse*

b)

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0} \qquad \text{on divise toujours par la valeur de départ}$$

$$t = \frac{40\,800 - 48\,000}{48\,000}$$

$$t = \frac{-7\,200}{48\,000}$$

$$t = -0{,}15$$

$$t = -15\,\%$$

La fréquentation du musée baisse de 15 %. *t négatif : une baisse*

c)

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

$$t = \frac{2\,530 - 2\,400}{2\,400}$$

$$t = \frac{130}{2\,400}$$

$$t \simeq 0{,}0542 \qquad \text{calculatrice : } 0{,}054166\ldots$$

$$t \simeq 5{,}4\,\% \qquad \text{arrondi au dixième de pourcentage}$$

La population augmente d'environ 5,4 %. *on conclut par une phrase*

À vous de jouer

Pour chaque grandeur, calculer le taux d'évolution, en pourcentage.

a) Une place de cinéma passe de 15 € à 16,80 €.

b) Une ligne de bus transporte 25 000 voyageurs un mois, puis 21 000 le mois suivant.

c) Un club passe de 1 800 à 1 950 adhérents (arrondir au dixième de pourcentage).

Réponses : a) +12 % ; b) −16 % ; c) environ +8,3 %.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 21 à 26.

VI — Évolutions successives


Un article à 100 € augmente de 20 % : il coûte 120 €. Puis il baisse de 20 % : il coûte $120 \times 0{,}8 = 96$ €, et non 100 €. Des pourcentages successifs ne s'ajoutent pas.

Propriété 6 — Évolutions successives

Quand une valeur subit deux évolutions successives, de coefficients C_{m1} puis C_{m2}, le **coefficient multiplicateur global** est le produit

$$C_m = C_{m1} \times C_{m2}.$$

De même pour trois évolutions ou plus.



Démonstration.

$V_2 = V_1 \times C_{m2}$ *seconde évolution*

$V_2 = V_0 \times C_{m1} \times C_{m2}$ *première évolution : $V_1 = V_0 \times C_{m1}$*

Conclusion : passer de V_0 à V_2, c'est multiplier par $C_{m1} \times C_{m2}$.

Méthode 8 — Calculer un taux d'évolution global

Exemples corrigés

a) Un prix augmente de 25 %, puis baisse de 12 %. Quelle est son évolution globale ?

b) Le nombre d'abonnés d'un journal baisse de 10 % par an pendant trois ans. Quelle est son évolution globale ?

c) Un plat à 80 € augmente de 5 % deux années de suite. Quelle est son évolution globale ? Quel est son prix final ?

a)

$C_m = C_{m1} \times C_{m2}$ *propriété 6*

$C_m = 1{,}25 \times 0{,}88$ *1 + 0,25, puis 1 − 0,12*

$C_m = 1{,}1$

$C_m = 1 + 0{,}1$ *on écrit C_m sous la forme 1 + ...*

Le prix augmente globalement de 10 % (et non de 25 % − 12 % = 13 %). $0{,}1 = 10\,\%$

b)

$C_m = 0{,}9 \times 0{,}9 \times 0{,}9$ *trois baisses de 10 % : 1 − 0,1*

$C_m = 0{,}729$

$C_m = 1 - 0{,}271$ *on écrit C_m sous la forme 1 − ...*

Le nombre d'abonnés baisse globalement de 27,1 % (et non de 30 %). $0{,}271 = 27{,}1\,\%$

c)

$C_m = 1{,}05 \times 1{,}05$ *deux hausses de 5 %*

$C_m = 1{,}1025$

$C_m = 1 + 0{,}1025$

Le prix augmente globalement de 10,25 %. $0{,}1025 = 10{,}25\,\%$

$V_2 = V_0 \times C_m$ *valeur d'arrivée, avec le coefficient global*

$V_2 = 80 \times 1{,}1025$

$V_2 = 88{,}2$

Le plat coûte 88,20 €. *on conclut par une phrase*

À vous de jouer

a) Un prix augmente de 50 %, puis baisse de 20 %. Quelle est son évolution globale ?

b) La valeur d'une voiture baisse de 20 % par an pendant trois ans. Quelle est son évolution globale ?

c) Une carte de transport à 60 € augmente de 10 % deux années de suite. Quelle est son évolution globale ? Quel est son prix final ?

Réponses : a) hausse de 20 % ; b) baisse de 48,8 % ; c) hausse de 21 %, prix final 72,60 €.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 27 à 31.

VII — Évolution réciproque

Dans la partie VI, une baisse de 20 % n'a pas compensé une hausse de 20 %. Quelle évolution ramène une valeur à son point de départ ?


Définition 5 — Évolution réciproque

Une valeur passe de V_0 à V_1. L'**évolution réciproque** est celle qui ramène V_1 à V_0.

Propriété 7 — Coefficient de l'évolution réciproque

Le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque est l'inverse de celui de l'évolution de départ :

$$C'_m = \frac{1}{C_m}.$$



Démonstration.

$V_0 \times C_m = V_1$ *l'évolution de départ*

$V_0 = \dfrac{V_1}{C_m}$ *on divise par C_m*

$V_0 = V_1 \times \dfrac{1}{C_m}$

Conclusion : pour revenir de V_1 à V_0, on multiplie par $\dfrac{1}{C_m}$.

Méthode 9 — Calculer un taux d'évolution réciproque

Exemples corrigés

Pour chaque évolution, quelle évolution ramène la valeur à son point de départ ?

a) Les ventes d'un magasin baissent de 20 %.

b) Le prix d'un appartement augmente de 60 %.

c) Le prix du kilo de cerises augmente de 15 % (arrondir au dixième de pourcentage).

a)

$C'_m = \dfrac{1}{C_m}$ *inverse de* C_m

$C'_m = \dfrac{1}{0{,}8}$ *baisse de* 20 % *:* $C_m = 1 - 0{,}2$

$C'_m = 1{,}25$

$C'_m = 1 + 0{,}25$ *on écrit* C_m *sous la forme* $1 + \ldots$

Il faut une hausse de 25 % pour compenser la baisse de 20 %. *on conclut par une phrase*

b)

$C'_m = \dfrac{1}{C_m}$

$C'_m = \dfrac{1}{1{,}6}$ *hausse de* 60 % *:* $C_m = 1 + 0{,}6$

$C'_m = 0{,}625$

$C'_m = 1 - 0{,}375$ *on écrit* C_m *sous la forme* $1 - \ldots$

Il faut une baisse de 37,5 % pour compenser la hausse de 60 %. *on conclut par une phrase*

c)

$C'_m = \dfrac{1}{1{,}15}$ *hausse de* 15 % *:* $C_m = 1 + 0{,}15$

$C'_m \simeq 0{,}8696$ *calculatrice :* $0{,}869565\ldots$

$C'_m \simeq 1 - 0{,}1304$

Il faut une baisse d'environ 13,0 % pour compenser la hausse de 15 %. $0{,}1304 \simeq 13{,}0\,\%$

À vous de jouer

Pour chaque évolution, quelle évolution ramène la valeur à son point de départ ?

a) Le nombre de clients d'un restaurant baisse de 50 %.

b) Le prix d'un forfait de ski augmente de 25 %.

c) Le prix d'un ordinateur baisse de 30 % (arrondir au dixième de pourcentage).

Réponses : a) hausse de 100 % *; b) baisse de* 20 % *; c) hausse d'environ* 42,9 %*.*

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 36.