SUITES NUMÉRIQUES

Cours — Première, mathématiques spécifiques

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Notion de suite

Pour commencer

Écrivons les multiples de 4 dans l'ordre : 0 ; 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; … On leur donne un numéro, en commençant **à** 0 :

$$u_0 = 0 \qquad u_1 = 4 \qquad u_2 = 8 \qquad u_3 = 12 \qquad \dots$$

Chaque entier n reçoit un nombre u_n : c'est une **suite**. Ici, $u_n = 4n$.

Définition 1 — Suite numérique

Une **suite** associe un nombre u_n à chaque entier $n = 0 ; 1 ; 2 ; \dots$ (on lit « u indice n »).

- u_n est le **terme de rang** n ; la suite se note (u_n).
- Le premier terme est u_0, le deuxième u_1, le troisième u_2…
- Le terme **suivant** u_n est u_{n+1} ; le terme **précédent** est u_{n-1}.

Définition 2 — Suite définie de façon explicite

Une suite est définie **de façon explicite** quand une formule donne u_n directement à partir de n, par exemple $u_n = 4n$. On calcule alors **n'importe quel terme** sans connaître les précédents.

Méthode 1 — Calculer un terme d'une suite définie de façon explicite

Exemples

(au tableau)

a) Soit $u_n = 3n + 4$. Calculer u_0, u_1, u_2 et u_{15}.

b) Soit $v_n = 4n^2 - 1$. Calculer les quatre premiers termes.

c) Une carte de bus coûte 8 €, puis chaque trajet 1,50 €. Pour n trajets, on paie $c_n = 8 + 1{,}5n$ euros. Calculer c_{20} et interpréter.

À vous de jouer

1°) Soit $u_n = 4n - 7$. Calculer u_0, u_1 et u_{30}.

2°) Soit $v_n = n^2 + 3n$. Calculer les quatre premiers termes.

3°) Une salle de sport demande 30 € d'inscription, puis 6 € par séance. Pour n séances, on paie $c_n = 30 + 6n$ euros. Calculer c_{12} et interpréter.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Ne pas confondre u_{n+1} et $u_n + 1$

u_{n+1} est le terme **suivant** ; $u_n + 1$ est le terme u_n augmenté de 1. Avec $u_n = 3n + 4$ et $n = 2$: $u_3 = 13$, alors que $u_2 + 1 = 11$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

II — Suites définies par récurrence

Définition 3 — Suite définie par récurrence

Une suite est définie **par récurrence** quand on connaît :

- son **premier terme** (en général u_0) ;
- une **relation** qui donne chaque terme à partir du **précédent** : u_{n+1} en fonction de u_n.

Exemple : $u_0 = 6$ et $u_{n+1} = 2u_n$ se lit « on part de 6, et chaque terme est le double du précédent ».

Méthode 2 — Calculer les termes d'une suite définie par récurrence

Exemples *(au tableau)*

a) Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 5u_n$. Calculer u_1, u_2 et u_3.

b) Soit $v_0 = 4$ et $v_{n+1} = 2v_n - 3$. Calculer v_1, v_2 et v_3.

c) Léa a 45 abonnés sur son compte de photos et en gagne 8 chaque semaine. On note a_n son nombre d'abonnés après n semaines. Donner a_0, exprimer a_{n+1} en fonction de a_n, puis calculer a_3.

À vous de jouer

1°) Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2$. Calculer u_1, u_2 et u_3.

2°) Soit $v_0 = 80$ et $v_{n+1} = v_n - 12$. Calculer v_1, v_2 et v_3.

3°) À 8 h, un parking a 300 places libres ; chaque quart d'heure, 25 voitures s'y garent. On note p_n le nombre de places libres après n quarts d'heure. Donner p_0, exprimer p_{n+1} en fonction de p_n, puis calculer p_3.

Au tableur

Pour une suite définie par récurrence, u_{12} demande d'abord u_{11}, donc u_{10}… jusqu'à u_0 : douze calculs, qu'un tableur fait à notre place. On écrit le premier terme en B2, puis en B3 une formule qui utilise la cellule du dessus, recopiée vers le bas. Pour $v_{n+1} = 2v_n - 3$: `=2*B2-3`. L'épreuve demande parfois cette formule.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 11.

III — Représentation graphique d'une suite

Définition 4 — Représentation graphique

Dans un repère, une suite (u_n) se représente par les **points** de coordonnées $(n\,;u_n)$.
On ne relie **pas** les points : n ne prend que des valeurs entières.

Méthode 3 — Représenter graphiquement une suite

Exemples *(au tableau)*

Représenter les six premiers termes de la suite définie par $u_n = \dfrac{n^2}{2} - 2$.

À vous de jouer

Représenter les cinq premiers termes de chaque suite :

1°) $v_n = 7 - 2n$;
2°) $w_n = n^2 - 4$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 12 à 15.

IV — Suites arithmétiques : définition

Pour commencer

On part de 2 et on ajoute 6 à chaque étape : 2 ; 8 ; 14 ; 20 ; … C'est la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 6$.
On part de 10 et on retire 3, ce qui donne 10 ; 7 ; 4 ; 1 ; … C'est la suite définie par $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = v_n - 3$.

Définition 5 — Suite arithmétique

Une suite (u_n) est **arithmétique** quand on passe d'un terme au suivant en **ajoutant toujours le même nombre** r : pour tout n,

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + r}$$

Le nombre r s'appelle la **raison** de la suite.

Propriété 1 — Reconnaître une suite arithmétique

Une suite est arithmétique quand la **différence** entre deux termes consécutifs est toujours la même : $u_{n+1} - u_n = r$. Dans un énoncé : une grandeur augmente (ou diminue) **de la même quantité** à chaque étape.

Méthode 4 — Reconnaître et modéliser une suite arithmétique

Exemples

(au tableau)

a) En 2020, une commune compte 800 arbres en ville et en plante 150 de plus chaque année. On note u_n le nombre d'arbres en 2020 + n. Calculer u_1 et u_2, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n, puis donner la nature de la suite.

b) Le 1er mars, une station de ski a 120 cm de neige ; la hauteur baisse de 4 cm par jour. On note h_n la hauteur, en cm, n jours après le 1er mars. Modéliser par une suite.

c) Les listes 7 ; 11 ; 15 ; 19 et 2 ; 5 ; 9 ; 14 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

À vous de jouer

1°) En 2024, une association compte 65 bénévoles et en accueille 9 de plus chaque année. On note b_n le nombre de bénévoles en 2024 + n. Calculer b_1 et b_2, exprimer b_{n+1} en fonction de b_n, puis donner la nature de la suite.

2°) Les listes 30 ; 26 ; 22 ; 18 et 2 ; 4 ; 8 ; 16 sont-elles les premiers termes de suites arithmétiques ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 19.

V — Suites arithmétiques : expression en fonction de n

Propriété 2 — Terme de rang n

Si (u_n) est arithmétique de raison r, alors, pour tout entier n :

$$\boxed{u_n = u_0 + n \times r}$$

En effet, pour aller de u_0 à u_n, on ajoute n fois la raison : $u_1 = u_0 + r$; $u_2 = u_0 + 2r$; $u_3 = u_0 + 3r$…

Méthode 5 — Exprimer une suite arithmétique en fonction de n

Exemples *(au tableau)*

a) Soit $u_0 = 12$ et $u_{n+1} = u_n - 5$. Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_{30}.

b) Soit $u_1 = 8$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Exprimer u_n en fonction de n.

c) En 2025, une bibliothèque possède 1 200 livres et en achète 150 de plus chaque année. On note u_n le nombre de livres en $2025 + n$. Calculer u_1 et u_2, donner la nature de la suite, exprimer u_n en fonction de n, puis calculer le nombre de livres en 2035.

À vous de jouer

1°) Soit $v_0 = -3$ et $v_{n+1} = v_n + 7$. Exprimer v_n en fonction de n et calculer v_{20}.

2°) Soit $w_1 = 40$ et $w_{n+1} = w_n - 1{,}5$. Exprimer w_n en fonction de n.

3°) En 2024, un club de judo compte 70 adhérents et en accueille 8 de plus chaque année. On note c_n le nombre d'adhérents en $2024 + n$. Calculer c_1 et c_2, donner la nature de la suite, exprimer c_n en fonction de n, puis calculer le nombre d'adhérents en 2034.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 24.

VI — Suites arithmétiques : problème de seuil

Problème de seuil

« À partir de quel rang u_n dépasse-t-il telle valeur ? » Pour une suite arithmétique, on résout une **inéquation du premier degré** (vue en seconde). Comme n est entier, on garde le **premier entier** qui convient.

Méthode 6 — Résoudre un problème de seuil (croissance linéaire)

Exemples *(au tableau)*

Une cycliste parcourt 20 km le jour 0, puis 4 km de plus chaque jour. On note u_n la distance parcourue le jour n.

a) Calculer u_1 et u_2.

b) Donner la nature de la suite, puis exprimer u_n en fonction de n.

c) À partir de quel jour parcourra-t-elle plus de 75 km ?

À vous de jouer

Pour chaque situation, calculer les termes de rang 1 et 2, donner la nature de la suite, exprimer le terme de rang n en fonction de n, puis répondre à la question.

1°) En 2020, une ville propose 800 vélos en libre-service et en ajoute 150 chaque année. On note u_n le nombre de vélos en $2020 + n$. À partir de quelle année la ville proposera-t-elle au moins 2 750 vélos ?

2°) Le 1er juin, une citerne contient 120 L d'eau et en perd 4 L par jour. On note h_n la quantité d'eau, en litres, n jours après le 1er juin. À partir de quel jour de juin y aura-t-il moins de 50 L d'eau ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VII — Suites arithmétiques : variations et représentation graphique

Propriété 3 — Sens de variation

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r.


- Si $r > 0$, la suite est **croissante** : chaque terme est plus grand que le précédent (les points montent).
- Si $r = 0$, la suite est **constante**.

- Si $r < 0$, la suite est **décroissante** : chaque terme est plus petit que le précédent (les points descendent).

Démonstration. $u_{n+1} = u_n + r$: on ajoute r à chaque terme ; si $r > 0$, le terme suivant est plus grand.

Propriété 4 — Représentation graphique

Les points d'une suite arithmétique sont **alignés**, sur la droite d'équation $y = u_0 + rx$: on parle de **croissance linéaire**. La raison r joue le rôle du coefficient directeur.



Suite arithmétique de premier terme $u_0 = 1$ et de raison $r = 0{,}5$: $u_n = 1 + 0{,}5n$.

Les points sont alignés : à chaque pas de 1 vers la droite, on monte de 0,5. Comme $r > 0$, la suite est croissante.

Méthode 7 — Sens de variation d'une suite arithmétique

Exemples *(au tableau)*

Donner le sens de variation de chaque suite.

a) $u_n = 7 - 2n$

b) $v_0 = 10$ et $v_{n+1} = v_n + 0{,}3$

c) La suite représentée ci-dessus : lire aussi son premier terme et sa raison.

d) Le 1er septembre, une réserve contient 900 kg de riz ; elle baisse de 30 kg par jour. On note r_n la masse, en kg, n jours plus tard. Calculer r_1 et r_2, exprimer r_n en fonction de n, puis donner le sens de variation.

À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite arithmétique.

a) $u_n = -5 + 0{,}5n$

b) $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = v_n - 1{,}5$

c) $w_n = 4n - 9$

d) En 2025, un parc compte 60 éoliennes et en installe 4 de plus chaque année. On note p_n le nombre d'éoliennes en $2025 + n$. Calculer p_1 et p_2, exprimer p_n en fonction de n, puis donner le sens de variation.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 31.

VIII — Suites géométriques : définition

Pour commencer

On part de 3 et on multiplie par 2 à chaque étape :

$$3 \xrightarrow{\times 2} 6 \xrightarrow{\times 2} 12 \xrightarrow{\times 2} 24 \xrightarrow{\times 2} \dots$$

C'est une suite **géométrique**, de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 2$: $u_{n+1} = 2\,u_n$.

Définition 6 — Suite géométrique

Une suite (u_n) est **géométrique** quand on passe d'un terme au suivant en **multipliant toujours par le même**

nombre $q > 0$: pour tout n,

$$\boxed{u_{n+1} = q \times u_n}$$

Le nombre q s'appelle la **raison** de la suite.

Exemple

La suite géométrique de premier terme $u_0 = 3$ et de raison $q = 5$:

$$u_0 = 3 \qquad u_1 = 5 \times 3 = 15 \qquad u_2 = 5 \times 15 = 75 \qquad u_3 = 5 \times 75 = 375$$

Rappel de seconde — Coefficient multiplicateur

- Augmenter de t %, c'est multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$: +3 % donne $\times 1{,}03$.
- Diminuer de t %, c'est multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$: −15 % donne $\times 0{,}85$.
- Lien avec la raison : une grandeur qui évolue **du même pourcentage** à chaque étape forme une suite géométrique ; sa raison q est le **coefficient multiplicateur**.

Méthode 8 — Calculer les premiers termes d'une suite géométrique

Exemples

(au tableau)

a) La suite (u_n) est géométrique, de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $q = 3$. Calculer u_1, u_2 et u_3.

b) On place 1 000 € sur un livret à 3 % par an, intérêts compris dans le capital. On note u_n le capital, en €, au bout de n années. Calculer u_1 et u_2, puis exprimer u_{n+1} en fonction de u_n.

c) En 2022, un lac contient 400 kg de déchets plastiques ; grâce au nettoyage, cette masse baisse de 20 % par an. On note v_n la masse, en kg, en $2022 + n$. Calculer v_1 et v_2, puis exprimer v_{n+1} en fonction de v_n.

À vous de jouer

1°) La suite (w_n) est géométrique, de premier terme $w_0 = 4$ et de raison $q = 5$. Calculer w_1, w_2 et w_3.

2°) En 2025, une ville compte 30 000 habitants ; sa population augmente de 2 % par an. On note p_n la population en $2025 + n$. Calculer p_1 et p_2, puis exprimer p_{n+1} en fonction de p_n.

3°) Un téléphone acheté 800 € perd 25 % de sa valeur chaque année. On note t_n sa valeur, en €, au bout de n années. Calculer t_1 et t_2, puis exprimer t_{n+1} en fonction de t_n.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.

Propriété 5 — Reconnaître une suite géométrique

Une suite à termes strictement positifs est géométrique quand le **quotient** de deux termes consécutifs est toujours le même : $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = q$. Dans un énoncé : une grandeur évolue **du même pourcentage** à chaque étape.

Méthode 9 — Reconnaître une suite géométrique

Exemples

(au tableau)

a) Les listes 5 ; 15 ; 45 ; 135 et 5 ; 10 ; 15 ; 20 sont-elles les premiers termes de suites géométriques ?

b) Chaque mois, le nombre d'abonnés d'une chaîne vidéo augmente de 10 %. Le nombre d'abonnés forme-t-il une suite géométrique ? Si oui, donner sa raison.

À vous de jouer

1°) Les listes 81 ; 27 ; 9 ; 3 et 2 ; 4 ; 8 ; 14 sont-elles les premiers termes de suites géométriques ?

2°) Chaque année, la consommation d'eau d'un immeuble baisse de 5 %. Forme-t-elle une suite géométrique ? Si oui, donner sa raison.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercice 36.

IX — Suites géométriques : expression en fonction de n

Propriété 6 — Terme de rang n

Si (u_n) est géométrique de raison q, alors, pour tout entier n :

$$\boxed{u_n = u_0 \times q^n}$$

En effet, pour aller de u_0 à u_n, on multiplie n fois par la raison : $u_1 = u_0 \times q$; $u_2 = u_0 \times q^2$; $u_3 = u_0 \times q^3 \dots$

Méthode 10 — Exprimer une suite géométrique en fonction de n

Exemples

(au tableau)

a) Soit $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = 3u_n$. Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_4.

b) Soit $u_1 = 12$ et $u_{n+1} = 4u_n$. Exprimer u_n en fonction de n.

c) Une ruche compte 1 000 abeilles ; ce nombre augmente de 3 % par jour. On note u_n le nombre d'abeilles au bout de n jours. Calculer u_1, donner la nature de la suite, exprimer u_n en fonction de n, puis donner le nombre d'abeilles au bout de 10 jours. On donne $1{,}03^{10} \simeq 1{,}34$.

À vous de jouer

1°) Soit $v_0 = 500$ et $v_{n+1} = 0{,}8\, v_n$. Exprimer v_n en fonction de n et calculer v_2.

2°) Soit $w_1 = 10$ et $w_{n+1} = 2w_n$. Exprimer w_n en fonction de n et calculer w_5.

3°) On place 3 000 € à 2 % par an. On note c_n le capital, en €, au bout de n années. Calculer c_1, donner la nature de la suite, exprimer c_n en fonction de n, puis donner le capital au bout de 10 ans. On donne $1{,}02^{10} \simeq 1{,}22$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 41.

X — Suites géométriques : variations et représentation graphique

Propriété 7 — Sens de variation


Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q > 0$ et de premier terme $u_0 > 0$.

- Si $q > 1$, la suite est **croissante**.
- Si $q = 1$, la suite est **constante**.
- Si $0 < q < 1$, la suite est **décroissante**.


Propriété 8 — Représentation graphique

Les points d'une suite géométrique **ne sont pas alignés**. Quand $q > 1$, l'écart entre deux termes consécutifs grandit de plus en plus : on parle de **croissance exponentielle** (de **décroissance exponentielle** quand $0 < q < 1$).

$u_n = 0{,}5 \times 2^n$: $q = 2 > 1$



$v_n = 16 \times 0{,}5^n$: $q = 0{,}5 < 1$



Méthode 11 — Sens de variation d'une suite géométrique

Exemples

(au tableau)

Donner le sens de variation de chaque suite.

a) $u_n = 7 \times 1{,}5^n$

b) $v_0 = 40$ et $v_{n+1} = 0{,}25\, v_n$

c) En 2025, un journal papier compte 5 000 abonnés ; ce nombre baisse de 20 % par an. On note a_n le nombre d'abonnés en $2025 + n$. Calculer a_1 et a_2, exprimer a_n en fonction de n, puis donner le sens de variation.

À vous de jouer

Donner le sens de variation de chaque suite géométrique.

a) $u_n = 50 \times 0{,}9^n$

b) $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 1{,}1\, v_n$

c) En 2025, un village compte 500 habitants ; ce nombre augmente de 10 % par an. On note p_n le nombre d'habitants en $2025 + n$. Calculer p_1 et p_2, exprimer p_n en fonction de n, puis donner le sens de variation.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.

XI — Suites géométriques : problème de seuil

Seuil et croissance exponentielle

Cette année, l'inéquation $u_0 \times q^n > \ldots$ ne se résout pas par le calcul. L'énoncé donne un **tableau de valeurs** de q^n (comme à l'épreuve).

Méthode 12 — Résoudre un problème de seuil avec un tableau de valeurs

Exemples

(au tableau)

En 2025, un lycée utilise 800 ramettes de papier ; il réduit cette quantité de 10 % chaque année. On note u_n le nombre de ramettes utilisées en $2025 + n$.

a) Donner u_0, puis calculer u_1 et u_2.

b) Exprimer u_n en fonction de n.

c) Donner le sens de variation de la suite (u_n).

d) En quelle année le lycée utilisera-t-il au plus 400 ramettes ? On donne :

n	5	6	7	8
$0{,}9^n$ (arrondi)	0,59	0,53	0,48	0,43

À vous de jouer

En 2025, une voiture est achetée 20 000 € ; elle perd 20 % de sa valeur chaque année. On note a_n sa valeur, en euros, en $2025 + n$.

a) Donner a_0, puis calculer a_1 et a_2.

b) Exprimer a_n en fonction de n.

c) Donner le sens de variation de la suite (a_n).

d) En quelle année la voiture vaudra-t-elle au plus 10 000 € ? On donne :

n	2	3	4	5
$0{,}8^n$ (arrondi)	0,64	0,51	0,41	0,33

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 47.

XII — Comparer deux évolutions

	Suite arithmétique	**Suite géométrique**
D'un terme au suivant	on **ajoute** r	on **multiplie** par q
Relation de récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \times u_n$
Terme de rang n	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \times q^n$
Croissante quand	$r > 0$	$q > 1$
Décroissante quand	$r < 0$	$0 < q < 1$
Graphique	points alignés	points non alignés
Dans un énoncé	même quantité ajoutée	même pourcentage d'évolution
Croissance	linéaire	exponentielle

Méthode 13 — Comparer une croissance linéaire et une croissance exponentielle

Exemples

(au tableau)

Au 1er janvier, deux chaînes vidéo ont chacune 5 000 abonnés. La chaîne A en gagne 300 par mois ; celle de la chaîne B augmente de 5 % par mois. On note u_n et v_n les nombres d'abonnés de A et de B après n mois.

a) Calculer u_1 et v_1.

b) Donner la nature de chaque suite, puis exprimer u_n et v_n en fonction de n.

c) À partir de quel mois la chaîne B a-t-elle plus d'abonnés que la chaîne A ? On donne :

n	7	8	9	10
v_n (arrondi)	7 036	7 387	7 757	8 144

À vous de jouer

En 2025, la ville A compte 12 000 habitants et en gagne 400 par an ; la ville B compte 10 000 habitants, avec une hausse de 4 % par an. On note a_n et b_n leurs populations en $2025 + n$.

a) Calculer a_1 et b_1.

b) Donner la nature de chaque suite, puis exprimer a_n et b_n en fonction de n.

c) À partir de quelle année la ville B sera-t-elle la plus peuplée ? On donne, pour la ville B : 16 651 habitants en 2038, 17 317 en 2039 et 18 009 en 2040 (valeurs arrondies).

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 48 à 50, puis les exercices de type épreuve 51 à 53.