

CALCUL LITTÉRAL

Cours — Seconde
Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu’il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu’il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. En calcul littéral, on écrit toutes les étapes : une ligne sautée est la première cause d’erreur de signe. Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Réduire, substituer

Définition 1 — Termes semblables

Dans une **expression littérale**, des lettres remplacent des nombres. On n’écrit pas le $\times$ devant une lettre ou une parenthèse : $5 \times x = 5x$; de plus $1x = x$ et $x \times x = x^2$.
Des termes **semblables** ont la même partie littérale : $4x$ et $-9x$ sont semblables ; $3x^2$ et $3x$ ne le sont pas.

Propriété 1 — Réduire

Réduire une somme, c’est regrouper les termes semblables en additionnant leurs nombres : $6a + 1 + 4a = 10a + 1$. **Réduire un produit**, c’est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles : $3x \times (-2x) = -6x^2$.
On peut **toujours** réduire un produit. On ne peut **pas toujours** réduire une somme : $5 + 2x$ n’a pas de termes semblables, elle reste ainsi.

Trois pièges

$5 + 2x$ ne se réduit pas ; $5x + 2x = 7x$, mais $5x \times 2x = 10x^2$; $x^2 + x^2 = 2x^2$, et non x^4 .

Méthode 1 — Réduire une expression

Exemples

Réduire :

- a) $A = 4x + 7 - 9x + 3$
- b) $B = 2x^2 + 5x - x^2 - 3x$
- c) $C = 5x \times (-2x)$

À vous de jouer

Réduire, si possible :

$$\begin{aligned} D &= 7a - 5 + 2a - 8 & E &= -4y^2 + 5y - 3y^2 - 5y + 2 & F &= 4x \times 7x \\ G &= -5 \times (-3x) & H &= 5 + 2x & K &= x^2 + 5x^2 \end{aligned}$$

Méthode 2 — Substituer

Substituer, c’est remplacer la lettre par une valeur : on l’écrit **entre parenthèses**, on rétablit les $\times$, puis on calcule avec les priorités.

Exemples

Calculer $B = 2x^2 - 5x + 3$ pour $x = 4$, pour $x = -1$, puis pour $x = \frac{1}{2}$.

Tester une égalité

Pour $x = 0$: $(x + 3)^2 = 9$ et $x^2 + 9 = 9$. Pour $x = 1$: $(x + 3)^2 = 16$ mais $x^2 + 9 = 10$. Un seul contre-exemple suffit : les deux expressions ne sont **pas** égales. Des tests réussis ne prouvent rien : pour prouver une égalité, on **développe**.

À vous de jouer

- 1°) Calculer $E = -x^2 + 4x - 2$ pour $x = 3$, puis pour $x = -2$.
- 2°) Calculer $F = 3a - 2b$ pour $a = -2$ et $b = 5$.
- 3°) Les expressions $(x + 5)^2$ et $x^2 + 25$ sont-elles égales ?

► **À faire** : fiche d’exercices du chapitre, exercices 1 à 4.

II — Développer

Propriété 2 — Distributivité

Développer, c’est transformer un produit en une somme. Pour tous nombres k, a, b, c, d :

$$k(a + b) = ka + kb \quad k(a - b) = ka - kb \quad (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Un signe $-$ devant une parenthèse change le signe de chaque terme : $-(a - b) = -a + b$. Pour soustraire un produit, on le développe d’abord **entre crochets**.

Méthode 3 — Développer et réduire

Exemples

Développer et réduire :

- a) $A = -4(3x - 2)$
- b) $B = (2x + 5) \times 3$
- c) $C = 7 - (2x - 3)$
- d) $D = 3x(2x - 5) + 4x$
- e) $E = (3x + 2)(x - 5)$
- f) $F = 4x^2 - (3x - 2)(x + 4)$
- g) $G = 3(x + 2)(x - 4)$

À vous de jouer

Développer et réduire :

$$\begin{aligned} H &= -6(2x - 3) & K &= (3x + 5) \times 4 & L &= 9 - (5x - 2) & M &= 2x(4x + 3) - 5x \\ N &= (2x - 3)(5x + 1) & P &= 3x - (x - 4)(2x + 3) & Q &= 2(x - 3)(x + 5) \\ R &= (3x + 1)(x + 2) - (x - 4)(2x + 1) \end{aligned}$$

► **À faire** : fiche d’exercices du chapitre, exercices 5 à 9.

III — Identités remarquables

Propriété 3 — Identités remarquables

Pour tous nombres a et b :

- 1^{re} identité remarquable : $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;
- 2^e identité remarquable : $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
- 3^e identité remarquable : $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.

Démonstration. $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2$, soit $a^2 + 2ab + b^2$; les deux autres se démontrent de même.

L’erreur la plus fréquente
 $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$: on oublie le **double produit** $2ab$. Par exemple $(2 + 5)^2 = 49$, alors que $2^2 + 5^2 = 29$.

Méthode 4 — Développer avec une identité remarquable

Exemples

Développer :

- a) $(x - 4)^2$
- b) $(5x + 2)^2$
- c) $(3x - 1)(3x + 1)$

À vous de jouer
Développer et réduire :

$A = (x + 7)^2$ $B = (4x - 3)^2$ $C = (2 - 5x)^2$ $D = (6x + 5)(6x - 5)$ $E = (3x + 2)^2 - (x - 2)(x + 2)$

➤ **À faire** : fiche d’exercices du chapitre, exercices 10 à 13.

IV — Factoriser

Définition 2 — Factoriser

Factoriser, c’est transformer une somme en un produit : c’est l’inverse de développer. Le facteur présent dans chaque terme est le **facteur commun** :

$\underbrace{ka + kb}_{\text{forme développée}}$

$\xleftrightarrow[\text{développer}]{\text{factoriser}}$

$\underbrace{k(a + b)}_{\text{forme factorisée}}$

Méthode 5 — Factoriser avec un facteur commun

On repère le facteur commun (un nombre, x ou une parenthèse entière), au besoin en décomposant chaque terme (les tables de multiplication à l’envers), puis on écrit ce qui reste de chaque terme entre crochets, avec son signe.

Exemples

Factoriser :

- a) $A = 15x + 20$
- b) $B = 7x^2 - 2x$
- c) $C = (3x + 2)(x - 1) + (3x + 2)(2x + 5)$
- d) $D = (x + 4)(3x - 2) - (x + 4)(x - 5)$

Remarque

On factorise le plus possible : $8x^2 - 12x = x(8x - 12)$ est juste mais incomplet ; on écrit $8x^2 - 12x = 4x(2x - 3)$.

À vous de jouer

Factoriser :

$E = 6 \times x - 6 \times 5$ $F = 10a - 15b$ $G = 9x^2 + 4x$ $H = 10x^2 - 15x$

$K = (3x - 2)(x + 4) + (3x - 2)(2x - 5)$ $L = (x - 3)(4x + 1) - (x - 3)(x - 4)$

➤ **À faire** : fiche d’exercices du chapitre, exercices 14 à 16.

V — Factoriser avec une identité remarquable

Propriété 4 — Les identités, de droite à gauche

$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Méthode 6 — Reconnaître une identité remarquable

Deux carrés séparés par un $-$: c’est $a^2 - b^2$. Trois termes dont deux carrés : on trouve d’abord a et b , puis on **contrôle le double produit** $2ab$.

Exemples

Factoriser :

- a) $A = x^2 - 36$
- b) $B = 9x^2 - 49$
- c) $C = 16x^2 + 24x + 9$
- d) $D = 25x^2 - 20x + 4$

Ce qui ne se factorise pas

Une somme de deux carrés comme $4x^2 + 25$; ou $4x^2 - 10x + 25$: $(2x)^2$ et 5^2 , mais $2 \times 2x \times 5 = 20x \neq 10x$.

À vous de jouer

Factoriser, si possible :

$E = 49x^2 - 1$ $F = 4 - 25x^2$ $G = x^2 + 10x + 25$ $H = 9x^2 - 12x + 4$ $K = 16x^2 + 9$ $L = 25 - 30x + 9x^2$

➤ **À faire** : fiche d’exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

VI — Factorisations avancées

Propriété 5 — Faire apparaître le facteur commun

- Une identité sur des expressions : $(\dots)^2 - (\dots)^2$, avec a et b entre crochets.
- Le « 1 » caché : $(x + 4) = 1 \times (x + 4)$; il reste 1 dans le crochet, pas 0.
- Des facteurs opposés : $3 - x = -(x - 3)$.
- Une identité dans un seul morceau : $x^2 - 16 = (x + 4)(x - 4)$ fait apparaître $(x + 4)$.

Méthode 7 — Choisir une stratégie de factorisation

Exemples

(au tableau)

Factoriser :

a) $A = (x + 5)^2 - 16$

b) $B = 3(x + 1)(x + 4) - (x + 4)$

c) $C = (2x + 1)(x - 3) + x(3 - x)$

d) $D = x^2 - 16 + (x + 4)(3x - 1)$

À vous de jouer

Factoriser :

$$E = (2x + 3)^2 - (x - 1)^2 \quad F = (x + 2)^2 + (x + 2)(3x - 5) \quad G = (6x - 4)(x + 2) + (3x - 2)(x - 1)$$

$$H = (4x - 1) - 3(4x - 1)^2 \quad K = 9x^2 - 1 - (3x - 1)(x + 2)$$

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 23.

VII — Fractions rationnelles

Définition 3 — Fraction rationnelle, valeur interdite

Une **fraction rationnelle** est un quotient d'expressions dont le dénominateur contient la lettre : $\frac{x-1}{x+3}, \frac{2}{5-x}$.

Une valeur de x qui **annule le dénominateur** est **interdite** : pour $\frac{x-1}{x+3}$, c'est -3 .

Propriété 6 — Mêmes règles que les fractions de nombres

Pour b et d non nuls : $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d}{b \times d} + \frac{c \times b}{d \times b}$. On ne simplifie que des facteurs : $\frac{x+5}{5} \neq x$.

Méthode 8 — Écrire avec une seule fraction

On donne les valeurs interdites, on met au même dénominateur, puis on réduit le numérateur seulement.

Exemples

(au tableau)

Écrire avec une seule fraction :

a) $A = 2 + \frac{3x}{x+2}$, pour $x \neq -2$

b) $B = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+2}$, pour $x \neq 0$ et $x \neq -2$

À vous de jouer

1°) Donner la valeur interdite de $\frac{3x-1}{x+4}$, puis celles de $\frac{5}{(x-2)(x+3)}$.

2°) Écrire avec une seule fraction : $C = \frac{3}{x} + \frac{1}{2}$ $D = \frac{3}{x-2} - \frac{2}{x+1}$ $E = x - \frac{4}{x}$

3°) **Bonus.** À l'aide de B , calculer $\frac{2}{1 \times 3} + \frac{2}{3 \times 5} + \frac{2}{5 \times 7} + \cdots + \frac{2}{99 \times 101}$.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

VIII — Équations du premier degré

Définition 4 — Équation, solution

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu. Une **solution** est une valeur de l'inconnue qui rend l'égalité vraie. Résoudre, c'est trouver toutes les solutions ; on les écrit dans l'ensemble S .

Propriété 7 — Règles de résolution

On garde les mêmes solutions en ajoutant (ou soustrayant) un même nombre aux deux membres, et en multipliant (ou divisant) les deux membres par un même nombre **non nul**. On se ramène à $ax = b$:

- si $a \neq 0$: $S = \left\{ \frac{b}{a} \right\}$;
- si $a = 0$ et $b \neq 0$ ($0x = b$ est toujours faux) : $S = \emptyset$;
- si $a = 0$ et $b = 0$ ($0x = 0$ est toujours vrai) : $S = \mathbb{R}$.

Méthode 9 — Résoudre une équation du premier degré

On supprime les parenthèses, puis les fractions (on multiplie **chaque terme** par le dénominateur commun), on regroupe les x d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de x .

Exemples

(au tableau)

Résoudre :

a) $4x - 5 = 9 - 2(3 - x)$

b) $\frac{x}{3} + \frac{1}{2} = \frac{x-1}{6} + 3$

c) $3(x+2) + 1 - 5x = 2(4-x) + 3$

Égalité de deux fractions

Pour $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, le produit en croix (chapitre 1) donne directement $a \times d = b \times c$.

À vous de jouer

Résoudre :

1°) $5x - 4 = 2x + 14$ 2°) $2(x - 3) - (x + 5) = 4x - 2$ 3°) $\frac{7}{6} - \frac{x}{4} = \frac{1}{3}$

4°) $\frac{x+2}{3} = \frac{3x-1}{4}$ 5°) $2(3x+5) - 4x = 12 - 2(1-x)$

Méthode 10 — Inconnue au dénominateur

On donne les valeurs interdites, on fait un produit en croix, on résout, puis on vérifie que la solution n'est pas interdite.

Exemples

(au tableau)

Résoudre $\frac{3x-2}{x-2} = \frac{5}{2}$.

À vous de jouer

Résoudre $\frac{3x+1}{x+2} = 2$ puis $\frac{4}{x+3} = \frac{1}{x}$.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 33.

IX — Équations produit

Propriété 8 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul : $A \times B = 0$ équivaut à $A = 0$ ou $B = 0$.

Méthode 11 — Résoudre une équation produit, ou s'y ramener

On met tout dans le membre de gauche ($\dots = 0$), on factorise, puis on écrit « facteur = 0 » pour chaque facteur.

Exemples

(au tableau)

Résoudre :

- a) $(x+3)(3x-7) = 0$
- b) $4x^2 - 6x = 0$
- c) $(x+2)(3x-1) = (x+2)(x+5)$
- d) $(2x-1)^2 - 9 = 0$

À vous de jouer

Résoudre :

$$1^\circ) (4x-3)(5-2x) = 0 \quad 2^\circ) 2x^2 + 8x = 0 \quad 3^\circ) (x+4)(3x-2) - (1-x)(3x-2) = 0 \quad 4^\circ) (x-2)(2x+1) = 3$$

Méthode 12 — Choisir la forme adaptée

Pour calculer une image : la forme où le calcul est le plus simple ; pour $f(x) = 0$: la forme factorisée ; pour $f(x) = k$: la forme où les nombres s'éliminent.

Exemples

(au tableau)

Soit $f(x) = (x+1)^2 - 9$.

- a) Développer, puis factoriser $f(x)$.
- b) Calculer $f(0)$, puis résoudre $f(x) = 0$, $f(x) = -8$ et $f(x) = -9$.

À vous de jouer

Soit $g(x) = (2x-1)^2 - 16$.

- 1°) Développer, puis factoriser $g(x)$.
- 2°) Avec la forme adaptée : calculer $g(0)$; résoudre $g(x) = 0$, $g(x) = -15$ et $g(x) = -16$.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 34 à 38.

X — Équations $x^2 = a$ et équations quotient

Propriété 9 — Deux cas particuliers

- $x^2 = a$: pas de solution si $a < 0$ (un carré est positif) ; la seule solution 0 si $a = 0$; deux solutions $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$ si $a > 0$.
- $\frac{A}{B} = 0$ équivaut à $A = 0$ et $B \neq 0$: un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul.

Pourquoi deux solutions ?

$5^2 = 25$ et $(-5)^2 = 25$: deux nombres opposés ont le même carré. En factorisant : $x^2 - 25 = (x-5)(x+5)$.

Méthode 13 — Résoudre $x^2 = a$

Exemples

(au tableau)

Résoudre :

- a) $x^2 = 25$
- b) $x^2 = -3$
- c) $3x^2 - 15 = 0$
- d) $(x-1)^2 = 16$

À vous de jouer

Résoudre :

$$x^2 = 64 \quad x^2 + 9 = 0 \quad 2x^2 = 72 \quad (x+2)^2 = 9$$

Méthode 14 — Résoudre une équation quotient $A/B = 0$

On cherche d'abord la valeur interdite ($B = 0$), puis on résout $A = 0$, et on retire la valeur interdite des solutions.

Exemples

(au tableau)

Résoudre :

- a) $\frac{2x-5}{x+3} = 0$
- b) $\frac{x^2-16}{x-4} = 0$

À vous de jouer

Résoudre :

$$\frac{(3x-1)(x+5)}{x-2} = 0 \quad \frac{x^2-1}{x+1} = 0$$

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

XI — Mise en équation

Méthode 15 — Résoudre un problème par une équation

On choisit l'inconnue et on l'annonce (« Soit $x \dots$ »), on traduit l'énoncé par une équation, on la résout, puis on conclut par une phrase, après avoir vérifié que le résultat a un sens.

Exemples

(au tableau)

- a) Trois amies vendent des gâteaux pour financer une sortie. Léa récolte 30 € de plus que Nina, et Inès le double de Léa. À elles trois, elles récoltent 330 €. Combien chacune a-t-elle récolté ?
- b) Une salle d'escalade propose deux tarifs : 12 € l'entrée, ou un abonnement de 40 € puis 7 € l'entrée. Pour combien d'entrées les deux tarifs coûtent-ils autant ?

À vous de jouer

- 1°) La somme de trois entiers consécutifs vaut 258. Quels sont-ils ?
- 2°) Un classeur coûte 2 € de plus qu'un cahier. Quatre cahiers et trois classeurs coûtent 27 €. Quel est le prix d'un cahier ?

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44.

XII — Problèmes de géométrie


Méthode 16 — Mettre en équation un problème de géométrie

On place x sur la figure et on précise ses valeurs possibles, on exprime les longueurs, puis les aires ou les périmètres, on écrit l'équation et on la résout; souvent, les x^2 s'éliminent. On vérifie enfin que la solution est possible.

Exemples

(au tableau)

- a) Un rectangle a pour longueur 10 cm et pour largeur x cm; un carré a pour côté $x + 3$ cm. Pour quelle valeur de x ont-ils le même périmètre?
- b) Le rectangle $ABCD$ a pour dimensions $AB = 3$ cm et $BC = 6$ cm. Le point M est sur $[AB]$ avec $AM = x$ ($x \neq 0$). On construit le carré $AMNP$ et le rectangle $NQCR$ (figure). Où placer M pour que le carré et le rectangle aient la même aire?



À vous de jouer

- 1°) La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 5 cm, et son périmètre vaut 42 cm. Quelles sont ses dimensions?
- 2°) Quand on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire augmente de 32 cm^2 . Quelle est l'aire du carré de départ?
- 3°) Un rectangle a pour dimensions $x + 8$ et x ; un carré a pour côté $x + 3$ (en cm, $x > 0$). a) Pour quelle valeur de x ont-ils la même aire? b) Peuvent-ils avoir le même périmètre?

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 45 à 50.

XIII — Isoler une grandeur

Définition 5 — Isoler une grandeur

Une formule relie plusieurs grandeurs. **Isoler** une grandeur, c'est réécrire la formule sous la forme « grandeur = ... » : on résout une équation dont l'inconnue est cette grandeur, les autres lettres jouant le rôle de nombres connus.

Méthode 17 — Isoler une grandeur

On ajoute, on soustrait, on multiplie ou on divise les deux membres par une même quantité non nulle; pour deux fractions égales, le produit en croix est souvent le plus rapide; pour une grandeur positive au carré, on finit par une racine carrée.

Exemples

(au tableau)

- a) Puissance $P = \frac{W}{t}$: isoler W , puis t .

b) $\frac{h}{H} = \frac{\ell}{L}$: isoler L .

c) Périmètre d'un triangle isocèle $P = 2a + b$: isoler a .

d) Volume d'un cône $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$: isoler le rayon r .

À vous de jouer

1°) Loi d'Ohm $U = RI$: isoler I , puis R .

2°) Périmètre d'un cercle $C = 2\pi r$: isoler r .

3°) Masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$: isoler m , puis V .

4°) Aire d'un trapèze $\mathcal{A} = \frac{(B+b) \times h}{2}$: isoler h .

5°) Conversion des températures $F = \frac{9}{5}C + 32$: isoler C .

6°) Énergie cinétique $E = \frac{1}{2}mv^2$: isoler v (avec $v > 0$).

7°) On a $3x - 2y + 5z = 12$. Exprimer x en fonction de y et z , puis calculer x pour $y = 3$ et $z = 0$.

► À faire : fiche d'exercices du chapitre, exercices 51 à 54; pour préparer le devoir commun : exercices 55 à 60.