

§1 子空间

1.1. 子空间的更多性质.

1. 基的扩充 设 W 是线性空间 V 的子空间, 则 W 的基底 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以扩充为 V 的基底 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_n$. 这是因为在 V 中取一组基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 根据替换定理, 有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{j_{r+1}}, \dots, \beta_{j_n}$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 等价并且线性无关.

2. 子空间的交与和 如果 V_1, V_2, V_3 都是 V 的子空间, 那么对于交运算有

- 交换律: $V_1 \cap V_2 = V_2 \cap V_1$;
- 结合律: $V_1 \cap (V_2 \cap V_3) = (V_1 \cap V_2) \cap V_3$;
- 封闭性: $V_1 \cap V_2 \cap \dots \cap V_s = \bigcap_{i=1}^s V_i$ 也是 V 的子空间

对于和运算有

- 交换律: $V_1 + V_2 = V_2 + V_1$;
- 结合律: $V_1 + (V_2 + V_3) = (V_1 + V_2) + V_3$;
- 封闭性: $V_1 + V_2 + \dots + V_s = \sum_{i=1}^s V_i$ 也是 V 的子空间

3. 子空间的等价条件 设 V_1, V_2 都是 V 的子空间, 那么下面三个条件是等价的:

- $V_1 \subset V_2$;
- $V_1 + V_2 = V_2$;
- $V_1 \cup V_2 = V_1$.

4. 子空间之间的关系 设 V_1, V_2 都是 V 的子空间, 那么

- 如果 $W \subset V_1, W \subset V_2$, 那么 $W \subset V_1 \cap V_2$;
- 如果 $W \supset V_1, W \supset V_2$, 那么 $W \supset V_1 + V_2$.

1.2. 维数定理.

定理 1.1. 设 V_1, V_2 都是 V 的子空间, 那么有

$$\dim(V_1 \cap V_2) + \dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2.$$

Proof. 假设 $\dim V_1 = s, \dim V_2 = t, \dim(V_1 \cup V_2) = r$. 先在 $V_1 \cap V_2$ 中取基底 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$. 然后把它扩充为 V_1 的基底 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s$. 然后对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 又扩充为 V_2 的基底 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \gamma_{r+1}, \dots, \gamma_t$.

因为 $\alpha \in V_1 + V_2$, 那么有 $\beta \in V_1, \gamma \in V_2$, 使得 $\alpha = \beta + \gamma$. 由于 β, γ 可以被上面的两个扩充的基底表示, 自然, α 可以被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s, \gamma_{r+1}, \dots, \gamma_t$ 表示, 也就是

$$V_1 + V_2 = L(\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s, \gamma_{r+1}, \gamma_t).$$

设有 $x_1, \dots, x_r, y_{r+1}, \dots, y_s, z_{r+1}, \dots, z_t \in P$ 使得

$$\sum_{i=1}^r x_i \alpha_i + \sum_{j=r+1}^s y_j \beta_j + \sum_{k=r+1}^t z_k \gamma_k = 0$$

因此

$$\sum_{j=r+1}^s y_j \beta_j = - \sum_{i=1}^r x_i \alpha_i - \sum_{k=r+1}^t z_k \gamma_k$$

由于等式左侧是 V_1 中的元素, 右侧是 $V_1 \cap V_2$ 的元素减去 V_2 中的元素, 所以我们断定, $\sum_{j=r+1}^s y_j \beta_j$ 一定属于 $V_1 \cap V_2$. 又因为 $V_1 \cap V_2$ 的基为 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, 于是一定有

$$\sum_{j=r+1}^s y_j \beta_j = \sum_{i=1}^r x'_i \alpha_i.$$

由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s$ 线性无关, 直到

$$y_{r+1} = \dots = y_s = -x'_1 = \dots = -x'_r = 0.$$

于是

$$\sum_{i=1}^r x_i \alpha_i + \sum_{k=r+1}^t z_k \gamma_k = 0.$$

因此 $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \dots, \beta_s, \gamma_{r+1}, \dots, \gamma_t$ 线性无关且为 $V_1 + V_2$ 的基. 于是

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

□

推论 1.2. 如果 $\dim V_1 + \dim V_2 > \dim V$, 那么 $V_1 \cup V_2 \neq \{0\}$.

1.3. 直和.

定理 1.3 (直和的等价定义). 设 V_1, V_2 都是 V 的子空间, 则下列条件等价:

1. $V_1 \cap V_2 = \{0\}$;
2. $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$;
3. $\forall \alpha \in V_1 + V_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2, \alpha$ 的分解式唯一.
4. $\beta \in V_1, \gamma \in V_2, \alpha$ 若 $\beta + \gamma = 0$, 那么 $\beta = \gamma = 0$.

若 V_1, V_2 满足上述五条的任何一条, 则称 $V_1 + V_2$ 是 $V_1 + V_2$ 的直和, 通常记作 $V_1 \oplus V_2$.

Proof. (1) \iff (2) 根据上述定理可知.

(1) \implies (3) 设 $\alpha = \beta + \gamma = \beta_1 + \gamma_1, \beta, \beta_1 \in V_1, \gamma, \gamma_1 \in V_2$. 两边相减就有

$$\beta - \beta_1 = \gamma - \gamma_1 \in V_1 \cap V_2 = \{0\}.$$

由此说明 $\beta = \beta_1, \gamma = \gamma_1$, 分解唯一.

(3) \implies (4) $0 = \beta + \gamma, \beta \in V_1, \gamma \in V_2$, 又因为 $0 = 0 + 0, 0 \in V_1, 0 \in V_2$. 由于分解的唯一性知 $\beta = \gamma = 0$.

(4) \implies (1) 设 $\beta \in V_1 \cap V_2$, 因此 $-\beta \in V_1 \cup V_2$, 而 $0 = \beta + (-\beta), \beta \in V_1, -\beta \in V_2$, 于是 $\beta = -\beta = 0$, 因此 $V_1 \cap V_2 = \{0\}$.

□

定义 1.1 (直和). 设 V_1, V_2, \dots, V_s 都是线性空间 V 的子空间. 又 $W = V_1 + V_2 + \dots + V_s$. 如果 $\alpha \in W$ 的分解

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s, \alpha_i \in V_i, 1 \leq i \leq s$$

是唯一的, 则称 W 是 V_1, V_2, \dots, V_s 的直和. 记为

$$W = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$$

定理 1.4. 设 V_1, V_2, \dots, V_s 为线性空间 V 的子空间. 又 $W = V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 则下面四个条件等价.

1. $W = V_1 + V_2 + \dots + V_s$.
2. $\alpha_i \in V_i, 1 \leq i \leq s$, 且 $\sum_{i=1}^s \alpha_i = 0$. 则 $\alpha_i = 0, 1 \leq i \leq s$.
3. $V_j \cap \sum_{i \neq j} V_i = (0), 1 \leq i \leq s$.
4. $\dim W = \sum_{i=1}^s \dim V_i$.

§2 商空间

定义 2.1 (商空间). 设 V 是数域 P 上的线性空间. W 是 V 的子空间. 设 $\alpha, \beta \in V$, 且 $\alpha - \beta \in W$; 则称 α, β 模 W 同余, 记为

$$\alpha \equiv \beta (\text{mod } W).$$

$$\bar{\alpha} = \{\beta, \beta \equiv \alpha (\text{mod } W)\}$$

称为 α 模 W 的同余类. 类中的任一向量称为此类的代表.

例子 2.1 (多项式同余). 对于多项式的同余, 设 $V = P[x], g(x) \neq 0$. 令 $W = \langle g(x) \rangle = \{h(x) \in P[x] | g(x) | h(x)\}$ 模 V 的子空间. 自然 $\alpha, \beta \in V, \alpha \equiv \beta (\text{mod } g(x))$ 当且仅当 $\alpha \equiv \beta (\text{mod } W)$, 且 $\{\beta | \beta \equiv \alpha (\text{mod } g(x))\} = \{\beta | \beta \equiv \alpha (\text{mod } W)\}$

例子 2.2 (空间坐标的同余). 在空间中取定标架 $\{O; \alpha, \beta, \gamma\}$. 于是 XOY 平面 π 可看成 $\mathbf{R}^{3 \times 1}$ 中子空间 $W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. 则

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} (\text{mod } W)$$

当且仅当 $c = c_1$. 因而 $\alpha = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ 的模 W 的同余类 $\bar{\alpha}$ 的图形是通过 $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{pmatrix}$ 平

行 π 的平面 π_1 .

我们构造这样的商空间, 主要是用来进行更好地对研究对象进行分类. 例如, 我们可以把相同余数的多项式分为一类, 亦可以将相同的高度的坐标分为一类. 实际上, 同

余也是一个等价关系.

1. (自反性). $\alpha \equiv \alpha(\text{mod } W)$
2. (对称性). 若 $\alpha \equiv \beta(\text{mod } W)$, 则 $\beta \equiv \alpha(\text{mod } W)$.
3. (传递性). 若 $\alpha \equiv \beta(\text{mod } W), \beta \equiv \gamma(\text{mod } W)$, 则 $\alpha \equiv \gamma(\text{mod } W)$.

实际上, 我们还会发现, 我们的两个同余类或者相等, 或者不相交.

4. $\alpha, \beta \in V. \bar{\alpha} = \bar{\beta}$ 当且仅当 $\bar{\alpha} \cap \bar{\beta} \neq \emptyset$ 当且仅当 $\alpha \equiv \beta(\text{mod } W)$.

我们接下来说明商空间也是线性空间.

定理 2.1. 设 W 是 V 的子空间. 又 $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2 \in V, k \in \mathbf{P}$. 且 $\alpha_i \equiv \beta_i(\text{mod } W), i = 1, 2$. 则

$$\alpha_1 + \alpha_2 \equiv \beta_1 + \beta_2(\text{mod } W).$$

$$k\alpha_1 \equiv k\beta_1(\text{mod } W).$$

定理 2.2. 设 V 是数域 \mathbf{P} 上的线性空间. W 是 V 的一个子空间. 以 V/W 表示 V 中元素模 W 的同余类的集合. 在: V/W 中定义加法和纯量乘法如下:

$$\bar{\alpha} + \bar{\beta} = \overline{\alpha + \beta}, \forall \bar{\alpha}, \bar{\beta} \in V/W,$$

$$k \cdot \bar{\alpha} = \overline{k\alpha}, \forall \bar{\alpha} \in V/W, k \in \mathbf{P}.$$

则 V/W 构成数域 \mathbf{P} 上的线性空间, 称为 V 对 W 的商空间.