


§1 上取整和下取整

实际上, 上取整和下取整实际上英语是对应着房子的“天花板”和“地板”.



1.1. 基本定义.


定义 1.1 (上取整和下取整). $\forall x \in \mathbb{R}$, 定义下取整函数和上取整函数

$\lfloor x \rfloor :=$ 最大的 $\leq x$ 的整数

$\lceil x \rceil :=$ 最小的 $\geq x$ 的整数

分别称他们为“上取整函数”和“下取整函数”.

例子 1.1. 绘制出下取整函数的图像



上取整函数的图像也是同理.

性质 1.1. 取整函数有如下的三个性质:

1. $\lfloor x \rfloor = x \iff x$ 是正数 $\iff \lceil x \rceil = x$.
2. (放缩) $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$.
3. (对称) $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$, $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$.

性质 1.2. 实际上, 上下取整函数是对一类不等式的缩写

$$\lfloor x \rfloor = n \begin{cases} \iff x - n \leq x & (\text{固定 } x, \text{ 考察 } n \text{ 的范围}) \\ \iff n \leq x \leq n + 1 & (\text{固定 } n, \text{ 考察 } x \text{ 的范围}) \end{cases}$$

$$\lceil x \rceil = n \begin{cases} \iff x \leq n \leq x+1 \\ \iff n-1 < x \leq n. \end{cases}$$

推论 1.3. 若 $n \in \mathbb{Z}$, $\lfloor x+n \rfloor = \lfloor x \rfloor + n$.

注: 实际上, 这一个性质经常用于将整数 (也许是配凑出来的) 移入或者移出取整记号中.

为了更加彰显不等式的地位, 特别有下面的一个不等式.

性质 1.4 (上下取整的不等式).

$$\begin{aligned} x < n &\iff \lfloor x \rfloor < n; & n < x &\iff n < \lceil x \rceil. \\ x \leq n &\iff \lfloor x \rfloor \leq n; & n \leq x &\iff n \leq \lceil x \rceil. \end{aligned}$$

这是一个重要的式子. 可以通过分类讨论的方法证明之.

定义 1.2 (分数部分). 定义一个数的分数部分为 $x - \lfloor x \rfloor$. 如果与集合的记号不相冲突的话, 可以记作 $\{x\}$.

例子 1.2. $\lfloor x+y \rfloor$ 是否永远等于 $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$? 实际上不是这样的. 将 x, y 写作 $x = \lfloor x \rfloor + \{x\}$, $y = \lfloor y \rfloor + \{y\}$, 那么

$$\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor \{x\} + \{y\} \rfloor$$

我们发现当且仅当 $\{x\} + \{y\} < 1$ 时, $\lfloor x+y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$. 否则由于 $0 \leq \{x\} + \{y\} < 2$, 其为 $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$.

1.2. 上取整, 下取整的复合. 我们首先考察一些基本例子得到的结果.

例子 1.3. $\lceil \lfloor x \rfloor \rceil = \lfloor x \rfloor$; $\lfloor \lceil x \rceil \rfloor = \lceil x \rceil$. 直接将两者复合得到的结果是平凡的.

例子 1.4. 证明或推翻: $\lfloor \sqrt{\lfloor x \rfloor} \rfloor = \lfloor \sqrt{x} \rfloor$.

首先尝试举反例, 但是 $\pi, e, \phi, 1, 2 \dots$ 都是正确的, 于是考虑证明.

我们的目标为想办法除去 $\sqrt{\quad}$ 下的 $\lfloor \cdot \rfloor$. 假设 $m := \lfloor \sqrt{\lfloor x \rfloor} \rfloor$, 解掉最外层的底可以得到

$$m \leq \sqrt{\lfloor x \rfloor} < m+1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow m^2 &\leq \lfloor x \rfloor < (m+1)^2 \\ \Rightarrow m^2 &\leq x < (m+1)^2. \implies m \leq \sqrt{x} < (m+1)^2 \\ \Rightarrow m &\leq \lfloor \sqrt{x} \rfloor < (m+1)^2. \end{aligned}$$

考虑泛化上述的例子.

定理 1.5. 令 $f(x)$ 为一个连续, 单调递增的函数, 满足

$$f(x) \text{ 是整数} \implies x \text{ 是整数}.$$

那么有

$$\lfloor f(x) \rfloor = \lfloor f(\lfloor x \rfloor) \rfloor, \lceil f(x) \rceil = \lceil f(\lceil x \rceil) \rceil.$$

只要 $f(x), f(\lfloor x \rfloor), f(\lceil x \rceil)$ 有定义.

Proof. 1° 如果 x 是整数, 那么显然成立.

2° 若 $x > \lfloor x \rfloor$, 由于 f 单调递增, 那么 $f(x) > f(\lfloor x \rfloor)$. 然后两端同时取下取整符号, 由于下取整记号不减, 那么 $\lfloor f(x) \rfloor \geq \lfloor f(\lfloor x \rfloor) \rfloor$. 我们接下来分类讨论, 以确定大于号的情形不成立.

- 如果 $\lfloor f(x) \rfloor = \lfloor f(\lfloor x \rfloor) \rfloor$, 那么这就是我们想要的.
- 如果 $\lfloor f(x) \rfloor > \lfloor f(\lfloor x \rfloor) \rfloor$, 那么由于 f 是一个连续的函数, 一定存在 y , 使得 $\lfloor x \rfloor \leq y < x$, 并且 $f(y) = \lfloor f(\lfloor x \rfloor) \rfloor$. 根据 f 的性质, y 一定也是整数. 但是 $\lfloor x \rfloor$ 与 x 之间不存在另一个整数, 矛盾! 所以我们的假设不成立.

□

推论 1.6.

$$\left\lfloor \frac{x+m}{n} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor + m}{n} \right\rfloor, \left\lceil \frac{x+m}{n} \right\rceil = \left\lceil \frac{\lceil x \rceil + m}{n} \right\rceil.$$

比如,

$$\lfloor \lfloor \lfloor x/10 \rfloor / 10 \rfloor / 10 \rfloor = \lfloor x/1000 \rfloor.$$

1.3. 区间计数问题. 如果我们用如下的简写记后面的区间:

$$\begin{cases} [\alpha, \beta] & \alpha \leq x \leq \beta \\ (\alpha, \beta] & \alpha < x \leq \beta \\ [\alpha, \beta) & \alpha \leq x < \beta \\ (\alpha, \beta) & \alpha < x < \beta \end{cases}$$

我们的问题是这个集合里面包含了多少个整数. (α, β 不一定是整数).

首先, 简化考虑的问题情形. 如果 α, β 均为整数, 那么数量就是

$$\beta - \alpha + \text{“}[\text{” 的个数} - 1$$

然后, 考虑转换, 因为

$$\alpha \leq n < \beta \Leftrightarrow \lceil \alpha \rceil \leq n < \lceil \beta \rceil$$

$$\alpha < n \leq \beta \Leftrightarrow \lfloor \alpha \rfloor < n \leq \lfloor \beta \rfloor$$

所以余下二者仅需要补充上 “+1” 或者 “-1”. 也就是

$$\begin{aligned} [\alpha, \beta] & \quad \lfloor \beta \rfloor - \lceil \alpha \rceil + 1 \\ (\alpha, \beta) & \quad \lfloor \beta \rfloor - \lfloor \alpha \rfloor - 1. \end{aligned}$$

注:

1. 我们习惯使用左闭右开的括号序列, 因为其具有可加性.

2. 上述记号在关于求和取整时非常有用, 因为可以迅速的把这些技术的内容收缩下来.

例子 1.5. 抽奖游戏. 在 $[1, 1000]$ 中选一整数. 记抽出数为 n . 若 $\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor \setminus n$ (记号 $a \setminus b$ 表示 a 是 b 的正因子), 那么他就贏取了 5 元. 否则, 他就输了 1 元. 请求出它玩这个游戏得到的期望.

$$\begin{aligned}
 W &= \sum_{n=1}^{1000} [\text{抽到 } n \text{ 会让我们赢}] \\
 &= \sum_{1 \leq n \leq 1000} [\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor \setminus n] \stackrel{k:=\sqrt[3]{n}}{=} \sum_{k,n} [k = \lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor] [k \setminus n] [1 \leq n \leq 1000] \\
 &\stackrel{k \setminus n \text{ 变形为 } n=km}{=} \sum_{k,m,n} [(k)^3 \leq n < (k+1)^3] [n = km] [1 \leq n \leq 1000] \\
 &\stackrel{\text{换掉 } n:=km}{=} \sum_{k,m} [k^3 \leq km < (k+1)^3] [1 \leq km \leq 1000] \\
 &\stackrel{m=n/k=n/\lfloor \sqrt[3]{n} \rfloor}{=} 1 + \sum_{k,m} [k^3 \leq km < (k+1)^3] [1 \leq k < 10] \\
 &= 1 + \sum_{1 \leq k \leq 10} (\lceil k^2 + 3k + 3 + \frac{1}{k} \rceil - \lceil k^2 \rceil) \\
 &= 1 + \sum_{1 \leq k < 10} (3k + 4) = 172
 \end{aligned}$$

拓展问题: 在 $[1..n]$ 中呢? 记 K 为最大的满足 $K^3 \leq n$ 的数字. 也就是我们先求出较为整体的部分.

$$W = \sum_{1 \leq k < K} (3k + 4) + \sum_m [K^3 \leq K_m < N] = \frac{3}{2}K^2 + \frac{5}{2}K - 4 + \underbrace{\sum_m [m \in [K^2, N/K]]}_{\lfloor \frac{N}{K} \rfloor - K^2 + 1}$$

然后可以着手求零碎的部分. 较为零碎的部分并没有很好的封闭表达式, 因此我们只能够讨论它的渐进特性. 这个特性会在后续展开.

例子 1.6. 对于 $\alpha \in \mathbb{R}$, α 的谱是一个多重集, 定义做

$$\text{spec}(\alpha) := \{\lfloor \alpha \rfloor, \lfloor 2\alpha \rfloor, \dots\}$$

我们证明两个事实:

第一, $\alpha \neq \beta \Rightarrow \text{Spec}(\alpha) \neq \text{Spec}(\beta)$.

证明说: 不妨设 $\alpha < \beta$. 我们发现 $\exists m$, s.t. $m(\beta - \alpha) \geq 1$. (可以取 $\lceil \frac{1}{\beta - \alpha} \rceil$). 由此 $m\beta - m\alpha \geq 1$, $m\beta \geq 1 + m\alpha \Rightarrow \lfloor m\beta \rfloor > \lfloor m\alpha \rfloor$. 因而 $\text{Spec}(\beta)$ 中 $\leq \lfloor m\alpha \rfloor$ 的元素小于 m 个. 而 $\text{Spec}(\alpha)$ 中至少有 m 个 $\leq \lfloor m\alpha \rfloor$ 个元素. 这就表示这两个不同的谱序列永远不可能相等.

第二, $\text{Spec}(\sqrt{2}) \cup \text{Spec}(2 + \sqrt{2}) = \mathbb{N}$, $\text{Spec}(\sqrt{2}) \cap \text{Spec}(2 + \sqrt{2}) = \emptyset$.

证明说: 考虑有多少个 $\leq n$ 个元素在 $\text{spec}(\sqrt{2})$ 里面, 有多少个 $\leq n$ 的元素在 $\text{Spec}(2 + \sqrt{2})$ 里面. 定义 $N(\alpha, n)$ 表示 $\text{Spec}(\alpha)$ 中 $\leq n$ 的元素个数.

$$\begin{aligned}
 N(\alpha, n) &= \sum_{k>0} [\lfloor k\alpha \rfloor \leq n] \\
 &= \sum_{k>0} [\lfloor k\alpha \rfloor < n+1] \\
 &= \sum_{k>0} [k\alpha < n+1] = \sum_k \left[0 < k < \frac{n+1}{\alpha} \right] \\
 &= \left\lceil \frac{n+1}{\alpha} \right\rceil - 1.
 \end{aligned}$$

然后求 $N(\sqrt{2}, n) + N(2 + \sqrt{2}, n) \stackrel{?}{=} n$

$$\begin{aligned}
 &\left\lceil \frac{n+1}{\sqrt{2}} \right\rceil - 1 + \left\lceil \frac{n+1}{2+\sqrt{2}} \right\rceil - 1 = n \\
 \Leftrightarrow &\left\lfloor \frac{n+1}{\sqrt{2}} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{2+\sqrt{2}} \right\rfloor = n && ([x] - \lfloor x \rfloor = [x \text{ is not int }]) \\
 \Leftrightarrow &\underbrace{\frac{n+1}{\sqrt{2}} + \frac{n+1}{2+\sqrt{2}}}_{n+1} - \underbrace{\left(\left\{ \frac{n+1}{\sqrt{2}} \right\} + \left\{ \frac{n+1}{2+\sqrt{2}} \right\} \right)}_{1, \text{ 因为两个不是整数的加起来等于整数一定进位了}} = n
 \end{aligned}$$

这样的结论可推广到 $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1 \Leftrightarrow \text{Spec}(\alpha) \cup \text{Spec}(\beta) = \mathbb{N}$.

§2 二元运算: 模 (mod) 运算

2.1. 模. 我们已经知道了 n/m 的商为 $\lfloor n/m \rfloor$, 我们下面定义 n/m 的余数.

定义 2.1. $n \bmod m$ 为 n/m 的余数. 即

$$n \bmod m := n - m \left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor, \forall n, m \in \mathbb{R}, m \neq 0.$$

特别地, 定义 $n \bmod 0 = n$ (方使起见).

例子 2.1.

$$\begin{aligned} 5 \bmod 3 &= 2 \\ 5 \bmod (-3) &= 5 - (-3) \left\lfloor \frac{5}{-3} \right\rfloor = 5 - 3 \times 2 = -1 \\ -5 \bmod 3 &= -5 - 3 \left\lfloor \frac{-5}{3} \right\rfloor = 1 \\ -5 \bmod (-3) &= -5 - (-3) \times \left\lfloor \frac{-5}{-3} \right\rfloor = -2. \end{aligned}$$

可见, 对 $x \bmod y$ 而言, 若 $y > 0, 0 \leq x \bmod y < y$;
 $y < 0, 0 \geq x \bmod y > y$.

例子 2.2.

$$x = \lfloor x \rfloor + \{x\} = \lfloor x \rfloor + x \bmod 1.$$

同样可以使用上取整定义“不足近似量”.

定义 2.2.

$$n \text{ mumble } m := m \left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil - n, \forall n, m \in \mathbb{R}, m \neq 0.$$

例子 2.3.

$$\begin{aligned} 5 \text{ mumble } 3 &= 3 \left\lceil \frac{5}{3} \right\rceil - 5 = 1. \\ 5 \text{ mumble } (-3) &= -3 \left\lceil \frac{5}{-3} \right\rceil - 5 = -2 \\ -5 \text{ mumble } 3 &= 2 \\ -5 \text{ mumble } -3 &= -1. \end{aligned}$$

我们首先注意一个性质:

性质 2.1.

$$c(x \bmod y) = cx \bmod cy$$

Proof. 首先验证一般情况:


$$\begin{aligned} c(x \bmod y) &= c \left(x - y \left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor \right) = cx - cy \left\lfloor \frac{x}{y} \right\rfloor \\ &= cx - cy \left\lfloor \frac{cx}{cy} \right\rfloor \\ &= cx \bmod cy. \end{aligned}$$

然后对于 0 的情况, 有

$$c(x \bmod 0) = cx \bmod 0 = cx$$

也成立, 所以上面的性质成立. \square

例子 2.4. 我们希望能尽可能平均地将 n 个物品分为 m 份. 如 $37 = 8 + 8 + 8 + 8 + 5 = 8 + 8 + 7 + 7 + 7$.



可以考虑横着放

- 若 $n \nmid m$, “长的行”将会容纳 $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ 个物品. $(n \bmod m)$
- 若 $n \nmid m$, “短的行”将会容纳 $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$ 个物品. $(n \bmod m)$

并且两种行最多仅仅相差 1.

我们考虑另一种方法. 要把 n 个物品“尽可能平均”分为 m 个组时 (干脆使用 $f(n, m)$ 表示之), 我们有如下的情况:

1. 把 $\lceil n/m \rceil$ 个物品放到当前组中
2. 递归执行 $f(n - \lceil n/m \rceil, m - 1)$.

比如 $m = 314, n = 6$, 那么有下表格的过程:

n	m	$\lceil n/m \rceil$
314	6	53
261	5	53
208	4	52
156	3	52
104	2	52
52	1	52

我们来说明这个算法的正确性. 假设 $n = \underbrace{q}_{\lceil n/m \rceil} m + \underbrace{r}_{n \bmod m}$. 那么

1. 若 $r = 0$, 放 $\lceil n/m \rceil = q, f(n - q, n - 1)$ 仍为 $r = 0$ 的情形.
2. 考 $r > 0, f(n - (q + 1), n - 1)$, 使下一次调用 r 减少 1.

这样一来, 最后一定会到达 $r = 0$ 的情形.

接下来我们考虑第 k 组有多少物品. 答案是 $\begin{cases} \lceil n/m \rceil, 1 < k \leq n \bmod m \\ \lfloor n/m \rfloor, n \geq k > n \bmod m \end{cases}$

稍加改写, 有

$$\begin{aligned}
 &= q + [k \leq r] = q + \left\lceil \frac{r - k + 1}{m} \right\rceil \\
 &= \left\lceil \frac{r - k + 1}{m} \right\rceil + q = \left\lceil \frac{mq + r - k + 1}{m} \right\rceil \\
 &= \left\lceil \frac{n - k + 1}{m} \right\rceil.
 \end{aligned}$$

根据上述的例子, 我们就得到了一个恒等式:

$$n = \left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil + \left\lceil \frac{n-1}{m} \right\rceil + \cdots + \left\lceil \frac{n-m+1}{m} \right\rceil.$$

同时我们可以证明下面的命题:

性质 2.2.

$$\begin{aligned}
 n &= \underbrace{\left\lfloor \frac{n}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+1}{m} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{n+m}{m} \right\rfloor}_{m \text{ 项}} \\
 n &= \overbrace{\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil + \left\lceil \frac{n-1}{m} \right\rceil + \cdots + \left\lceil \frac{n-m+1}{m} \right\rceil}
 \end{aligned}$$

要证明这两个对称的形式, 只要注意到 $n = \lceil n/2 \rceil + \lfloor n/2 \rfloor$ 即可.

将 n 替换为 mx 可以得到如下推论:

推论 2.3.

$$\lfloor mx \rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{m} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor x + \frac{m-1}{m} \right\rfloor$$

Proof.

$$\begin{aligned}
 \lfloor mx \rfloor &= \left\lfloor \frac{\lfloor mx \rfloor}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{\lfloor mx \rfloor + 1}{m} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{\lfloor mx \rfloor + m-1}{m} \right\rfloor \\
 &\stackrel{\text{去掉下取整}}{=} \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{1}{m} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor x + \frac{m-1}{m} \right\rfloor
 \end{aligned}$$

□

2.2. 关于求和的递归式. 接下来看一些关于求和的递归式.

例子 2.5. 有如下的递推关系:

$$\begin{aligned}
 K_0 &= 1 \\
 K_{n+1} &= 1 + \min(2K_{\lfloor n/2 \rfloor}, 3K_{\lfloor n/3 \rfloor}).
 \end{aligned}$$

求证 $K_n \geq n, \forall n \geq 0$.

Proof. 使用归纳法.

- $n = 0$, 成立.

- 假设这个性质对 $0, 1, \dots, n$ 成立, 要推是否对 $n+1$ 成立. 由于 $K_{n+1} = 1 + \min(2K_{\lfloor n/2 \rfloor}, 3K_{\lfloor n/3 \rfloor})$, 以及归纳假设可知: $2K_{\lfloor n/2 \rfloor} \geq 2\lfloor n/2 \rfloor, 3K_{\lfloor n/3 \rfloor} \geq 3\lfloor n/3 \rfloor$. 根据大小关系分类讨论:

- 如果 $2\lfloor \frac{n}{2} \rfloor = n$ 或 $3\lfloor \frac{n}{3} \rfloor = n$, 命题得证.
- 如果 $K_{\lfloor n/2 \rfloor} < \frac{n}{2}$ 或 $K_{\lfloor n/3 \rfloor} < n/3$, 那么以 $K_{\lfloor n/2 \rfloor} < \frac{n}{2}$ 为例, 就可以得到 $K_{\lfloor n'/2 \rfloor} \leq \lfloor \frac{n'}{2} \rfloor$, $K_{\lfloor \lfloor n'/2 \rfloor / 2 \rfloor} \leq \lfloor \frac{n'}{4} \rfloor$. 这就可以推出 $K_0 \leq 0$. 但 $K_0 = 1$, 矛盾! $K_{\lfloor n'/3 \rfloor} \leq \lfloor \frac{n'}{3} \rfloor$ 同理, 此情况不成立!

□

例子 2.6. 为 $\sum_{k=1}^n \lceil \lg k \rceil$ 寻找封闭形式.

实际上, 本式子是从选择排序的运行时间引申的. 记 $m = \lceil \lg n \rceil$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \lceil \lg k \rceil &= \sum_{k=1}^{2^m} \lceil \lg k \rceil = j[j = \lceil \lg k \rceil] [1 \leq k \leq 2^m] \\ &= \sum_{j,k} j [2^{j-1} < k \leq 2^j] [1 \leq j \leq m] \\ &= \sum_{j=1}^m (2^j - 2^{j-1}) j = 2^m(m-1) + 1. \end{aligned}$$

然后再加上 $\lceil \lg n \rceil \dots n$ 的内容, 共有 $(n-m) \cdot (m+1)$ 项. 故封闭形式为 $2^m(m-1) + 1 + (n-m)(m+1)$.


例子 2.7 (Josephus 问题). 求解递归式

$$J(1) = 1$$

$$J(n) = 2J\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) - (-1)^n, n > 1.$$

的推广: 每隔 m 个人杀死一个.

我们采取一个新思路, 每一个人经过的时候, 赋予它一个新的编号, 在下面的例子中, 展示的是每隔 3 个人杀死一个:



这样一来, 第 k 个被移除的人拥有号码 $3k$. 我们按照是不是他们的本身的号码进行分类讨论.

- $N > n$, 说明轮过一轮了, 若 ($N = n + 2k + 1$ 或 $N = n + 2k + 2$), 那么前一个数分别是 ($3k + 1$ 或 $3k + 2$), 其中 $k = \lfloor \frac{N-n-1}{2} \rfloor$.

因此寻找最后一个人的代码就可以用如下的伪代码实现:

$$N \leftarrow 3n$$

$$\text{while } N > n, \quad N \leftarrow 3 \left\lfloor \frac{N-n-1}{2} \right\rfloor + (N-n-2k)$$

$$J_3(n) \leftarrow N. \quad = \left\lfloor \frac{N-n-1}{2} \right\rfloor + N - n$$

下面做变量代换, 从 $3n$ 到 1 反向编号, 就有

$$\begin{aligned} D + 3n + 1 - \left(\left\lfloor \frac{(3n+1-D)-n-1}{2} \right\rfloor + (3n+1-D) - n \right) \\ = n + D - \left\lfloor \frac{2n-D}{2} \right\rfloor = D - \left\lfloor \frac{-D}{2} \right\rfloor = D + \left\lceil \frac{D}{2} \right\rceil = \left\lceil \frac{3}{2}D \right\rceil. \end{aligned}$$

我们以一段对于数学归纳法的讨论结束这一小节.

In trying to devise a proof by the Mathematical induction, you may fail for two opposite reasons. You may fail because you try to prove too much, Your $P(n)$ is too heavy a burden; Yet you may also fail because you prove too little, Your $P(n)$ is too weak to support. In general, you have to balance the statement of your theorem so that the support is just enough for the burden.

— G. Polya

§3 关于底和顶的和式

3.1. 取整：使用新变量替代. 在第 1.3 节中, 我们令 $m := \lfloor \sqrt{k} \rfloor$, 然后施用第 1 节中得到的 $m \leq \sqrt{k} < m+1$ 不等式, 最后使用了计数这个区间里面有多少个整数的方法.

另一种方法: 使用 $\sum_j [1 \leq j \leq x]$ 代替 $\lfloor x \rfloor$. ($x > 0$). 假若 $n = a^2$, 那么

$$\begin{aligned} \sum_{0 \leq k < n} \lfloor \sqrt{k} \rfloor &= \sum_{j,k} [1 \leq j \leq \sqrt{k}] [0 \leq k \leq a^2] \\ &= \sum_{1 \leq j < a} \sum_k [j^2 \leq k < a^2] \\ &= \sum_{1 \leq j < a} (a^2 - j^2) = a^3 - \frac{1}{3}a \left(a + \frac{1}{2}\right) (a+1) \end{aligned}$$

3.2. 等差数列的例子. 我们希望求

$$\sum_{0 \leq k < m} \left\lfloor \frac{nk+x}{m} \right\rfloor, m > 0, n \in \mathbb{Z}.$$

的封闭形式.

实际上各种情况下, 我们首先要做的事情是观察特例.

- 当 $n = 1$ 的时候, $x := \frac{x}{m}$, 得

$$\left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{1+x}{m} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \frac{m-1+x}{m} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

- 当 $m = 2$ 的时候,

$$\sum_{0 \leq k < m} \left\lfloor \frac{nk+x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n+x}{2} \right\rfloor$$

分类讨论:

1. n 是偶数: $\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \frac{n}{2} = 2 \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \frac{n}{2}$.
 2. n 是奇数: $\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+1}{2} \right\rfloor + \frac{n-1}{2} = \lfloor x \rfloor + \frac{n-1}{2}$.
- 若令 $m = 3$,

$$\sum_{0 \leq k < m} \left\lfloor \frac{nk+x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+n}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2n}{3} \right\rfloor$$

分类讨论:

1. $n \bmod 3 = 0$: $\frac{n}{3}, \frac{2n}{3} \in \mathbb{Z}$. 和为

$$\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left(\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \frac{n}{3} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \frac{2n}{3} \right) = 3 \left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + n$$

2. $n \bmod 3 = 1$, $\frac{n-1}{3}, \frac{2(n-1)}{3} \in \mathbb{Z}$. 和为

$$\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left(\left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor + \frac{n-1}{3} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor + \frac{2n-2}{3} \right) = \lfloor x \rfloor + n - 1$$

$$3. \ n \bmod 3 = 2, \frac{n-2}{3}, \frac{2(n-2)}{3}, \frac{2n-1}{3} \in \mathbb{Z},$$

$$\left\lfloor \frac{x}{3} \right\rfloor + \left(\left\lfloor \frac{x+2}{3} \right\rfloor + \frac{n-2}{3} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor + \frac{2n-1}{3} \right) = \lfloor x \rfloor + n - 1.$$

- 若令 $m = 4, \sum_{0 \leq k < m} \left\lfloor \frac{nk+x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+n}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2n}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+3n}{4} \right\rfloor$. 那就分为 4 类.
- 1. $n \bmod 4 = 0$ 的情况:

$$\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \left(\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \frac{n}{4} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \frac{2n}{4} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \frac{3n}{4} \right) = 4 \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \frac{3n}{2}.$$

$$2. \ n \bmod 4 = 1,$$

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \left(\left\lfloor \frac{x+1}{4} \right\rfloor + \frac{n-1}{4} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x+2}{4} \right\rfloor + \frac{2n-2}{4} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x+3}{4} \right\rfloor + \frac{3n-3}{4} \right) \\ = \lfloor x \rfloor + \frac{3n}{2} - \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

$$3. \ n \bmod 4 = 2,$$

$$\begin{aligned} \left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \left(\left\lfloor \frac{x+2}{4} \right\rfloor + \frac{n-2}{4} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \frac{2n}{4} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x+2}{4} \right\rfloor + \frac{3n-2}{4} \right) \\ = 2 \left(\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{x+2}{4} \right\rfloor \right) + \frac{3n}{2} - 1 = 2 \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor + \frac{3n}{2} - 1. \end{aligned}$$

$$4. \ n \bmod 4 = 3,$$

$$\left\lfloor \frac{x}{4} \right\rfloor + \left(\left\lfloor \frac{x+1}{4} \right\rfloor + \frac{3n-1}{4} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x+2}{4} \right\rfloor + \frac{2n-2}{4} \right) + \left(\left\lfloor \frac{x+3}{4} \right\rfloor + \frac{n-3}{4} \right) = \lfloor x \rfloor + \frac{3n}{2} - \frac{3}{2}.$$

总结为表格, 就有