

计算机数学 (8-paths-cycles: 路径与圈)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@hnu.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2026 年 5 月 15 日发布作业 2026 年 6 月 19 日发布答案

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1

设 $G = (V, E)$ 是无向图 (不一定是简单无向图), 其中 $|E| = m$ 。请证明^①,

^① 这也说明了, G 中度数为奇数的顶点数目为偶数。

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m.$$

证明:

每条边贡献了 2 度。所以^②,

^② 这也被称为“握手定理”。

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m.$$

□

题目 2

- (1) 请证明: 每个 uv 闭道路 (closed walk) 都包含一个 uv 路径 (path)。
(2) 请证明: 每个长度为奇数的闭道路 (closed walk) 都包含一个长度为奇数的圈 (cycle)^③。

^③ “长度”就是所含边的条数。

(提示: 可用数学归纳法。如果你使用数学归纳法, 请注意数学归纳法的书写规范。)

证明:

- (1) 闭道路两端相同, 故可设 $u = v$ 。设 $W = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ 为长度 k 的 uu 闭道路 ($v_0 = v_k = u$)。对 k 作强数学归纳, 证明每个这样的闭道路都包含一条 uu 路径。

基础步骤: $k = 0$ 时, $W = (u)$ 即为一条 uu 路径。

归纳假设: 每个长度 $k' < k$ 的 uu 闭道路都包含一条 uu 路径。

归纳步骤: 设 W 长度为 $k \geq 1$ 。若 $v_0, \dots, v_{k-1}$ 两两不同, 则 W 本身就是 uu 路径。否则, 在 $v_0, \dots, v_{k-1}$ 中 (不计终点 $v_k = v_0$) 取首次重复出现的顶点 x , 设其两次出现位置为 v_i 与 v_j ($0 \leq i < j \leq k-1$)。则

$$W_1 = (v_i, \dots, v_j), \quad W_2 = (v_j, \dots, v_k, v_1, \dots, v_i)$$

是两条更短的 xx 闭道路, 且 $|W_1|, |W_2| < k$ 。由归纳假设, W_1 含 xx 路径 P_1 , 其长度严格小于 $|W_1|$ 。将 W 中 $(v_i, \dots, v_j)$ 替换为 P_1 , 得长度 $< k$ 的 uu 闭道路 W' 。再由归纳假设, W' 含 uu 路径, 它也是 W 的子道路, 故 W 含 uu 路径。

(2) 对闭道路的长度 l 作强数学归纳。

基础步骤: $l = 1$ 。长度为 1 的闭道路即是长度为 1 的圈。显然成立。

归纳假设: 假设每个长度为奇数 $1 \leq l < k$ (k 为奇数) 的闭道路都包含一个长度为奇数的圈。

归纳步骤: 考虑长度为奇数 $k > 1$ 的闭道路 W 。分两种情况讨论:

- 如果 W 中不包含重复顶点 (除了起点与终点), 则 W 即为长度为奇数的圈。
- 不妨设 W 中包含重复顶点 (除了起点与终点) v 。 W 可看作两条起点、终点均为 v 的闭道路。其中必有一条的长度为奇数, 记该闭道路为 U , 长度为 u , 有 $1 \leq u < k$ 。根据归纳假设, U 中包含一个长度为奇数的圈。 $\square$

题目 3

设 G 是一个简单无向图 (undirected simple graph) 且满足

$$\delta(G) \geq k,$$

其中 $k \in \mathbb{N}^+$ 为常数。请证明:

- (1) G 包含长度 $\geq k$ 的路径;
- (2) 如果 $k \geq 2$, 则 G 包含长度 $\geq k + 1$ 的圈。

提示: By Externality。

证明:

- (1) 考虑 G 中的一条极大路径 P 。设 u 是 P 的一个端点。因为 P 是极大路径, u 的所有邻居顶点都在 P 上。因为 $\deg(u) \geq \delta(G) \geq k$ 且 G 是简单图, 所以除了端点 u , P 至少还包含 k 个顶点。故, P 的长度 $\geq k$ 。
- (2) 假设 $k \geq 2$ 。设 v 是 u 的邻居顶点中距离 u 最远 (在顺着路径 P 的意义下) 的顶点。则边 $\{u, v\}$ 以及路径 P 中从 u 到 v 的一段子路径构成了长度 $\geq k + 1$ 的圈。 $\square$

题目 4


考虑下图, 记为 G 。

- (1) G 是否是欧拉图? 请说明理由。
- (2) 如果是欧拉图, 请将其分解为若干圈的组合, 并给出一个欧拉回路。 (可以自行给顶点编号, 也可以使用图上边的编号描述回路。)

证明:

- (1) G 是欧拉图。因为 G 中每个顶点的度数都是偶数。
- (2) 可将 G 分解成如下三个圈的组合:

- $A - B - F - H - K$
- $C - G - J$
- $D - E - I$




一个欧拉回路: $A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K$ 。

□

题目 5

请判断下图 G 是否是 Hamilton 图 (Hamiltonian graph), 并说明理由。



证明:

G 是 Hamilton 图。

外层 8 个顶点构成圈 $u_0 u_1 \cdots u_7 u_0$, 内层 8 个顶点通过“隔 2 连边”分成两个圈 $v_0 v_2 v_4 v_6 v_0$ 与 $v_1 v_3 v_5 v_7 v_1$, 且每个 u_i 与 v_i 相连。

一个 Hamilton 圈为

$$u_0, v_0, v_2, u_2, u_3, v_3, v_5, u_5, u_4, v_4, v_6, u_6, u_7, v_7, v_1, u_1, u_0.$$

它经过每个顶点恰好一次并回到起点, 故 G 是 Hamilton 图。

□

题目 6

在圆周上取 n 个点。将每个点与圆周上两个方向上各自距离它最近的两个点相连, 得到一个 4-正则图 G_n 。

请证明: 当 $n \geq 5$ 时, G_n 可以表示为两个 Hamilton 圈的并。

证明:

将圆周上的点记为 $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}$ 。则 G_n 的边集为

$$E(G_n) = \{\{v_i, v_{i+1}\}, \{v_i, v_{i+2}\} \mid 0 \leq i \leq n-1\}.$$

(1) n 为奇数。令

$$H_1 = (v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_0),$$

它使用全部“距离为 1”的边, 因而是一条 Hamilton 圈。

$$H_2 = (v_0, v_2, v_4, \dots, v_{n-1}, v_0),$$

其中每一步都沿“距离为 2”的边前进。该序列依次访问全部 n 个顶点并回到 v_0 , 故 H_2 也是 Hamilton 圈。又 H_2 只使用“距离为 2”的边, 与 H_1 边不交, 故

$$E(G_n) = E(H_1) \sqcup E(H_2).$$

例如 $n = 5$ 时,

$$H_1 = (v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_0), \quad H_2 = (v_0, v_2, v_4, v_1, v_3, v_0).$$

- (2) n 为偶数。“距离为 2”的边只能组成两个长为 $n/2$ 的圈, 不能再单独取一条 Hamilton 圈。此时需把两类边混合使用。令

$$H_1 = (v_0, v_1, \dots, v_{n-3}, v_{n-1}, v_{n-2}, v_0),$$

$$H_2 = (v_0, v_2, v_4, \dots, v_{n-2}, v_{n-3}, v_{n-5}, \dots, v_1, v_{n-1}, v_0).$$

两条闭链的每一步都是“距离为 1”或“距离为 2”的边, 且各经过 n 个不同顶点, 故 H_1, H_2 都是 Hamilton 圈。例如 $n = 6$ 时,

$$H_1 = (v_0, v_1, v_2, v_3, v_5, v_4, v_0), \quad H_2 = (v_0, v_2, v_4, v_3, v_1, v_5, v_0).$$
