

CONCOURS CENTRALE SUPELEC 2023  
MATHÉMATIQUES 2 - PC

Pierre-Paul TACHER

This document is published under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license](#). 

1.

Le rayon de convergence est  $R = 1$  et

$$\forall x \in ]-1, 1[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1-x}$$

2.

On sait que la somme précédente est de classe  $C^\infty$  sur  $] - 1, 1[$ , et

$$\begin{aligned} \forall x \in ]-1, 1[, \quad f'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (x^n)' \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} nx^{n-1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} \end{aligned}$$

Donc le rayon de  $\sum_{n \geq 0} nx^n$  vérifie  $R \geq 1$  et

$$\begin{aligned} \forall x \in ]-1, 1[, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} nx^n &= x \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} \\ &= x f'(x) \\ &= \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

D'autre part,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad n |x|^n \geq |x|^n \geq 0 \Rightarrow R \leq 1$$

Donc  $R = 1$ .

3.

On réitère; on sait que la  $f$  est de classe  $C^k$  sur  $] - 1, 1[$ , et

$$\begin{aligned}
 \forall x \in ] - 1, 1[, \quad f^{(k)}(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (x^n)^{(k)} \\
 &= \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1) \dots (n-k+1) x^{n-k} \\
 &= \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} \\
 &= k! \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} \\
 &= k! \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n}{k} x^{n-k} \quad (n < k \Rightarrow \binom{n}{k} = 0)
 \end{aligned}$$

Par le même raisonnement que la question précédente, on déduit que le rayon de convergence de  $\sum_{n \geq 0} \binom{n}{k} x^n$  est 1 et

$$\begin{aligned}
 \forall x \in ] - 1, 1[, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n}{k} x^n &= \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(x) \\
 &= \frac{x^k}{k!} \frac{(k!)}{(1-x)^{k+1}} \\
 &= \frac{x^k}{(1-x)^{k+1}}
 \end{aligned}$$

4.

On a

$$0 \leq \frac{(n+1)^k}{n^k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$$

ce qui montre que le rayon de convergence est  $R = 1$ .

5.

On voit que  $\deg(H_j) = j$ .  $(H_0, H_1, \dots, H_k)$  est une famille de  $k+1 = \dim(\mathbb{R}_k[X])$  polynômes de degrés échelonnés, il s'agit donc d'une base de  $\mathbb{R}_k[X]$ . Par définition d'une base,

$$\exists! (\alpha_{k,0}, \dots, \alpha_{k,k}) \in \mathbb{R}^{k+1}, \quad X^k = \sum_{j=0}^k \alpha_{k,j} H_j \quad \textcircled{1}$$

6.

On remarque que

$$\forall j \in \llbracket 1, k \rrbracket, \quad H_j(0) = 0$$

donc

$$\begin{aligned}\forall k \in \mathbb{N}, \quad (X^k)(0) &= \begin{cases} 1 & \text{si } k=0 \\ 0 & \text{si } k>0 \end{cases} \\ &= \delta_{k,0} \\ &= \alpha_{k,0} H_0(0) \\ &= \alpha_{k,0}\end{aligned}$$

D'autre part, le coefficient de  $X^k$  dans  $H_k$  est  $\frac{1}{k!}$ , par identification on a donc:

$$\begin{aligned}\forall k \in \mathbb{N}, \quad \alpha_{k,k} \frac{1}{k!} &= 1 \\ \Leftrightarrow \quad \alpha_{k,k} &= k!\end{aligned}$$

**7.**

Soit  $j \in \mathbb{N}$ , fixé. On remarque que:

$$\forall i \geq j+1, \quad H_i(j) = 0$$

et

$$\begin{aligned}\forall i \in \llbracket 0, j \rrbracket, \quad H_i(j) &= \frac{1}{i!} j(j-1) \dots (j-i+1) \\ &= \frac{1}{i!} \frac{j!}{(j-i)!} \\ &= \binom{j}{i}\end{aligned}$$

On peut unifier les deux cas:

$$\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, \quad H_i(j) = \binom{j}{i}$$

On évalue l'égalité ① en  $j \in \llbracket 1, k \rrbracket$ :

$$\begin{aligned}j^k &= \sum_{i=0}^k \alpha_{k,i} H_i(j) \\ &= \sum_{i=0}^j \alpha_{k,i} H_i(j) \\ &= \sum_{i=0}^j \alpha_{k,i} \binom{j}{i} \\ &= \sum_{i=0}^{j-1} \alpha_{k,i} \binom{j}{i} + \alpha_{k,j}\end{aligned}$$

ce qui est bien l'égalité demandée.

8.

```

import numpy as np
from math import factorial

def binom(n,k):
    if k>n:
        return 0
    else:
        return factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k))

def alpha(k,j):
    res = np.zeros(j+1, dtype=int)
    if k == 0:
        res[0] = 1
    for i in range(1,j+1):
        sum = 0;
        for l in range(i):
            sum += binom(i,l)*res[l]
        res[i] = i**k-sum
    return res[j]

```

9.

On évalue la relation ① en  $n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned}
 n^k &= \sum_{j=0}^k \alpha_{k,j} H_j(n) \\
 &= \sum_{j=0}^k \alpha_{k,j} H_j(n) \\
 &= \sum_{j=0}^k \alpha_{k,j} \binom{n}{j}
 \end{aligned}$$

Donc,

$$\begin{aligned}
 \forall x \in ]-1, 1[, \quad f_k(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} n^k x^n \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left( \sum_{j=0}^k \alpha_{k,j} \binom{n}{j} \right) x^n \\
 &= \sum_{j=0}^k \alpha_{k,j} \left( \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n}{j} x^n \right) \\
 &= \sum_{j=0}^k \alpha_{k,j} \frac{x^j}{(1-x)^{j+1}} \\
 &= \sum_{j=0}^k \alpha_{k,j} \frac{x^j (1-x)^{k-j}}{(1-x)^{k+1}} \\
 f_k(x) &= \frac{\sum_{j=0}^k \alpha_{k,j} x^j (1-x)^{k-j}}{(1-x)^{k+1}}
 \end{aligned}$$

$$f_k(x) = \frac{P_k(x)}{(1-x)^{k+1}} \quad \textcircled{2}$$

ce qui montre l'existence du polynôme  $P_k$ .

Soit maintenant  $Q_k$  un polynôme tel que

$$\forall x \in ]-1, 1[, \quad f_k(x) = \frac{Q_k(x)}{(1-x)^{k+1}}$$

alors:

$$\begin{aligned} & \forall x \in ]-1, 1[, \quad Q_k(x) = f_k(x)(1-x)^{k+1} \\ \Leftrightarrow & \quad \forall x \in ]-1, 1[, \quad Q_k(x) = P_k(x) \\ \Leftrightarrow & \quad \forall x \in ]-1, 1[, \quad Q_k(x) - P_k(x) = 0 \end{aligned}$$

ce qui montre que le polynôme  $Q_k - P_k$  a une infinité de racines, donc  $Q_k = P_k$  et l'unicité est prouvée.

## 10.

Soit  $l \in \llbracket 0, k \rrbracket$ . Le coefficient de  $X^l$  dans le polynôme  $X^j(1-X)^{k-j}$  est:

$$\begin{aligned} a_{l,j,k} &= \begin{cases} 0 & \text{si } l < j \\ (-1)^{l-j} \binom{k-j}{l-j} & \text{si } l \geq j \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & \text{si } l < j \\ (-1)^{l-j} \binom{k-j}{k-l} & \text{si } l \geq j \end{cases} \end{aligned}$$

On en déduit que le coefficient de  $X^l$  dans  $P_k = \sum_{j=0}^k \alpha_{kj} X^j (1-X)^{k-j}$  est

$$\begin{aligned} \beta_{l,k} &= \sum_{j=0}^k \alpha_{kj} a_{l,j,k} \\ &= \sum_{j=0}^l \alpha_{kj} a_{l,j,k} \\ &= \sum_{j=0}^l \alpha_{kj} (-1)^{l-j} \binom{k-j}{k-l} \end{aligned}$$

Il n'est vraiment pas adéquat de réutiliser la fonction **alpha** telle quelle, puisque celle ci calcule tous les  $\alpha_{ki}$ .  $i \leq j$  pour calculer le coefficient  $\alpha_{kj}$ . Il est préférable de la modifier pour qu'elle renvoie la liste de tout les  $\alpha_{ki}$ .  $i \leq j$ . La fonction **beta** renvoie la liste des coefficients de  $P_k$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}[X]$ :

```
import numpy as np
from math import factorial

def binom(n,k):
    if k>n:
        return 0
    else:
        return factorial(n)/(factorial(k)*factorial(n-k))
```

```

def alpha(k,j):
    res = np.zeros(j+1, dtype=int)
    if k == 0:
        res[0] = 1
    for i in range(1,j+1):
        sum = 0;
        for l in range(i):
            sum += binom(i,l)*res[l]
        res[i] = i**k-sum
    return res

def beta(k):
    res = np.zeros(k+1, dtype=int)
    a = alpha(k,k)
    for i in range(k+1):
        sum = 0
        eps = (-1)**i
        for j in range(i+1):
            sum += eps*a[j]*binom(k-j,k-i)
            eps *= -1
        res[i] = sum
    return res

```

11.

On remarque d'abord que  $xf'_k = f_{k+1}$ , puis on dérive la relation ②:

$$\begin{aligned}
 & \forall x \in ]-1, 1[, \quad f_k(x) = \frac{P_k(x)}{(1-x)^{k+1}} \\
 \Rightarrow & \quad \forall x \in ]-1, 1[, \quad f'_k(x) = \frac{P'_k(x)(1-x)^{k+1} + (k+1)P_k(x)(1-x)^k}{((1-x)^{k+1})^2} \\
 \Leftrightarrow & \quad \forall x \in ]-1, 1[, \quad f'_k(x) = \frac{P'_k(x)(1-x) + (k+1)P_k(x)}{(1-x)^{k+2}} \\
 \Rightarrow & \quad \forall x \in ]-1, 1[, \quad xf'_k(x) = \frac{xP'_k(x)(1-x) + (k+1)xP_k(x)}{(1-x)^{k+2}} \\
 \Leftrightarrow & \quad \forall x \in ]-1, 1[, \quad f_{k+1}(x) = \frac{xP'_k(x)(1-x) + (k+1)xP_k(x)}{(1-x)^{k+2}} \\
 \Leftrightarrow & \quad \forall x \in ]-1, 1[, \quad \frac{P_{k+1}(x)}{(1-x)^{k+2}} = \frac{xP'_k(x)(1-x) + (k+1)xP_k(x)}{(1-x)^{k+2}} \\
 \Leftrightarrow & \quad \forall x \in ]-1, 1[, \quad P_{k+1}(x) = xP'_k(x)(1-x) + (k+1)xP_k(x) \\
 \Leftrightarrow & \quad P_{k+1} = X(1-X)P'_k + (k+1)XP_k
 \end{aligned}$$

la dernière équivalence provenant encore du fait que deux polynômes coïncidant sur un ensemble infini sont égaux.

**12.**

Comme  $f_0(x) = \frac{1}{1-x}$ , on a  $P_0 = 1$ . Puis,

$$\begin{aligned} P_1 &= 0 + XP_0 \\ &= X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 &= X(1 - X) + 2X^2 \\ &= X^2 + X \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3 &= X(1 - X)(2X + 1) + 3X(X^2 + X) \\ &= X^3 + 4X^2 + X \end{aligned}$$

On peut vérifier avec le programme python:

```
>>> beta(2)
array([0, 1, 1])
>>> beta(3)
array([0, 1, 4, 1])
```

**13.**

On montre par récurrence que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \deg(P_k) = k$$

et

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \text{dom}(P_k) = 1$$

Vrai pour  $P_0 = 1$ . Supposons la propriété vérifiée pour  $k \in \mathbb{N}$ .

$$P_{k+1} = X(1 - X)P'_k + (k + 1)XP_k$$

montre que  $\deg(P_{k+1}) \leq k + 1$ , et le coefficient de  $X^{k+1}$  vaut  $-k\text{dom}(P_k) + (k + 1)\text{dom}(P_k) = 1$ .

**14.**

On pose  $\forall x \in ]0, 1[, \quad Q_k(x) = x^{k+1}P_k(\frac{1}{x})$ . On a:

$$\forall x \in ]0, 1[, \quad Q'_k(x) = (k + 1)x^k P_k(\frac{1}{x}) - x^{k-1} P'_k(\frac{1}{x})$$

D'où

$$\begin{aligned} \forall x \in ]0, 1[, \quad x(1 - x)Q'_k(x) &= (k + 1)x^{k+1}(1 - x)P_k(\frac{1}{x}) - x^k(1 - x)P'_k(\frac{1}{x}) \\ &= x^{k+2} \left[ (k + 1)(\frac{1}{x} - 1)P_k(\frac{1}{x}) - \frac{1}{x}(\frac{1}{x} - 1)P'_k(\frac{1}{x}) \right] \end{aligned}$$

On a déjà  $Q_1 = X^2 P_1(\frac{1}{X}) = X = P_1$ . supposons que pour un certain  $k \geq 1$ ,  $Q_k = P_k$ . Alors,

$$\begin{aligned}
 \forall x \in ]0, 1[, \quad Q_{k+1}(x) &= x^{k+2} P_{k+1}\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= x^{k+2} \left[ \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{x}\right) P'_k\left(\frac{1}{x}\right) + (k+1) \frac{1}{x} P_k\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\
 &= x^{k+2} \left[ \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{x}\right) P'_k\left(\frac{1}{x}\right) + (k+1) \left(\frac{1}{x} - 1\right) P_k\left(\frac{1}{x}\right) + (k+1) P_k\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\
 &= x^{k+2} \left[ \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{x}\right) P'_k\left(\frac{1}{x}\right) + (k+1) \left(\frac{1}{x} - 1\right) P_k\left(\frac{1}{x}\right) \right] + (k+1) x^{k+2} P_k\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= x(1-x) Q'_k(x) + (k+1) x Q_k(x) \\
 &= x(1-x) P'_k(x) + (k+1) x P_k(x) \\
 &= P_{k+1}(x)
 \end{aligned}$$

On a montré:

$$\forall k \in \mathbb{N}^* \quad \forall x \in ]0, 1[, \quad x^{k+1} P_k\left(\frac{1}{x}\right) = P_k(x)$$

**15.**

On identifie le coefficient de  $X^j$  dans l'égalité polynomiale qui précède:

$$\beta_{j,k} = \beta_{k+1-j,k}$$

valable  $\forall j \in \llbracket 0, k \rrbracket$  si on prend naturellement  $\beta_{k+1,k} = 0$ .

**16.**

On a

$$0 \leq \frac{\binom{2(n+1)}{n+1}}{\binom{2n}{n}} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 4$$

ce qui montre que  $R = \frac{1}{4}$ .



On sait que la fonction  $\frac{1}{\sqrt{1-4x}}$  est développable en série entière sur  $] -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$  et que le coefficient de  $x^n$  est:

$$\begin{aligned}
 a_n &= 4^n (-1)^n \frac{1}{n!} \underbrace{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\dots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}_{n \text{ facteurs}} \\
 &= 4^n (-1)^n \frac{1}{n!} \left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\dots\left(-\frac{2n-1}{2}\right) \\
 &= 4^n (-1)^n \frac{1}{n!} (-1)^n \frac{(2n-1)(2n-3)\dots 2 \times 1}{2^n} \\
 &= 4^n \frac{1}{n!} \frac{(2n)!}{\underbrace{2n(2n-2)\dots 4 \times 2 \times 2^n}_{n \text{ facteurs}}} \\
 &= 4^n \frac{1}{n!} \frac{(2n)!}{2^n n! \times 2^n} \\
 &= \frac{(2n)!}{n!^2} \\
 &= \binom{2n}{n}
 \end{aligned}$$

On a donc bien

$$\forall x \in ]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[ , \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} x^n = \frac{1}{\sqrt{1-4x}}$$

17.

$$0 \leq \frac{\frac{1}{n+1} \binom{2(n+1)}{n+1}}{\frac{1}{n} \binom{2n}{n}} = \frac{(2n+2)(2n+1)n}{(n+1)^3} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 4$$

montre que la série entière  $\sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} \frac{x^{n+1}}{n+1}$  a pour rayon de convergence  $R = \frac{1}{4}$ . La somme  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $] -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$  et

$$\begin{aligned}
 \forall x \in ]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[ , \quad f'(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} x^n \\
 &= \frac{1}{\sqrt{1-4x}}
 \end{aligned}$$

La fonction

$$\begin{aligned}
 g : ]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[ &\rightarrow \mathbb{R} \\
 x &\mapsto \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}
 \end{aligned}$$

est de classe  $C^1$  et

$$\begin{aligned}
 \forall x \in ]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[ , \quad g'(x) &= \frac{1}{\sqrt{1-4x}} \\
 &= f'(x)
 \end{aligned}$$

En intégrant et puisque  $f(0) = g(0) = 0$ ,

$$\begin{aligned} \forall x \in ]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[ , \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} \frac{x^{n+1}}{n+1} &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2} \\ \Rightarrow \forall x \in ]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[ \setminus \{0\}, \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{2n}{n} \frac{x^n}{n+1} &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} \end{aligned}$$

**18.**

Soit  $x \in ]-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[ \setminus \{0\}$ , fixé. Les séries numériques  $\sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} \frac{x^n}{n+1}$  et  $\sum_{n \geq 0} \binom{2n}{n} x^n$  sont absolument convergentes. Leur produit de Cauchy a pour terme général

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} x^k \binom{2(n-k)}{n-k} x^{n-k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} \binom{2(n-k)}{n-k} x^n$$

Le produit de Cauchy converge absolument et la somme vaut:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} \binom{2(n-k)}{n-k} x^n &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} \frac{1}{\sqrt{1-4x}} \\ &= \frac{1}{2x} \left( \frac{1}{\sqrt{1-4x}} - 1 \right) \end{aligned}$$

**19.**

Comme le DSE de  $\frac{1}{\sqrt{1-4x}}$  a pour terme constant 1,  $\frac{1}{2x} \left( \frac{1}{\sqrt{1-4x}} - 1 \right)$  est DSE sur  $] -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}[$ . Le coefficient de  $x^n$  dans ce DSE est:

$$\frac{1}{2} \times \text{coeff. de } x^{n+1} \text{ dans le DSE de } \frac{1}{\sqrt{1-4x}} = \frac{1}{2} \binom{2(n+1)}{n+1}$$

L'unicité du développement en série entière donne:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k} \binom{2(n-k)}{n-k} = \frac{1}{2} \binom{2(n+1)}{n+1}$$