
Matériel:

- un objet (une lettre « F » éclairée par une lanterne), taille verticale du F : AB = cm
- une lentille convergente de distance focale f' = 20 cm,
- un écran,
- un banc d'optique (permettant d'aligner les éléments).

Théorie (dessin)

Vous allez représenter, à l'échelle 1/5º pour les distances horizontales (sur l'axe optique) et à l'échelle 1 pour les distances verticales (perpendiculaires à l'axe optique), un objet AB (de la hauteur du « F ») à une distance de 5/2×f' d'une lentille convergente.

Vous tracerez alors l'image A'B' de AB par la lentille à l'aide de la méthode des rayons particuliers.



Mesurez sur votre dessin:

Que vaut alors le grandissement
$$\gamma = \frac{A'B'}{AB}$$
 ? $\gamma = \frac{\dots}{\dots} = \dots$

$$\gamma = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

En utilisant le théorème de Thalès, exprimez le grandissement en fonction de la distance **OA** entre l'objet et le centre de la lentille et la distance OA' entre le centre de la lentille et l'image plutôt qu'en fonction des tailles de l'objet et de l'image AB et A'B'.

• Nouvelle formule :
$$\gamma = \frac{\dots}{}$$

• Application numérique :
$$\gamma = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$

Expérience

On veut vérifier que nos prédictions sont bonnes! Réalisez le montage optique en plaçant l'objet à 5/2×f' de la lentille convergente et placez l'écran à l'endroit de l'image.

Mesurez sur le montage :

Que vaut le grandissement γ (mesuré avec l'une ou l'autre des formules)?