

COVID-19

WEKELIJKS EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN

(11 JUNI 2021)

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het [interactieve dashboard Epistat](#) en in de [open data](#). De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

INHOUDSTAFEL

1. Kernpunten	2
2. Kerncijfers - Trends.....	3
2.1. Trends.....	4
2.2. Recentie situatie	5
2.3. Strategie en projecties voor het beheer van de epidemie	6
3. Beschrijving van de epidemie vanaf 15 februari 2021.....	9
3.1. Verspreiding en evolutie van de COVID-19-gevallen	9
3.2. Testen op COVID-19.....	10
3.3. Contactopvolging	16
3.4. Moleculaire surveillance van SARS-CoV-2	21
3.5. Vaccinatie	24
3.6. Ziekenhuisopnames voor COVID-19.....	29
3.7. Bezettingsgraad van de IZ-bedden.....	33
3.8. Evolutie van de COVID-19 mortaliteit	34
3.9. Surveillance van de mortaliteit (alle oorzaken)	37
3.10. Surveillance in woonzorgcentra.....	39
3.11. Situatie van COVID-19 bij kinderen en op school	43
3.12. Clusteronderzoek: rapport van 31/05/21 tot 06/06/21.....	47
3.13. Surveillance door huisartsen.....	53
3.14. Afwezigheid op het werk wegens ziekte	56
3.15. Mobiliteit in België en per provincie	58
3.16. Gegevens van de Passenger Locator Forms (PLF)	61
3.17. Tijdlijn: bevestigde COVID-19-gevallen en respons ten aanzien van de epidemie in België	65
4. Modellering	67
4.1. Reproductiegetal (R_t)	67
4.2. Voorspellingsmodel op korte termijn voor nieuwe ziekenhuisopnames	69
4.3. Voorspellingsmodel voor de bezettingsgraad op intensieve zorgen	70
5. Internationale en EU-epidemiologische situatie	71
5.1. Internationale situatie	71
5.2. Situatie in Europa (EU/EEA en UK), bron ECDC	72
6. Annex	74
6.1. Samenvatting van de kernindicatoren	74
6.2. Aantal personen gediagnosticeerd (PCR en antigeen) tussen 4 mei 2021 en 10 juni 2021, voorgesteld per dag en gemiddelde per week.....	75
6.3. Aantal uitgevoerde testen tussen 4 mei 2021 en 10 juni 2021, voorgesteld per dag en gemiddelde per week..	76
6.4. Aantal personen opgenomen in het ziekenhuis tussen 7 mei 2021 en 10 juni 2021, voorgesteld per dag en gemiddelde per week.....	77
6.5. Aantal sterfgevallen tussen 4 mei 2021 en 10 juni 2021, voorgesteld per dag en gemiddelde per week.....	78
7. Preventie en informatie	79

1. Kernpunten

- **Algemene situatie:** Inperkingsfase. De 14-daagse-incidentie van het aantal gevallen voor België bedraagt 186/100 000 inwoners. De 7-daagse-incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames bedraagt 4,4/100 000 inwoners. De gedefinieerde drempel voor de controlefase in de beheerstrategie werd bereikt voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, maar niet voor het aantal gevallen.
- **Aantal nieuwe gevallen:** Op nationaal niveau daalt het aantal nieuwe gevallen verder voor de periode van 01 tot 07 juni ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. Het Rt, dat berekend is op basis van het aantal gediagnosticeerde gevallen, is voor diezelfde periode 0,770.
- **Testen en positiviteitsratio:** Het aantal uitgevoerde testen is stabiel gebleven in de periode van 01 tot 07 juni ten opzichte van de voorgaande periode van 7 dagen. De positiviteitsratio voor België daalt en bedraagt momenteel 3,3%.
- **Ziekenhuisopnames:** Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt verder (-23%) in de loop van de periode van 04 tot 10 juni tegenover de voorgaande periode van 7 dagen. Het aantal bezette bedden op intensieve zorgen daalt eveneens verder deze week (-17%).
- **Mortaliteit:** De COVID-19 mortaliteit daalde verder de afgelopen week. Het aantal gerapporteerde sterfgevallen van de afgelopen weken vond voornamelijk plaats in het ziekenhuis. Het aantal COVID-19-sterfgevallen bij de WZC-bewoners blijft laag.
- **Vaccinatie :** Volgens de in Vaccinnet+ geregistreerde gegevens op 9 juni 2021 bedraagt voor de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder de vaccinatiegraad van minstens één dosis 58,2% en bedraagt de volledige vaccinatiegraad 29,9%.
- **Moleculaire surveillance:** In de periode van 24 mei tot 06 juni werden er 1060 stalen gesequenced in de basis-surveillance. De varianten B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma) en B.1617.2 (Delta) vertegenwoordigden respectievelijk 81.8%, 1,3%, 9% en 3,9% van de gesequencede stalen. De varianten B.1.351 (Beta) en B.1617.2 (Delta) lijken te stijgen.
- Zie [sectie 3.4](#).
- **Mobiliteit:** Afgelopen week zijn de mobiliteitsniveaus globaal in heel België gestegen. Voor de weekgemiddelden voor de verschillende type van verplaatsingen zien we de hoogste waarden sinds het begin van de epidemie voor bezoeken aan de werkplaats, retail en recreatie, en transportstations. - Zie [sectie 3.15](#).
- **Clusteronderzoek:** Het aantal clusters is opnieuw gedaald in week 22 (31 mei tot 6 juni), met 306 nieuwe uitbraken (in vergelijking met 427 de week daarvoor). Bij de actieve clusters is het aandeel van de clusters op school ietsjes hoger dan die op de werkplaats. Desalniettemin is er in beide situaties een vermindering in absolute aantallen. - Zie [sectie 3.12](#).

2. Kerncijfers - Trends

De trends worden weergegeven op basis van vier kernindicatoren: de bevestigde gevallen, de nieuwe door het labo bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen (IZ) en de sterfgevallen. De indicatoren zijn gebaseerd op de datum van diagnose, overlijden of opname. De berekening en de vergelijking maakt gebruik van gegevens op basis van periodes van 7 dagen. Gegevens voor de 7-daagse periodes worden uitgedrukt als daggemiddelden; de evolutie geeft in % de verandering aan die tussen twee opeenvolgende periodes van 7 dagen wordt waargenomen.

De tabellen met het aantal gevallen, uitgevoerde testen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per dag zijn te vinden in het [punt 6](#) van dit rapport.

Aantal gerapporteerde patiënten	In totaal	Daggemiddelde gedurende de voorlaatste periode van 7 dagen	Daggemiddelde gedurende de laatste periode van 7 dagen	Evolutie
Bevestigde COVID-19 gevallen	1 074 204	1 877	1 173*	-38%
Opnames in het ziekenhuis	74 822***	78,3	60,6**	-23%
Sterfgevallen****	25 068	13,6	10,9*	-20%
<i>In ziekenhuizen</i>	15 358	12,7	9,4	-26%
<i>In woonzorgcentra</i>	9 534	0,9	1,4	+67%

*Van 1 juni 2021 tot 7 juni 2021 (gegevens van de laatste 3 dagen nog niet geconsolideerd).

**Van 4 juni 2021 tot 10 juni 2021.

***Het aantal ziekenhuisopnames omwille van COVID-19 met een labo bevestiging op het moment van rapportering sinds 15 maart 2020. Meer gedetailleerde informatie rond het aantal ziekenhuisopnames vindt u in punt 5 in het document [veelgestelde vragen](#).


****Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Donderdag 3 juni 2021	Donderdag 10 juni 2021	Evolutie
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	1 063	820	-23%
Aantal ingenomen IZ bedden	365	302	-17%


De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.

2.1. TRENDS


Hieronder worden de indicatoren getoond met het 7-daags voortschrijdend gemiddelde (groene lijn). Dit 7-daags gemiddelde wordt gebruikt om een trend aan te tonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de curve een vloeiend verloop krijgt en dat het zogenaamde weekendeffect wordt uitgevlakt.




Bron: Labonetwerken nationaal testing platform



Bron : Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)



Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)




Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)


2.2. RECENTE SITUATIE

De figuren hieronder tonen de verspreiding en de verdeling volgens leeftijd en geslacht van het aantal COVID-19 gevallen voor de laatste 14 dagen (geconsolideerde gegevens).

Verspreiding van de bevestigde gevallen per 100 000 inwoners tussen 25/05/21 en 07/06/21



Aantal bevestigde gevallen tussen 25/05/21 en 07/06/21 per leeftijds categorie en geslacht per 100 000 inwoners



Bron: Labonetwerken nationaal testing platform.

De gebruikte doorlopende kleurenschaal voor deze kaart varieert automatisch in functie van de laagste en hoogste incidenties die gerapporteerd worden in elke Belgische gemeente.

Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 142 gevallen.

Verdeling van het aantal bevestigde gevallen en de verdubbelingstijd (of de halveringstijd) voor België, per provincie, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor de Duitstalige Gemeenschap, wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

	25/05/21-31/05/21	01/06/21-07/06/21	Verschil (absoluut aantal)	Verschil (percentage)	Verdubbelings-/halveringstijd (dagen)	14-dagse incidentie per 100 000
België	13 138	8 211	-4 927	-38%	10	186
Antwerpen	1 991	1 436	-555	-28%	15	183
Brabant wallon	655	406	-249	-38%	10	261
Hainaut	2 015	1 105	-910	-45%	8	232
Liège	1 551	879	-672	-43%	9	219
Limburg	828	549	-279	-34%	12	157
Luxembourg	322	139	-183	-57%	6	161
Namur	482	261	-221	-46%	8	150
Oost-Vlaanderen	1 352	794	-558	-41%	9	141
Vlaams-Brabant	974	583	-391	-40%	9	135
West-Vlaanderen	1 159	730	-429	-37%	10	157
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1 498	1 141	-357	-24%	18	217
Deutschsprachige Gemeinschaft	69	28	-41	-59%	5	124

Noot: De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

2.3. STRATEGIE EN PROJECTIES VOOR HET BEHEER VAN DE EPIDEMIE

De strategie voor het beheer van de epidemie baseert zich op criteria die bedoeld zijn om de politieke besluitvorming over de toe te passen of te versoepelen maatregelen op gang te brengen wanneer aan de criteria wordt voldaan en wanneer de wekelijkse beoordeling van de epidemiologische situatie de noodzaak ervan onderstreept. Bovendien houdt die wekelijkse beoordeling rekening met dezelfde criteria.

Er werden twee fasen vastgelegd: de inperkingsfase wanneer de gedefinieerde drempels worden overschreden; en de controlefase wanneer de indicatoren onder de gedefinieerde drempels liggen.

De criteria blijven voornamelijk gebaseerd op de volgende indicatoren: de 14-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal gevallen en de 7-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Ze worden op verschillende wijze gecombineerd, en is afhankelijk van het feit of we ons in de inperkingsfase of in de controlefase bevinden.

Om de inperkingsfase te kunnen verlaten, moeten de indicatoren aan volgende voorwaarden voldoen:

- **Nieuwe ziekenhuisopnames < 75** per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie < 4,5/100.000 inwoners) EN een **Rt ziekenhuisopnames <1**

EN

- **Nieuwe gevallen < 100/100.000** inwoners voor 14 dagen voor een opeenvolgende periode van 3 weken (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN **Rt gevallen <1**

Wanneer de indicatoren onderstaande drempels bereikt hebben, betekent dit dat we ons niet langer in de controlefase bevinden maar de grens naar de inperkingsfase hebben overschreden:

- **Nieuwe gevallen > 100/100.000** inwoners voor 14 dagen op nationaal niveau (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN een **positiviteitsratio > 3%**.

OF


- **Nieuwe ziekenhuisopnames > 75** per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie > 4,5/100.000 inwoners)

Onderstaande grafieken tonen de 14-daagse incidentie voor het aantal bevestigde gevallen en de 7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Deze incidenties worden weergegeven door de horizontale balken. Voor elke grafiek worden de incidentiedrempels aangegeven met overeenkomstige verticale lijnen.


Projecties van de incidentie voor de komende 14 dagen (aantal gevallen) of 7 dagen (aantal ziekenhuisopnames) worden berekend en aangegeven met de zwarte stippen in onderstaande grafieken. De betrouwbaarheidsintervallen voor deze projecties (voorspellingsintervallen) worden getoond in de rechtse figuren.

Projecties worden berekend op basis van een Bayesiaans model. Het model dat gebruikt wordt voor de projecties van het aantal gevallen en ziekenhuisopnames op provinciaal niveau verschilt van het model dat gebruikt wordt voor de projecties voor België. Dit kan de geobserveerde verschillen verklaren.


14-daagse incidentie (groene balken) en projectie (zwarte stippen) voor de komende 14 dagen voor het aantal bevestigde gevallen (07/06/21)



7-daagse incidentie (groene balken) en projectie (zwarte stippen) voor de komende 7 dagen voor het aantal ziekenhuisopnames (10/06/21)



Onderstaande grafiek toont de evolutie van de 14-daagse incidentie voor het aantal gevallen en de 7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames sinds 15 februari 2021. De drempelwaarden die de grens tussen de controle- en de inperkingsfase bepalen, zijn per indicator aangegeven met een stippellijn in de overeenkomstige kleur. Het is eveneens op te merken dat de schaal van de y-as die de incidenties voor het aantal gevallen (donkergroen) aanduidt, verschillend is van de schaal op de y-as die de incidenties voor het aantal ziekenhuisopnames (lichtgroen) aanduidt.




3. Beschrijving van de epidemie vanaf 15 februari 2021

Onderstaande gegevens worden voorgesteld vanaf de week van 15 februari 2021, de start van de derde golf. Meer informatie over de afbakening van de verschillende epidemiegolven vindt u in vraag 2.3 in het document "[veelgestelde vragen](#)".

3.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tussen 1 juni 2021 en 7 juni 2021 werden 8 211 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Van de 8 211 nieuwe gevallen waren er 4 092 (50%) gemeld in Vlaanderen, 2 790 (34%) in Wallonië, waarvan 28 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 1 141 (14%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 188 gevallen (2%).

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per gewest en per week (datum van diagnose*) vanaf 15/02/21



Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 10 juni 2021, 6 uur.


*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

3.2. TESTEN OP COVID-19

3.2.1. Uitgevoerde testen op COVID-19 door de klinische laboratoria en door de laboratoria van het federaal testplatform en positiviteitsratio per provincie en leeftijdscategorie

Gedurende de periode van 1 juni 2021 tot 7 juni 2021 werden er 303 705 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 43 386 testen. De positiviteitsratio voor België was 3,3% voor deze periode.

Aantal uitgevoerde diagnostische testen door de klinische laboratoria en het federaal testplatform, en positiviteitsratio, per week vanaf 15/02/21



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigen- als PCR-testen worden weergegeven: alsoop een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als twee aparte testen beschouwd.


Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal uitgevoerde testen per 100 000 inwoners, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio per leeftijdscategorie voor de periode van 1 juni 2021 tot 7 juni 2021 (i.e., de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).

Leeftijdsgroep	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
0-9	19 881	1 567	868	4,4%
10-19	31 651	2 434	1 883	5,9%
20-39	89 252	3 078	3 175	3,6%
40-64	101 731	2 664	3 246	3,2%
65+	60 248	2 733	875	1,5%

Noot: Voor 942 testen was de leeftijd niet gekend.


De eerste grafiek hieronder geeft de positiviteitsratio weer (7-daags voortschrijdend gemiddelde) per leeftijdscategorie vanaf 15 februari 2021. De tweede grafiek hieronder geeft het aantal uitgevoerde testen weer (7-daags voortschrijdend gemiddelde) per leeftijdscategorie voor dezelfde periode.

Positiviteitsratio per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21



Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Uitgevoerde testen per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21




Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Onderstaande tabel toont de verdeling van het **aantal uitgevoerde testen**, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio voor België, per provincie, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap, voor de periode van 1 juni 2021 tot 7 juni 2021 (de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).


	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
België	303 705	2 643	10 105	3,3%
Antwerpen	49 828	2 665	1 703	3,4%
Brabant wallon	13 435	3 309	480	3,6%
Hainaut	29 431	2 185	1 396	4,7%
Liège	24 700	2 226	1 075	4,4%
Limburg	20 939	2 387	703	3,4%
Luxembourg	6 422	2 240	154	2,4%
Namur	9 738	1 964	288	3,0%
Oost-Vlaanderen	36 509	2 394	993	2,7%
Vlaams-Brabant	29 212	2 527	744	2,5%
West-Vlaanderen	31 194	2 597	921	3,0%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	41 271	3 388	1 396	3,4%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 348	1 729	39	2,9%

*Er werd geopteerd om de positiviteitsratio (% positieve testen) te berekenen alshet totaal aantal positieve testen gedeeld door het totaal aantal uitgevoerde testen, ditter weerspiegeling van de feitelijk uitgevoerde testen in België. Meer gedetailleerde informatie over de positiviteitsratio vindt u in punt 4 in het document "[veelgestelde vragen](#)".

Aantal tests uitgevoerd per provincie, per 1000 inwoners gedurende de periode van 01/06/21 tot 07/06/21



Positiviteitsratio per provincie gedurende de periode van 01/06/21 tot 07/06/21



3.2.2. Indicaties voor een voorgeschreven COVID-19 test

De redenen voor een voorschrijf voor een COVID-19-test zijn enerzijds af te leiden uit elektronische formulieren die huisartsen, ziekenhuisartsen en artsen in collectiviteiten gebruiken voor het aanvragen van een test (raadpleging met voorschrijf). Anderzijds zijn er de specifieke codes voor het voorschrijven van tests (zogenaamde CTPC-codes) die het mogelijk maken om bepaalde asymptomatische personen zonder voorafgaande raadpleging te laten testen. Denk daarbij bv. aan risicocontacten van een bevestigd COVID-19-geval of reizigers die terugkeren uit een rode zone.


Sinds 1 september 2020 zijn de gegevens van de testvoorschriften van huisartsen en ziekenhuisartsen beschikbaar. De gegevens van de testvoorschriften van artsen in collectiviteiten en die van de testvoorschriften zonder raadpleging zijn beschikbaar sinds 10 december 2020.

Daarmee zijn wel nog niet alle mogelijke aanvragen voor COVID-19-tests beschikbaar. In ziekenhuizen wordt bv. niet systematisch een aanvullend formulier ingevuld voor alle tests.

In de afgelopen week, van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021, werden 310 577 tests uitgevoerd, waarvan 59,5% kon worden gekoppeld aan een corresponderend voorschrijf (zowel voor elektronische formulieren als voor CTPC-codes).

Onderstaande grafiek toont de verdeling van de testindicaties sinds 15 februari 2021.

Aantal testen per testindicatie voor de beschikbare voorschriften, voor de periode van 15/02/21 tot 07/06/21




Opgelet, de teststrategie kan gewijzigd worden (testindicatie en/of een elektronisch formulier vereist of niet). Deze veranderingen in de teststrategie worden weergegeven in de getoonde grafieken.


Onderstaande figuren tonen de positiviteitsratio per testindicatie en de positiviteitsratio voor symptomatische en asymptomatische patiënten.

De positiviteitsratio wordt hieronder enkel weergegeven als het aantal uitgevoerde tests voor een bepaalde testindicatie meer dan 0,5% van het totaal aantal tests bedraagt.

Evolutie van de positiviteitsratio per testindicatie voor de beschikbare voorschriften, in percentage, voor de periode van 15/02/21 tot 07/06/21



Positiviteitsratio volgens symptomatische of asymptomatische patiënten voor de beschikbare voorschriften, in percentage, voor de periode van 15/02/21 tot 07/06/21




3.2.3. Gemiddelde tijdsduur vanaf de start van de symptomen tot de oproep van het contactcenter

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de resultaten van het COVID-19 testproces in België. Het toont de evolutie van de gemiddelde tijdsduur tussen het verschijnen van de symptomen en het telefonisch contact van het contactcenter (CC) met de patiënt. Deze tijdsduur is onderverdeeld in vijf componenten: van het verschijnen van de symptomen tot het medisch consult (donkergroen), van het medisch consult tot de staalafname (groen), van de staalafname tot het testresultaat (lichtgroen), van het testresultaat tot het ticket¹ dat naar het CC wordt gestuurd (geel) en van het ticket tot de oproep van het CC naar de patiënt (oranje). De referentiedatum op de x-as is de datum van het testresultaat of de datum waarop het ticket naar het CC is gestuurd.

De tijd tussen het optreden van de symptomen en het medisch consult draagt het meest bij aan de totale tijdsduur respectievelijk gevolgd door de tijd vanaf de staalafname tot het testresultaat en de tijd vanaf het moment dat het ticket naar de CC wordt gestuurd tot het moment dat de CC de patiënt contacteert. Daarentegen is de tijd tussen het medisch consult en de staalafname en tussen de beschikbaarheid van het testresultaat en het aanmaken van een ticket in het CC veel korter.

Er zijn dagelijkse variaties, voornamelijk als gevolg van weekends en vakanties. Verder is het belangrijk te melden dat sommige van deze gemiddelde tijden berekend worden op basis van een klein aantal waarnemingen.

Evolutie van de gemiddelde tijd tussen het begin van de symptomen en de oproep van het CC naar de patiënt, vanaf 15/02/21, onderverdeeld in 5 componenten



¹ De term "ticket" verwijst naar het activeringsbericht dat naar het CC wordt gestuurd voor elk ontvangen positief resultaat.


3.3. CONTACTOPVOLGING

3.3.1. “Whereabouts” van de bevestigde COVID-19 gevallen

De contactopvolging heeft als doel om alle risicocontacten snel te identificeren en zo verspreiding van het virus tegen te gaan. Meer informatie omtrent de manier waarop de contactopvolging precies verloopt, vindt u [hier](#). Gevallen worden gevraagd naar hun contacten tijdens hun besmettelijkheidsperiode. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen personen die een nauw contact hebben gehad (hoog-risicocontact) en personen die een oppervlakkig contact hadden (laag-risicocontact).

Onderstaande grafiek toont het aantal gevallen dat per dag wordt gediagnosticeerd (in donkerblauw) en het aantal van deze gevallen dat aan het contact center wordt gemeld (in groen). Sinds 15 februari 2021, werden er 281 484 bevestigde COVID-19 gevallen gecontacteerd waarvan 81,8 % contacten rapporteerde. In de periode van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021 werd 91,9 % van de bevestigde COVID-19 gevallen succesvol gecontacteerd, 86 % van hen rapporteert contacten.

Opvolging van de COVID-19-indexgevallen, sinds 15/02/21




Aan de hand van de bijkomende informatie die verzameld word, krijgen we ook een beter inzicht in de mogelijke manieren van transmissie. Deze bijkomende vragen worden enkel gesteld aan de bevestigde COVID-19 gevallen die door het call center werden opgebeld. Het betreft dus niet de hoog-risicocontacten.

Onderstaande figuur geeft weer welke plaatsen de bevestigde COVID-19 gevallen aan het contact center hebben doorgegeven als de locatie waar ze denken dat ze besmet te zijn. Ongeveer 38,6 % van de gecontacteerde COVID-19 gevallen geeft aan niet te weten waar men de infectie heeft opgelopen. Alhoewel er kleine schommelingen zijn van week tot week, zijn de meest gerapporteerde plaatsen van vermoedelijke besmetting voor de periode van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021, thuis (32,6 %), bij familie en vrienden (9,2 %), tijdens tieneractiviteiten (8,5 %) en op het werk (5,6 %).


Er moet opgemerkt worden dat bepaalde plaatsen onder de huidige maatregelen volledig (rood) of deels (oranje) gesloten zijn. "Kinderactiviteit" omvat zowel de school als buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar. "Tieneractiviteit" omvat zowel de school als buitenschoolse activiteiten voor kinderen ouder dan 12 jaar.

Waarschijnlijke plaats van infectie voor de gevallen gecontacteerd van 31/05/21 tot 06/06/21



Onderstaande figuur geeft weer of de bevestigde COVID-19 gevallen een contact met een ander bevestigd COVID-19 geval konden aanduiden als waarschijnlijke bron van infectie. In 48 % van de gevallen kon men geen bron van infectie aanduiden. Indien er een waarschijnlijke bron van infectie gekend was voor de periode van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021, ging dit in de meeste gevallen om een contact met een besmet inwonend familielid (30,3 %), een ander besmet familielid (5,8 %), een klasgenoot (5,1 %), een besmette collega (3,5 %), of een vriend (3,5 %).


Waarschijnlijke bron van infectie voor de gevallen gecontacteerd van 31/05/21 tot 06/06/21



3.3.2. Kenmerken van de gemelde hoog-risicocontacten

De informatie die door het contact center wordt verzameld, maakt het ook mogelijk om de opvolging van hoog-risicocontacten die door een bevestigd COVID-19-geval gemeld worden, te beschrijven. Onderstaande grafiek toont per dag het aantal geïdentificeerde hoog-risicocontacten (in donkergroen) en het aantal hoog-risicocontacten waarmee het callcenter een telefonisch contact heeft gehad (in groen). De lichtgroene lijn geeft de hoog-risicocontacten weer die zich lieten testen. Het aantal hoog-risicocontacten die zich liet testen is afhankelijk van de teststrategie. Hoog-risicocontacten moeten zich tweemaal laten testen, éénmaal binnen de 72u na het laatste risicocontact en de tweede ten vroegste op dag 7 na het laatste hoog-risicocontact.

Contactopvolging van hoog-risicocontacten van bevestigde COVID-19 gevallen, sinds 15/02/21



*De rapportageperiode voor contactgerelateerde tests van een hoog-risicocontact loopt van één dag voor en tot 20 dagen na het contact met het contact center.

Van de hoog-risicocontacten die in de periode van 24 mei 2021 tot 30 mei 2021 werden gemeld (9 970 personen), werden er 8 977 door het contact center opgebeld (90 %).

Van deze gecontacteerde hoog-risicocontacten werden er 8 053 (89,7 %) een eerste keer getest. 1 424 van deze testen waren positief, wat neerkomt op een globale positiviteitsratio voor de eerste test van 17,7 %. Van de hoog-risicocontacten met een negatieve eerste test (6 628 personen), ondergingen 4 745 personen een tweede (71,6 %). Van deze waren er 614 testen positief. Dit geeft een globale positiviteitsratio voor de tweede test van 12,9 %.

Ook 1 883 van de gecontacteerde hoog-risicocontacten ondergingen slechts één screeningstest (21 %) en 924 werden helemaal niet getest (10,3 %).

Op basis van het aantal contacten die getest werden, bedraagt de globale positiviteitsratio van hoog-risicocontacten voor deze periode, tot 25,3 %. Deze globale positiviteitsratio omvat alle positieve contacten onder alle contacten die getest werden.

Op basis van alle uitgevoerde testen voor de periode van 24 mei 2021 tot 30 mei 2021, toont onderstaande tabel de positiviteitsratio's voor de eerste en de tweede test. Met de informatie gerapporteerd door het indexgeval wordt er een onderscheid gemaakt tussen de hoog-risicocontacten die wel of niet samenwoonen met het bevestigde COVID-19-geval.

	Positiviteitsratio 1^e test	Positiviteitsratio 2^e test
Hoog-risicocontacten	17,7%	12,9%
Hoog-risicocontact dat samenwoont met het bevestigde COVID-19-geval	21,1%	16,3%
Hoog-risicocontact dat NIET samenwoont met het bevestigde COVID-19-geval	9,2%	6,8%

3.4. MOLECULAIRE SURVEILLANCE VAN SARS-COV-2

Bron: [Rapport van het Nationaal Referentielaboratorium](#) (UZ Leuven & KULeuven) – update van 08/06/21

De genetische diversiteit van het virus kan in kaart gebracht worden via moleculaire surveillance, om de evolutie van deze diversiteit in de tijd te analyseren. Dit is mogelijk door het gebruik van een PCR-analyse die gericht is op specifieke gebieden van het genoom die van bijzonder belang zijn of door sequentieanalyse van het volledige virale genoom (Whole Genome Sequencing: WGS), een techniek die een maximale zekerheid geeft over het type variant.

In december 2020 hebben de laboratoria die al meerdere maanden sequentieanalyses uitvoerden zich gegroepeerd in het *sequentieanalyse platform* dat nu uit een vijftiental laboratoria bestaat.

Het *sequentieanalyse platform* voert een zogenaamde «baseline» surveillance uit, d.w.z. een grondige genetische analyse van een klein aantal PCR-positieve stalen die representatief zijn voor de hele populatie. Momenteel wordt ongeveer 10% van de positieve stalen geanalyseerd in het kader van de «baseline» surveillance. Het *sequentieanalyse platform* voert echter ook een «actieve» surveillance uit, waarbij diepgaande genetische analyses worden uitgevoerd voor stalen uit een bepaalde context (bepaalde reizigers die terugkeren uit een rode zone, een selectie van uitbraken, bepaalde gevallen van herinfectie/infectie na vaccinatie ...).

Dankzij deze moleculaire surveillance kunnen opkomende varianten van het SARS-CoV-2-virus in België worden geïdentificeerd en opgevolgd. Hierbij zaten onder andere de zogenaamde “variants of concern” (VOC). Variant B.1.1.7 (20/501Y.V1), is voor het eerst in Engeland geïdentificeerd, variant B.1.351 (20H/501Y.V2) in Zuid-Afrika, variant P.1 (20J/501Y.V3) in Brazilië en de variant B.1.617.2 die in India is geïdentificeerd.

Op 31 mei 2021 hernoemde de WHO deze zogenaamde “variants of concern” (VOC’s). De volgende benamingen worden nu gehanteerd: Alpha voor variant B.1.1.7, Beta voor B.1.351, Gamma voor P.1 en Delta voor B.1.617.2.


De verschillende varianten hebben essentiële mutaties in het S-gen (het gen dat codeert voor het “Spike”-eiwit dat in wisselwerking staat met de receptor van de gastheercel). De laboratoria van het federale testplatform ontwikkelen momenteel specifieke PCR-tests die gericht zijn op de regio’s waar deze mutaties voorkomen om een vroegtijdige identificatie van deze varianten mogelijk te maken. Deze analyses bieden een proxy voor een snellere en gemakkelijkere identificatie van het aandeel en de evolutie van de belangrijke varianten. Het type variant kan echter enkel met zekerheid geïdentificeerd worden door een sequentieanalyse van het volledige virale genoom (WGS).

Hieronder worden de resultaten van moleculaire surveillance aan de hand van de basis surveillance en de actieve surveillance weergegeven.

3.4.1. Surveillance aan de hand van sequentieanalyse van het volledige virale genoom (sequentieanalyse platform)

Onderstaande figuur toont de evolutie van de drie belangrijkste varianten (VOC) voor de stalen die gesequenced werden in het kader van de baseline surveillance. De categorie « Non-VOC » verwijst naar elke virusstam die niet tot één van de belangrijkste varianten behoort; B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma) of B.1.617.2 (Delta).

Evolutie van de varianten, geïdentificeerd in de baseline surveillance in België sinds week 1, 2021



*De gegevens van de laatste twee weken moeten nog geconsolideerd worden.

Onderstaande tabel toont het aantal van de drie belangrijkste varianten (VOC) die door het gebruik van sequentieanalyse van het volledige virale genoom (WGS) zijn geïdentificeerd op stalen verzameld in het kader van de “baseline surveillance” en de “actieve surveillance” in de laatste 10 weken (29/03/21-06/06/21). Het is belangrijk om te benadrukken dat de actieve surveillance betrekking heeft op testen die afgenomen werden voor specifieke situaties, zoals bij uitbraken of reizigers maar ook op teststalen die een abnormaal PCR-resultaat vertonen.

Voor de periode van 24 mei 2021 tot 6 juni 2021, blijkt uit de voorlopige resultaten dat variant B.1.1.7 (Alpha), variant B.1.351 (Beta), variant P.1 (Gamma) en variant B.1.617.2 (Delta) respectievelijk 81,8 %, 1,3 %, 9 % en 3,9 % vertegenwoordigen van de stalen die werden gesequenced in het kader van de baseline surveillance.

Bron: Federaal testplatform

Noot: De gegevens van de laatste twee weken moeten nog geconsolideerd worden. Retrospectief kunnen er ook extra gegevens worden toegevoegd aan de vorige weken.

Week van staal-afname	Aantal gesequencede stalen	BASELINE-SURVEILLANCE					
		B.1.1.7 (Alpha)	B.1.351 (Beta)	P.1 (Gamma)	B.1.617.2 (Delta)	n	% van aantal gesequenced
29/03-04/04 (w 13)	1 572	1 326	84,4%	51	3,2%	79	5,0%
05/04-11/04 (w 14)	1 539	1 276	82,9%	36	2,3%	135	8,8%
12/04-18/04 (w 15)	1 610	1 321	82,0%	25	1,6%	133	8,3%
19/04-25/04 (w 16)	1 515	1 259	83,1%	34	2,2%	115	7,6%
26/04-02/05 (w 17)	1 611	1 398	86,8%	20	1,2%	89	5,5%
03/05-09/05 (w 18)	1 487	1 275	85,7%	20	1,3%	115	7,7%
10/05-16/05 (w 19)	1 241	1 065	85,8%	15	1,2%	98	7,9%
17/05-23/05 (w 20)	1 303	1 089	83,6%	6	0,5%	146	11,2%
24/05-30/05 (w 21)	784	631	80,5%	8	1,0%	78	9,9%
31/05-06/06 (w 22)	276	236	85,5%	6	2,2%	17	6,2%
						13	4,7%

Week van staal-afname	Aantal gesequencede stalen	ACTIEVE SURVEILLANCE (reizigers, uitbraken, abnormale PCR resultaten, inclusief S-gene dropout)					
		B.1.1.7 (Alpha)	B.1.351 (Beta)	P.1 (Gamma)	B.1.617.2 (Delta)	n	% van aantal gesequenced
29/03-04/04 (w 13)	125	61	48,8%	7	5,6%	28	22,4%
05/04-11/04 (w 14)	205	77	37,6%	18	8,8%	93	45,4%
12/04-18/04 (w 15)	142	85	59,9%	8	5,6%	31	21,8%
19/04-25/04 (w 16)	221	107	48,4%	9	4,1%	38	17,2%
26/04-02/05 (w 17)	183	91	49,7%	5	2,7%	24	13,1%
03/05-09/05 (w 18)	284	161	56,7%	22	7,7%	47	16,5%
10/05-16/05 (w 19)	250	132	52,8%	16	6,4%	44	17,6%
17/05-23/05 (w 20)	249	141	56,6%	4	1,6%	19	7,6%
24/05-30/05 (w 21)	64	40	62,5%	0	0,0%	8	12,5%
31/05-06/06 (w 22)	8	4	50,0%	0	0,0%	2	25,0%
						2	25,0%

3.5. VACCINATIE

Opname en vaccinatiegraad

Op 28 december 2020 is in België de pilootfase van de COVID-19-vaccinatiecampagne begonnen (in één woonzorgcentrum in elk gewest). Op 5 januari 2021 is de vaccinatiecampagne officieel van start gegaan.

Momenteel wordt in België gevaccineerd met vier verschillende COVID-19-vaccins: het vaccin Comirnaty® (Pfizer/BioNtech), het COVID-19 Vaccine Moderna®, het vaccin Vaxzevria® (AstraZeneca) en het COVID-19 Vaccine Janssen® (Johnson & Johnson). Het vaccinatieschema voor de eerste drie vaccins bestaat uit twee dosissen, toegediend met een aanbevolen interval van 21 dagen (Comirnaty®)², 28 dagen (COVID-19 Vaccine Moderna®) of 12 weken³ (Vaxzevria®)⁴. Een persoon die twee dosissen van één van deze vaccins heeft ontvangen wordt als volledig gevaccineerd beschouwd. Van het COVID-19 Vaccine Janssen®⁵ dient er één dosis toegediend te worden bij een persoon, die dan als volledig gevaccineerd wordt beschouwd.

Alle in België toegediende COVID-19-vaccindossisen worden, zoals wettelijk bepaald, geregistreerd in de databank Vaccinnet+, het nationale COVID-19-vaccinatierregister. Enkel de vaccinaties die in deze databank zijn geregistreerd, werden opgenomen in de onderstaande cijfers en analyses. Er kan evenwel een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten. Van alle vaccinaties geregistreerd tot en met 9 juni 2021, werd 90,5 % geregistreerd binnen 3 dagen na de toediening van het vaccin.

Op 9 juni 2021 waren er in totaal 8 000 922 dosissen van een COVID-19-vaccin toegediend en geregistreerd in Vaccinnet+ in België. Dit is een stijging met 1 016 428 dosissen in vergelijking met het aantal dat op 2 juni 2021 was geregistreerd.

De geografische verdeling weergegeven in dit rapport is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon en dus niet op de postcode van de vaccinatieplaats. Deze verdeling is dus geen weergave van het aantal vaccinaties gerealiseerd door de gefedereerde entiteiten, aangezien bepaalde personen op de werkplaats worden gevaccineerd (woonzorgcentra, ziekenhuizen).

² Op 10 maart 2021, volgend op een beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, is het interval tussen de twee dosissen van het Comirnaty®-vaccin in de Belgische vaccinatiecampagne verlengd van 21 naar 35 dagen.


³ Het interval tussen de twee dosissen van het Vaxzevria®-vaccin werd verkort van 12 weken naar 8 weken op 3 mei 2021 in het Brussels gewest en op 12 mei 2021 in de Belgische vaccinatiecampagne.

⁴ De leeftijdsindicaties voor het Vaxzevria®-vaccin veranderden tijdens de Belgische vaccinatiecampagne als volgt: (i) 12 februari tot 2 maart 2021: 18 tot 55 jaar oud; (ii) 3 maart tot 6 april: ≥ 18 jaar; (iii) 7 april tot 23 april: ≥ 56 jaar oud; (iv) Vanaf 24 april: ≥ 41 jaar oud.

⁵ Vanaf 26 mei 2021 besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om een voorzorgsprincipe aan te nemen en het gebruik van het COVID-19-vaccin Janssen® tijdelijk te beperken tot voor mensen van 41 jaar en ouder.

Onderstaande figuur toont de sleutelmomenten in de Belgische vaccinatiecampagne en de evolutie in de tijd van het cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis en van het cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn in België.

Cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis van het COVID-19-vaccin en cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn, volgens toedieningsdatum (Bron: Vaccinnet+)



Gegevensbron: Vaccinnet+. Personen die volledig gevaccineerd zijn, zijn opgenomen in elk van de twee curven.

De periode die de start aangeeft van de verschillende fasen van de Belgische vaccinatiecampagne voor de verschillende doelgroepen. Aangezien de exacte startdatum kan verschillen per gefedereerde entiteit, geeft de periode de eerste en de laatste startdatum weer van de gefedereerde entiteiten.

De startdatum van het gebruik van de verschillende vaccinstoffen COVID-19 in België.

Onderstaande tabel toont het aantal gevaccineerde personen en de vaccinatiegraad voor de verschillende leeftijdsgroepen, op 9 juni 2021, volgens vaccinatiestatus, voor België.

Leeftijdsgroep ⁽¹⁾	Aantal personen gevaccineerd met minstens 1 dosis ⁽²⁾	Vaccinatiegraad minstens 1 dosis ⁽³⁾	Aantal personen volledig gevaccineerd ⁽²⁾	Vaccinatiegraad volledig gevaccineerd ⁽³⁾
0-17 jaar	6366	0,28%	3842	0,17%
18-34 jaar	466 867	19,38%	259 346	10,76%
35-44 jaar	550 752	36,88%	211 132	14,14%
45-54 jaar	1 007 412	65,46%	352 737	22,92%
55-64 jaar	1 316 165	85,56%	507 720	33,01%
65-74 jaar	1 077 109	90,20%	696 065	58,29%
75-84 jaar	643 795	91,56%	522 138	74,26%
≥ 85 jaar	294 890	88,84%	208 525	62,82%

(1) Personen waarvoor de leeftijd niet gekend was, werden niet opgenomen in deze tabel.

(2) Gegevensbron: Vaccinet+.

(3) De noemers voor deze berekeningen zijn de voorlopige cijfers van de Belgische bevolking op 01/01/2021 van STATBEL.

Onderstaande tabel toont het aantal personen gevaccineerd met en de vaccinatiegraad voor minstens één dosis, op 9 juni 2021, voor België, per gewest en voor de Duitstalige Gemeenschap en per leeftijdsgroep.

Leeftijdsgroep	België	Brussel ⁽¹⁾	Vlaanderen ⁽¹⁾	Wallonië ^(1,2)	Duitstalige Gemeenschap ⁽¹⁾
Totale bevolking	Aantal personen gevaccineerd met minstens 1 dosis ⁽³⁾	5 363 356	406 787	3 215 108	1 683 143
	Vaccinatiegraad minstens 1 dosis ⁽⁴⁾ (%)	46,55%	33,34%	48,33%	47,15% 51,83%
18 jaar en ouder	Aantal personen gevaccineerd met minstens 1 dosis ⁽³⁾	5 356 990	406 600	3 211 213	1 681 034
	Vaccinatiegraad minstens 1 dosis ⁽⁴⁾ (%)	58,17%	43,05%	59,88%	59,22% 64,21%
65 jaar en ouder	Aantal personen gevaccineerd met minstens 1 dosis ⁽³⁾	2 015 794	122 140	1 301 487	575 998
	Vaccinatiegraad minstens 1 dosis ⁽⁴⁾ (%)	90,43%	76,81%	94,55%	84,96% 84,89%
85 jaar en ouder	Aantal personen gevaccineerd met minstens 1 dosis ⁽³⁾	294 890	20 219	195 225	77 308
	Vaccinatiegraad minstens 1 dosis ⁽⁴⁾ (%)	88,84%	79,12%	92,99%	81,94% 81,01%

(1) De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon. Personen waarvoor de postcode niet gekend was, werden niet opgenomen in de geografische verdeling.

(2) Exclusief Duitstalige Gemeenschap.

(3) Gegevensbron: Vaccinet+.

(4) De noemers voor deze berekeningen zijn de voorlopige cijfers van de Belgische bevolking op 01/01/2021 van STATBEL.

Onderstaande tabel toont het aantal volledig gevaccineerde personen en de vaccinatiegraad voor volledige vaccinatie, op 9 juni 2021, voor België, per gewest en voor de Duitstalige Gemeenschap en per leeftijdsgroep.

Leeftijdsgroep		België	Brussel ⁽¹⁾	Vlaanderen ⁽¹⁾	Wallonië ^(1,2)	Duitstalige Gemeenschap ⁽¹⁾
Totale bevolking	Aantal personen volledig gevaccineerd ⁽³⁾	2 761 505	238 963	1 642 173	850 981	18 116
	Vaccinatiegraad volledig gevaccineerd ⁽⁴⁾ (%)	23,97%	19,59%	24,68%	23,84%	23,18%
18 jaar en ouder	Aantal personen volledig gevaccineerd ⁽³⁾	2 757 663	238 836	1 639 368	850 219	18 107
	Vaccinatiegraad volledig gevaccineerd ⁽⁴⁾ (%)	29,94%	25,29%	30,57%	29,95%	28,72%
65 jaar en ouder	Aantal personen volledig gevaccineerd ⁽³⁾	1 426 728	85 362	944 522	387 520	7658
	Vaccinatiegraad volledig gevaccineerd ⁽⁴⁾ (%)	64,00%	53,68%	68,61%	57,16%	49,21%
85 jaar en ouder	Aantal personen volledig gevaccineerd ⁽³⁾	208 525	15 018	132 388	59 444	1411
	Vaccinatiegraad volledig gevaccineerd ⁽⁴⁾ (%)	62,82%	58,77%	63,06%	63,00%	67,84%

(1) De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon. Personen waarvoor de postcode niet gekend was, werden niet opgenomen in de geografische verdeling.

(2) Exclusief Duitstalige Gemeenschap.


(3) Gegevensbron: Vaccinet+.

(4) De noemers voor deze berekeningen zijn de voorlopige cijfers van de Belgische bevolking op 01/01/2021 van STATBEL.


Alle volgende gegevens focussen op personen van 18 jaar en ouder omdat zij, op termijn, tot de doelgroep van de vaccinatiecampagne zullen behoren.

Op 9 juni 2021 was, bij vrouwen van 18 jaar en ouder, de vaccinatiegraad voor minstens één dosis 61,64 % (aantal personen: 2 899 073) en voor volledige vaccinatie 34,26 % (aantal personen: 1 611 202). Bij mannen van 18 jaar en ouder was de vaccinatiegraad voor minstens één dosis 54,89 % (aantal personen: 2 457 846) en voor volledig vaccinatie 25,60 % (aantal personen: 1 146 415).

Onderstaande figuur geeft de vaccinatiegraad weer voor personen die minstens één vaccindosis hebben ontvangen voor de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder, per gewest/gemeenschap en voor België, per toedieningsdatum.



Onderstaande figuur geeft de vaccinatiegraad weer voor volledig gevaccineerde personen voor de Belgische bevolking van 18 jaar en ouder, per gewest/gemeenschap en voor België, per toedieningsdatum.




3.6. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19


3.6.1. Situatie in ziekenhuizen

Tussen 4 juni 2021 en 10 juni 2021 werden 424 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 615 verlieten het ziekenhuis.

Evolutie van het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis, per week




Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten, per week



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.


Op 10 juni 2021 werden 820 ziekenhuisbedden ingenomen door door het labo bevestigde COVID-19-patiënten, waarvan 302 bedden op intensieve zorgen; 179 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 33 ECMO. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden afgerekend met 243, waarvan 63 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.

Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen, per week



*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (10 juni 2021)

Ernst van het aantal gehospitaliseerde gevallen, per week



*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie


3.6.2. Herkomst van patiënten opgenomen voor COVID-19

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames dat we rapporteren omvat enkel de patiënten met een bevestigde COVID-19-infectie die opgenomen zijn omwille van COVID-19. Opnames omwille van een andere pathologie maar met een positief test resultaat voor COVID-19 worden buiten beschouwing gelaten. De ziekenhuisopnames van patiënten met een bevestigde COVID 19-infectie worden verder opgesplitst volgens herkomst. Op deze manier hebben we een zicht op het aantal nieuwe patiënten afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.

Van de 424 gerapporteerde opnames voor de periode 4 juni 2021 tot 10 juni 2021 zijn er 409 nieuwe opnames gerapporteerd met een onderscheid naar herkomst van de patiënt. Voor deze periode waren 13 (van de 409) opnames afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.

Onderstaande figuur toont de evolutie van het totaal aantal nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames, het aantal opnames van bewoners van een WZC, alsook het percentage van deze laatste onder alle gehospitaliseerde patiënten. De evolutie van dit percentage, samen met de dalende trend van de absolute aantallen, zou een aanwijzing kunnen zijn van de positieve impact van de vaccinatie. Niettemin, een daling van het percentage patiënten afkomstig van een WZC onder alle gehospitaliseerde patiënten zou ook door andere factoren (bv. een toename van het aantal ziekenhuisopnames in de algemene bevolking) verklaard kunnen worden, zoals eerder werd vastgesteld.

Evolutie van de ziekenhuisopnames en van het percentage opgenomen WZC-bewoners, België



3.6.3. Kenmerken van de gehospitaliseerde patiënten


Het opvolgen van de karakteristieken van de patiënten opgenomen in het ziekenhuis is mogelijk door de klinische surveillance van de gehospitaliseerde COVID-19 patiënten. Deze surveillance geeft meer inzicht in de achtergrond van patiënten op nationaal niveau. De klinische surveillance omvat ongeveer 60% à 70% van alle gehospitaliseerde patiënten. Daarom worden de resultaten in percentages vermeld en niet in absolute cijfers, dit zou het totaal aantal patiënten namelijk onderschatten.

Het is echter belangrijk om op te merken dat in de periode tussen juni 2020 (week 24) en september 2020 (week 39) het totaal aantal ziekenhuisopnames per week in België erg laag was; namelijk 70 tot 140 ziekenhuisopnames per week. Bijgevolg zijn de aantallen waarop onderstaande percentages gebaseerd zijn dan ook heel laag. Hierdoor brengen zelfs relatieve kleine verschillen van week tot week grote schommelingen met zich mee.

Geslacht: Sinds het begin van de epidemie zijn 47,0% van de gehospitaliseerde patiënten vrouwen en 53,0% mannen.

Leeftijd: Onderstaande grafiek figuren geeft de evolutie weer van de leeftijdsverdeling van COVID-19 patiënten van die opgenomen werden in het ziekenhuis (per week).


Evolutie van de leeftijdsverdeling van gehospitaliseerde patiënten, per week, tot week 20 (17/05/21-23/05/21)



Noot: Retrospectieve rapportage kan de data voor de laatste 4 weken nog veranderen


Voorafbestaande gezondheidsproblemen: Onderstaande figuur geeft de verdeling weer van COVID-19-patiënten die werden opgenomen in het ziekenhuis (per week) en die geen, één of meerdere voorafbestaande gezondheidsproblemen hebben.

Evolutie van het aantal gehospitaliseerde COVID-19 patiënten met of zonder voorafbestaande gezondheidsproblemen, per week, tot week 20 (17/05/21-23/05/21)



Van alle patiënten die sinds het begin van de epidemie gehospitaliseerd werden omwille van COVID-19 had 32,4% een hart- en vaatziekte, 22,9% diabetes, 14,9% een chronische longziekte, 12,3% obesitas, 13,4% chronische nierziekte en 9,7% een solide kanker. Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat één persoon verschillende voorafbestaande gezondheidsproblemen kan hebben.

Evolutie van de voorafbestaande gezondheidsproblemen van gehospitaliseerde COVID-19 patiënten, per maand



3.7. BEZETTINGSGRAAD VAN DE IZ-BEDDEN

Het ziekenhuisnoodplan wordt gecoördineerd door het *Comité Hospital & Transport Surge Capacity* met vertegenwoordigers van alle overheden, Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experten. Het plan bestaat uit verschillende fasen.

Onafhankelijk van de bezettingsgraad moeten ziekenhuizen permanent 15% van hun totaal aantal erkende bedden op intensieve zorgen reserveren voor bevestigde COVID-19 patiënten.

Afhankelijk van de bedbezettingsgraad op IZ kan er beslist worden om, in fase 1, meer erkende IZ-bedden vrij te houden voor COVID-19-patiënten. Wanneer blijkt dat dit niet volstaat, in fase 2, kan er beslist worden om extra IZ-bedden te creëren.

Onderstaande tabel geeft het aantal COVID-19 patiënten op IZ weer voor België, per provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 10 juni 2021. De bezettingsgraad van de IZ-bedden wordt berekend op basis van het aantal erkende IZ-bedden.

	Aantal erkende IZ-bedden*	Aantal bevestigde COVID-19 patiënten in IZ	Percentage bezette erkende IZ-bedden door bevestigde COVID-19 patiënten
België	1992	302	15%
Antwerpen	301	43	14%
Brabant wallon	23	3	13%
Hainaut	259	66	25%
Liège	230	27	12%
Limburg	145	11	8%
Luxembourg	43	1	2%
Namur	97	23	24%
Oost-Vlaanderen	265	34	13%
Vlaams-Brabant	139	14	10%
West-Vlaanderen	221	22	10%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	269	58	22%


*Totaal aantal erkende IZ-bedden in November 2020. Dit omvat zowel de IZ-bedden voor COVID-19-patiënten als de IZ-bedden voor andere patiënten.

3.8. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT

3.8.1. Mortaliteit per regio


Voor de periode van 1 juni 2021 tot 7 juni 2021 werden 76 sterfgevallen gerapporteerd; 31 in Vlaanderen, 31 in Wallonië, en 14 in Brussel. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens week van overlijden, en ingedeeld per gewest volgens plaats van overlijden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen per gewest en per week




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht (01/06/21-07/06/21)




Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en per week




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en per week



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen van personen ouder dan 65 jaar afkomstig of niet van een woonzorgcentra



Totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen van **1 juni 2021 tot 7 juni 2021**

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	26	84%	14	100%	26	84%	66	87%
Bevestigde gevallen	24	92%	14	100%	26	100%	64	97%
Mogelijke gevallen	2	8%	0	0%	0	0%	2	3%
Woonzorgcentrum	5	16%	0	0%	5	16%	10	13%
Bevestigde gevallen	4	80%	0	N/A	4	80%	8	80%
Mogelijke gevallen	1	20%	0	N/A	1	20%	2	20%
Andere residentiële collectiviteiten	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Thuis en andere	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAAL	31	100%	14	100%	31	100%	76	100%

*Onder de sterfgevallen die in ziekenhuizen bevinden zich ook bewoners van Woonzorgcentra (WZC). Verdere analyses over deze sterfgevallen worden voorgesteld in het onderstaande hoofdstuk over woonzorgcentra.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen van **15 februari 2021 tot 7 juni 2021**

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonië		België	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	1 336	91%	496	99%	1 158	95%	2 990	94%
Bevestigde gevallen	1 317	99%	493	99%	1 146	99%	2 956	99%
Mogelijke gevallen	19	1%	3	1%	12	1%	34	1%
Woonzorgcentrum	132	9%	4	1%	56	5%	192	6%
Bevestigde gevallen	118	89%	4	100%	55	98%	177	92%
Mogelijke gevallen	14	11%	0	0%	1	2%	15	8%
Andere residentiële collectiviteiten	2	0%	0	0%	0	0%	2	0%
Thuis en andere	0	0%	2	0%	1	0%	3	0%
Onbekend	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAAL	1 470	100%	502	100%	1 215	100%	3 187	100%

*Onder de sterfgevallen die in ziekenhuizen bevinden zich ook bewoners van Woonzorgcentra (WZC). Verdere analyses over deze sterfgevallen worden voorgesteld in het onderstaande hoofdstuk over woonzorgcentra.

Voor meer informatie over de plaats van overlijden kunt u punt 6 in het document [veelgestelde vragen](#) raadplegen.

3.8.2. Mortaliteit per provincie

Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal sterfgevallen en het sterftecijfer per 100 000 inwoners, per provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de periode van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021.

Provincies*	Aantal sterfgevallen	Sterftecijfer per 100 000 inwoners
Antwerpen	17	0.91
Brabant wallon	13	3.20
Hainaut	15	1.11
Liège	9	0.81
Limburg	8	0.91
Luxembourg	1	0.35
Namur	6	1.21
Oost-Vlaanderen	1	0.07
Vlaams-Brabant	7	0.61
West-Vlaanderen	2	0.17
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	7	0.57

*Wanneer de provincie van de woonplaats niet gekend is, wordt de plaats van overlijden gebruikt


3.9. SURVEILLANCE VAN DE MORTALITEIT (ALLE OORZAKEN)

3.9.1. Be-MOMO (Belgium Mortality Monitoring)

In België gebeurt de opvolging van algemene sterfte (alle oorzaken), Be-MOMO, op basis van gegevens uit het Rijksregister. Het kan 2 weken duren vooraleer de gegevens voor meer dan 95% van de sterfgevallen volledig zijn. De cijfers van de laatste weken zijn dus voorlopig. Voor meer informatie over Be-MOMO: <https://epistat.wiv-isp.be/momo/>.

Er is geen statistisch significante oversterfte waargenomen in België in week 20. In week 18 was er een oversterfte in Brussel in de leeftijdsgroep 15-64 jaar (33 extra sterfgevallen onder de 66 waargenomen sterfgevallen, 100% oversterfte), voornamelijk bij mannen. Meer informatie over oversterfte in 2020 in het [persbericht van Sciensano van 15 januari 2021](#).

Aantal sterfgevallen door alle oorzaken met uitsplitsing van COVID-19 sterfgevallen, tot 30/05/21 (op basis van gegevens verzameld tot 05/06/21), België




Hoe lees je deze grafiek? Wanneer het aantal sterfgevallen per dag de door de modellering voorspelde boven- of ondergrens van sterfgevallen (grijze stippellijnen) overschrijdt, is er sprake van een significante over- of ondersterfte. Het oranje gedeelte geeft weer wat het aandeel is van de COVID 19-sterfgevallen (bevestigde en mogelijke gevallen, alle plaatsen van overlijden) in de totale mortaliteit.


Aantal sterfgevallen (alle oorzaken) per week (België)

Week	Datum maandag	Aantal geobserveerde sterfgevallen	Aantal verwachte sterfgevallen (Be-MOMO)	Aantal extra sterfgevallen	Aantal dagen met significatieve oversterfte	Oversterfte (%)	Ruw sterftecijfer (100 000 inwoners)
2021-W17	26/04/2021	2 192	2 134	58	0	2,7	19,1
2021-W18	03/05/2021	2 241	2 093	148	0	7,1	19,5
2021-W19	10/05/2021	2 053	2 055	-2	0	-0,1	17,9
2021-W20	17/05/2021	2 000	2 018	-18	0	-0,9	17,4


Aantal sterfgevallen door alle oorzaken met uitsplitsing van COVID-19 sterfgevallen, tot 30/05/21 (op basis van gegevens verzameld tot 05/06/21), Vlaanderen



Aantal sterfgevallen door alle oorzaken met uitsplitsing van COVID-19 sterfgevallen, tot 30/05/21 (op basis van gegevens verzameld tot 05/06/21), Brussel



Aantal sterfgevallen door alle oorzaken met uitsplitsing van COVID-19 sterfgevallen, tot 30/05/21 (op basis van gegevens verzameld tot 05/06/21), Wallonië



Oversterfte tijdens de COVID-19 epidemie


Verdere informatie: <https://www.info-coronavirus.be/nl/>

Een overzicht van de oversterfte in het voorjaar 2020 vindt u in het [wekelijkse epidemiologische rapport van 19/06/2020](#).

3.9.2. EuroMOMO: monitoring van de sterfte (alle oorzaken) in Europa

EuroMOMO publiceert wekelijks een bulletin over de sterfte door alle oorzaken in maximaal 26 Europese landen of regio's. Het sterftecijfer van de laatste weken dient echter met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, want er is een vertraging van ongeveer drie weken voor het verkrijgen van significante gegevens over de oversterfte. Voor meer informatie: <http://www.euromomo.eu/index.html>.

Mortaliteit (alle oorzaken) in 26 landen of regio's in Europa, week 20 (van 17/05/21 tot 23/05/21)




3.10. SURVEILLANCE IN WOONZORGCENTRA

Om de situatie in de woonzorgcentra (WZC) op te volgen, worden drie indicatoren weergegeven: het percentage WZC met een prevalentie van minstens 2 bevestigde COVID-19 gevallen, de incidentie (het aantal nieuwe bevestigde COVID-19 gevallen) per week en

het aantal bewoners van WZC die overleden aan een mogelijke of bevestigde COVID-19 infectie. Deze indicatoren worden gebaseerd op de gegevens die de WZC zelf rapporteren op dinsdag in de COVID-19 surveillance voor residentiële instellingen. Meer informatie over deze surveillance en uitleg over de onderstaande grafieken kan teruggevonden worden in het [wekelijks rapport over de surveillance in WZC](#).


Onderstaande grafiek geeft het percentage WZC weer dat minstens 2 bevestigde COVID-19 gevallen rapporteerde, vanaf 15 februari 2021. De grafieken met het percentage WZC dat minstens 1 of minstens 10 bevestigde COVID-19 gevallen rapporteerde is terug te vinden in het uitgebreide rapport.

Percentage van woonzorgcentra (WZC) met minstens 2 bevestigde COVID-19 gevallen op dinsdag, vanaf 15/02/21



Onderstaande grafiek geeft de incidentie (het aantal nieuwe gevallen) per week (van woensdag tot en met dinsdag) van bevestigde COVID-19 gevallen in WZC per 1 000 bewoners, per gewest/gemeenschap. Dit betekent dat de som van het aantal nieuwe bevestigde gevallen eenmaal per week op de grafiek weergegeven wordt.


Incidentie per week van bevestigde COVID-19 gevallen in Belgische woonzorgcentra (WZC) per 1 000 bewoners, per gewest/gemeenschap, vanaf 15/02/21



COVID-19 sterfgevallen worden over het algemeen gepresenteerd volgens de plaats van overlijden. Alle bewoners van een WZC die in het ziekenhuis overlijden worden bijgevolg meegeteld in de sterftecijfers van de ziekenhuizen. Het aandeel bewoners van WZC die ofwel in het ziekenhuis ofwel in het WZC sterven, wordt hieronder weergegeven.

Tussen 1 juni 2021 en 7 juni 2021 zijn 18 bewoners van een WZC overleden aan COVID-19 waarvan 10 in een WZC (5 in Vlaanderen, 0 in Brussel, 5 in Wallonië), 8 in het ziekenhuis (1 in Vlaanderen, 1 in Brussel, 6 in Wallonië) en 0 op andere locaties.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra (alle plaatsen van overlijden) per gewest en per week, vanaf 15/02/21



Aantal COVID-19 sterfgevallen (bevestigde en mogelijke) bij bewoners van woonzorgcentra (alle plaatsen van overlijden) per gewest voor de periode 15/02/21 tot 06/06/21

Plaats van overlijden	Vlaanderen		Brussel		Wallonia		België	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	97	42	28	88	65	53	190	50
Woonzorgcentrum	132	58	4	12	56	46	192	50
Thuis en andere	0	0	0	0	1	1	1	0
TOTAAL	229	100	32	100	122	100	383	100

Meer informatie over de surveillance in WZC vind je terug in het [wekelijks rapport](#).

3.11. SITUATIE VAN COVID-19 BIJ KINDEREN EN OP SCHOOL

Sinds het begin van de epidemie wordt de epidemiologische toestand bij kinderen tussen 3 en 17 jaar van nabij opgevolgd. Sinds de start van het schooljaar in september 2020 is een belangrijk deel van deze leeftijdsgroep opnieuw naar school gegaan en heeft daarbij regelmatige sociale contacten gehad. Ten aanzien van deze situatie zijn er voor kinderen specifiek meerdere maatregelen genomen en aanbevelingen uitgebracht. Deze bestaan onder meer uit:

- Het openblijven van de kinderopvang en kleuterklassen. Tot aan februari was de teststrategie en definitie van hoog-risicocontacten voor kinderen jonger dan 6 jaar meer doelgericht dan voor andere leeftijdsgroepen. Hierdoor werden deze kinderen uitsluitend in bepaalde omstandigheden getest. Door de nieuwe risico's bij het verschijnen van nieuwe virusvarianten is het echter voortaan aanbevolen om asymptomatische kinderen onder de 6 jaar ook te testen wanneer ze een hoogriskocontact hadden met iemand buiten hun familiale kring.
- Voor de leerlingen uit de lagere school blijft het onderwijs plaatsvinden met 100% contactonderwijs. In januari vond een wijziging van de definitie van hoogriskocontacten plaats. Dit had als gevolg dat klasgenootjes die naast elkaar zitten nu als hoogriskocontact kunnen worden beschouwd, wat daarvoor niet het geval was
- Voor leerlingen van de 1ste graad secundair is het onderwijs steeds met 100% fysieke aanwezigheid in de klas gegeven. Voor de kinderen van de 2de en 3de en graad was sinds midden-november tot 10 mei het onderwijs beperkt tot 50% fysieke aanwezigheid. De definitie van de contacten en de teststrategie zijn voor het hele middelbaar identiek aan de aanbevelingen voor volwassenen.

De uitvoering van de in de procedures omschreven teststrategie wordt actief opgevolgd door de teams van het CLB in de Vlaamse gemeenschap en die van het PSE en PMSWBE in de Franse gemeenschap. Diezelfde diensten nemen eveneens volledig deel aan het contactopvolgingssysteem binnen de school. Indien nodig zullen de regionale regionale diensten voor het beheer van infectieziekten, in samenwerking met de betrokken school, beslissen over het sluiten van een school of over het uitvoeren van een uitgebreide screening.


Het is in deze context van zeer strenge opvolging van de gevallen en hun contacten in de scholen dat deze resultaten geïnterpreteerd moeten worden. Dit kan men vooral goed merken aan het aantal uitgevoerde testen in de scholen en het grotere aandeel van asymptomatische gevallen bij kinderen in vergelijking met de rest van de bevolking.

De getoonde grafieken in deze sectie werden gemaakt op basis van twee, elkaar aanvullende, gegevensbronnen. Enerzijds is er de surveillance vanuit de klinische laboratoria, die alle geanalyseerde testen per leeftijd rapporteren. Anderzijds is er de surveillance op de scholen, waarbij men de informatie samenbundelt die door de teams van het CLB/PSE/PMS-WBE verzameld zijn. Deze aan de regionale autoriteiten doorgestuurde gegevens, met details over de testindicatie van positieve gevallen en mogelijke verbanden tussen gevallen, zijn een aanvulling op die van de laboratoria.

De evolutie van het aantal bevestigde gevallen wordt berekend op basis van gerapporteerde testresultaten door de laboratoria. Met het aantal uitgevoerde (positieve én negatieve) testen is het mogelijk om de evolutie van de incidentie te interpreteren per leeftijdsgroep en in de context van de veranderende teststrategie. De leeftijdsgroepen die worden geselecteerd voor de incidentie-berekening en het aantal tests, worden bepaald door de schoolniveaus (hoewel de leeftijdsgroepen niet helemaal perfect gelijklopen met de schoolniveaus).


14-daagse cumulatieve incidentie, per leeftijdscategorie, per 100 000 inwoners per leeftijdscategorie, vanaf 15/02/21 (week 7) tot aan 06/06/21 (week 22), België.

(Bron: de gecentraliseerde COVID-19 surveillance van Sciensano, gebaseerd op de laboratoria).



Het aantal uitgevoerde testen (voortschrijdend 7-daags-gemiddelde) per leeftijdscategorie en voor 100 000 inwoners per leeftijdscategorie, vanaf 15/02/21 (week 7) tot aan 06/06/21 (week 22), België.


(Bron: de gecentraliseerde COVID-19 surveillance van Sciensano, gebaseerd op de laboratoria).



Sinds september 2020 geven de gezondheidsdiensten van de scholen (CLB, PSE en PMSWBE) de testindicaties voor alle bevestigde gevallen door die hen gerapporteerd werden. Onderstaande grafiek toont de evolutie in de verhouding van het aantal testen voor elke reden. De categorie « Andere » omvat hoofdzakelijk de screeningstesten voor een ziekenhuisopname en testen bij de terugkeer van een reis. Tijdens de paasvakantie werd in Vlaanderen deze categorie van « Andere » testreden eveneens gebruikt voor het aantal gevallen waar de overdracht van het virus noch op school noch thuis plaatsvond.

Percentage gerapporteerde testindicaties volgens COVID-19-gevallen bij leerlingen, per week, vanaf 15/02/21 (week 7) tot aan 06/06/21 (week 22), België.

(Bron : Scholentoezicht door de Vlaamse en Franse gemeenschap, VGOV/CLB/VAZG en ONE/PSE/PMSWBE).




De grijze zones geven de periodes van de algemene sluiting van scholen en de schoolvakanties weer.

Tenslotte, op basis van de gegevens van het scholentoezicht, is het mogelijk om de scholen te detecteren waar op zijn minst één cluster (waarbij minstens 2 bevestigde gevallen die een epidemiologische link op school hadden tijdens dezelfde week of in een intervalweek) is geïdentificeerd. Een secundair geval wordt geïdentificeerd op basis van zijn/haar testindicatie (“een hoogrisico-contact op school”) waarbij hij/zij wordt geïdentificeerd als dusdanig door de gezondheidsdiensten op school. Het gaat hierbij dus om een specifieke waarneming in de leeromgeving.

Aandeel van de scholen⁶ waarin minstens een cluster van minstens 2 gevallen en minstens 5 gevallen werden gerapporteerd, vanaf 15/02/21 (week 7) tot aan 06/06/21 (week 22), België.

(Bron : Scholentoezicht door de Vlaamse en Franse gemeenschap, VGOV/CLB/VAZG en ONE/PSE/PMS-WBE).



⁶ De scholen in deze situatie worden gedefinieerd als het geheel van scholen die ofte w el een uniek “schoolnummer” in de Vlaamse Gemeenschap (3671 scholen), ofte w el een unieke “FASE Etablissement code” in de Franse Gemeenschap (2440 scholen) hebben, en die ten minste één geval hebben gemeld sinds de start van het schoolsurveillance in september 2020.

3.12. CLUSTERONDERZOEK: RAPPORT VAN 31/05/21 TOT 06/06/21

3.12.1. Clusters in de gemeenschap en binnen structurele collectiviteiten gerapporteerd door de regio's

Dit overzicht toont clusters die gerapporteerd zijn door de regio's voor de periode van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021 en omvat clusters die geregistreerd werden op de werkplaats, in collectiviteiten (scholen, woonzorgcentra, instellingen voor personen met een handicap, medische collectiviteiten en opvangcentra en opvanghuizen), in gezinnen en in de gemeenschap.

Een cluster wordt gedefinieerd door de bevestiging van **minimaal 2 COVID-19 gevallen** met een epidemiologische link binnen een bepaalde periode (7 of 14 dagen, afhankelijk van de situatie). Deze link kan bijvoorbeeld zijn dat er direct fysiek contact was of contact op korte afstand (<1,5m) voor meer dan 15 min.


Een **nieuwe cluster** is een cluster die in de week van rapportage werd bevestigd. Een cluster blijft actief, tot 14 dagen na het laatste geval in de cluster (tenzij die uitzonderlijk actief door de regionale gezondheidsdienst wordt afgesloten). De actieve clusters gemeld in de rapportageperiode, zijn de clusters die tenminste 1 dag van de rapportageperiode actief waren. Deze includeren dus de nieuwe clusters, de nog open clusters en clusters die werden gesloten tijdens de week van rapportage. Deze rapportering gebeurt op basis van verschillende gegevensbronnen en is afhankelijk van factoren die per regio kunnen verschillen.

Om de resultaten te interpreteren, is het belangrijk om rekening te houden met de methode waarmee en het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. De belangrijkste doelstelling van de clusteropvolging is het beperken van de verspreiding van het virus door de identificatie en controle van uitbraken. Daarom is dit vooral gericht op clusters waar een interventie mogelijk is. Dat wil zeggen dat er een duidelijke context is waarin preventieve en uitbraak limiterende maatregelen genomen kunnen worden. De clusteropvolging wordt uitgevoerd op verschillende niveaus (gemeentelijk, provinciaal en regionaal) binnen de verschillende regio's en gemeenschappen. Het is dus mogelijk dat sommige clusters lokaal worden beheerd en dat de gegevens niet noodzakelijkerwijs naar het regionaal niveau worden doorgegeven, en dus ook in deze rapportage ontbreken. Bovendien zijn er verschillen in de bevestiging van de clusters per regio die van invloed kunnen zijn op de absolute cijfers.


De gegevens voor het onderzoek naar clusters in de drie gewesten en de Duitstalige gemeenschap zijn voornamelijk afkomstig van vier bronnen: de systematische verplichte melding door instellingen (woonzorgcentra, rusthuizen, andere residentiële instellingen en zorginstellingen); de databank van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) voor de opsporing en opvolging van mogelijke clusters in bedrijven; gegevens van het contact center en gegevens van de scholen.

Clusters in scholen die hier worden genoemd zijn alleen diegene die geregistreerd werden door de regionale diensten voor het beheer van infectieziekten. Sommige clusters die door de medisch-sociale diensten binnen de scholen worden gemonitord zijn niet in dit rapport opgenomen. Deze rapportage van clusters in de scholen is daarom mogelijk niet volledig. Een geautomatiseerde registratiestroom van clusters in Vlaamse scholen werd recent opgezet. Het maakt de datakoppeling mogelijk tussen de gegevens van de Zorgatlas (VAZG) en de gegevens van LARS “Leerlingen Activiteiten en Registratie Systeem” (dat gebruikt wordt door het CLB om het contactonderzoek ter hoogte van een school te registreren). Dit platform laat toe om de clusters beter in kaart te brengen, wat de plotselinge toename in het aantal geregistreerde clusters sinds week 17 verklaart.

De regio's kunnen ook gebruik maken van sommige andere informatiebronnen om een onderzoek te starten. Dit is voornamelijk van toepassing op bevestigde clusters die gelinkt zijn aan gebeurtenissen in de gemeenschap. Het kleine aantal registraties in deze categorie is het gevolg van het feit dat het zeer moeilijk is om een epidemiologische link tussen personen in de algemene gemeenschap te bevestigen als oorzaak. Hierdoor is de kans dat een cluster in de gemeenschap wordt geregistreerd als een bevestigde cluster dus veel kleiner dan een cluster in een structurele collectiviteit.




Aantal actieve clusters gerapporteerd door de regio's, week 7 (2021) tot week 22 (2021)



Tijdens de periode van 31 mei tot 6 juni werden er 306 nieuwe clusters gemeld (waarin 907 gevallen zijn geïdentificeerd) en 2155 clusters zijn actief (waarin 18 028 gevallen zijn geïdentificeerd). Clusters worden 14 dagen na de melding van het laatste geval gesloten, als er in die periode geen andere nieuwe gevallen worden geïdentificeerd gelinkt aan dezelfde cluster.


De meeste actieve bevestigde clusters voor week 22 worden gemeld op de werkplaats (42%) en in scholen (43%). Er wordt een stabilisering van het aantal actieve clusters in woonzorgcentra gezien (4%). De instellingen voor personen met een handicap zijn goed voor 2% en de opvangcentra en opvangtehuizen (waaronder ook gevangenissen) zijn goed voor 1%. De medische collectiviteiten representeren 1% van het totaal aantal gerapporteerde actieve clusters. Onder deze laatste categorie vallen residentiële en niet-residentiële centra waarin zorg wordt verleend (algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, palliatieve zorg, etc.). De clusters in de gemeenschap (in privé-evenementen, horeca, etc.) vertegenwoordigen 2% van het totale aantal door de regio's gemelde clusters.

Aantal nieuwe clusters gerapporteerd (n=306) door de regio's per provincie en per type cluster, week 22
 (31/05/21 tot 06/06/21)



* Met uitzondering van werknemers in collectiviteiten

Aantal actieve clusters gerapporteerd (n=2 155) door de regio's per provincie en per type cluster, week 22
 (31/05/21 tot 06/06/21)




* Met uitzondering van werknemers in collectiviteiten

3.12.2. Familiale clusters voor de week van 31/05/21 tot 06/06/21

In deze figuur worden familiale clusters vermeld die via de databank van het contactcenter opgespoord werden, hetzij door de regio's, hetzij door Sciensano op basis van vergelijkbare criteria. Dit is een theoretische detectie van clusters. Alle COVID-19 positieve gevallen worden door het contactcenter gecontacteerd om de follow-up van de contacten mogelijk te maken, maar tenzij er uitzonderingen of aanvullende informatie zijn, zal een familiecluster niet verder worden onderzocht door de surveillancedienst voor infectieziekten van de verschillende regio's.

Aantal opgespoorde familiale clusters per regio en per week, week 7 (2021) tot 22 (2021), België




3.12.3. Evolutie van het aantal opgespoorde mogelijke clusters in woonzorgcentra (31/05/21-06/06/21)

Naast de systematische gegevensverzameling van COVID-19 gevallen binnen de woonzorgcentra (WZC) heeft Sciensano een surveillance en een vroegtijdig detectiesysteem voor mogelijke clusters binnen de WZC opgezet op basis van de meldingen die voor de drie regio's zijn geregistreerd. Momenteel registreren ongeveer 96% van de WZC minstens éénmaal per week hun gegevens.

Een mogelijke cluster wordt gedefinieerd als minstens twee gemelde bevestigde gevallen binnen een periode van 7 dagen. In onderstaande grafiek worden de nieuwe mogelijke clusters per week (maandag t/m zondag) en per regio voorgesteld. Mogelijke actieve clusters die de week voordien reeds werden opgenomen zijn niet in deze grafiek terug te vinden.


Belangrijk is hier dat deze mogelijke clusters op basis van dataverzameling opgespoord worden maar dat er nog steeds een uitbraakonderzoek nodig is om deze te bevestigen. De clusterdetectie kan vertraging oplopen omdat de WZC hun bewoners eerst moeten testen en bijgevolg het positieve resultaat moeten ontvangen voordat ze een bevestigd geval kunnen melden.

Aantal nieuwe mogelijke clusters in WZC, per week en per regio/gemeente, 15/02/21-06/06/21



Zolang er in de twee voorbijgaande weken nieuwe bevestigde COVID-19 gevallen onder de bewoners gerapporteerd worden, wordt de mogelijke cluster als een actieve mogelijke cluster gezien. In onderstaande grafiek worden de actieve mogelijke clusters per week (maandag t/m zondag) en per regio/gemeenschap voorgesteld.

Aantal actieve mogelijke clusters in WZC, per week (maandag t.e.m. zondag) en per regio/gemeenschap, 15/02/21-06/06/21



3.13. SURVEILLANCE DOOR HUISARTSEN


3.13.1. Surveillance van griepklachten door een peilnetwerk van huisartsen

Het peilnetwerk van huisartsen registreert continu de consultaties bij de huisarts voor griepklachten en acute luchtweginfecties. Deze symptomen kunnen ook veroorzaakt worden door andere kiemen dan het influenza virus. Daarom wordt elke griepseizoen wekelijks bij een steekproef van deze patiënten via een neuswissel een klinisch staal afgenoem. Dit wordt dan door het Nationaal Referentiecentrum influenza, microbiologisch onderzocht wordt op het griepvirus en een aantal andere luchtwegvirussen (waaronder, sinds maart 2020, ook SARS-CoV-2). Het netwerk bestaat uit ongeveer 100 huisartsenpraktijken in heel België, die vrijwillig gegevens rapporteren.

Onderstaande grafiek geeft per week het aantal raadplegingen omwille van griepklachten en acute luchtweginfecties per 100 000 inwoners weer en dit voor de laatste 5 griepseizoenen.


In het griepseizoen van 2019-2020 wordt een duidelijke tweedeling gezien waarbij de eerste piek verklaard wordt door influenza en de tweede piek en zijn uitloper door de opkomst van SARS-CoV-2. De donkergradiënt groene lijn beschrijft de huidige periode en toont het aantal raadplegingen voor griepklachten en acute luchtweginfecties.

In de week van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021 steg de totale incidentie van raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige klachten licht naar 56 raadplegingen per 100.000 inwoners per week (inclusief telefonische raadplegingen).



Sinds 18 mei 2020 is het door de nationale teststrategie en -organisatie voor COVID-19 tijdelijk niet mogelijk voor de huisartsen in het peilnetwerk om een wisser voor influenza af te nemen. Daarom werd vanaf 29 juni 2020 een surveillance van testresultaten opgezet bij de peilartsen, om het percentage COVID-19 onder de patiënten met griepklachten te kunnen blijven opvolgen.

In de week van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021 had 37.5% van de patiënten die hun huisarts bezochten omwille van griepsymptomen een positieve PCR-test voor SARS-CoV-2.




Het complete wekelijks bulletin rond luchtweginfecties vindt u terug via [deze link](#).

3.13.2. Registratie van vermoedelijke COVID-19 patiënten in de barometer voor huisartsen

De barometer is actief sinds oktober 2020 en brengt diagnoses in kaart die symptomatisch lijken op COVID-19, namelijk vermoeden of bevestiging van COVID-19, viraal syndroom, griep en acute luchtweginfecties. Op basis van de diagnoses die gecodeerd zijn in de elektronische medische dossiers van de deelnemende huisartsen wordt het totaal (per diagnose) op het einde van de dag uitgerekend.

In onderstaande grafieken wordt de evolutie van het gemiddeld aantal contacten met een huisarts voor vermoeden van COVID-19 voorgesteld per 100.000 inwoners. De evolutie wordt zowel voor België in zijn geheel getoond als opgesplitst voor Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.



Het complete wekelijks bulletin rond luchtweginfecties vindt u terug via [deze link](#).


3.14. AFWEZIGHEID OP HET WERK WEGENS ZIEKTE

MEDEX controleert de dagelijkse afwezigheid wegens ziekte van Belgische overheidsfunctionarissen (MEDEX database, n = 83 002). Deze afwezigheden kunnen worden beschouwd als een maatstaf voor de impact van COVID-19 op de werkende bevolking maar niet alle afwezigheden zijn noodzakelijkerwijs ten gevolge van een SARS-CoV-2-infectie. Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat quarantainecertificaten niet worden opgenomen in deze database.

Onderstaande figuur toont de dagelijkse afwezigheden omwille van ziekte onder de overheidsfunctionarissen per leeftijdsgroep. De verschillende leeftijdsgroepen vertegenwoordigen respectievelijk 8,9% (20-29 jaar); 21,3% (30-39 jaar); 26,2% (40-49 jaar); 32,0% (50-59 jaar); en 11,6% (60-69 jaar) van de overheidsfunctionarissen.

Het is ook belangrijk om op te merken dat de onderzochte populatie in februari 2020 is "bevroren". De interpretatie van de resultaten moet dus met de nodige voorzichtigheid gebeuren, vooral voor bepaalde leeftijdsgroepen. Zo wordt er bijvoorbeeld voor de 60-69-jarigen geen rekening gehouden met pensionering. Voor deze leeftijdsgroep is het dan ook moeilijk om de evolutie van de afwezigheden te interpreteren. Sinds begin april is het aantal zieke ambtenaren stabiel gebleven. Dit betreft alle leeftijdsgroepen.

Aantal zieke overheidsfunctionarissen (MEDEX, n = 83 002) per leeftijdsgroep, dagelijkse evolutie sinds 15/02/21.




Bron: [MEDEX](#)

De door de arts gestelde diagnose staat vermeld op het MEDEX-certificaat van arbeidsongeschiktheid. Deze gegevens worden gegroepeerd op basis van ICD 9 (WHO-nomenclatuur) en vrije tekst.

Onderstaande figuur toont het aantal overheidsfunctionarissen met een luchtwegaandoening, op basis van de diagnose die op het attest staat vermeld. Sinds begin april is het aantal diagnoses van "COVID-19", "griepaal syndroom (ILI)" of "andere respiratoire aandoeningen" gedaald.

Aantal zieke overheidsfunctionarissen (MEDEX, n = 83 002), per diagnose (enkel luchtwegaandoeningen) vermeld op het certificaat, dagelijkse evolutie sinds 15/02/21



3.15. MOBILITEIT IN BELGIË EN PER PROVINCIE

Gegevens verzameld tot 05 juni 2021


3.15.1. Gegevens verzameld door Proximus

Disclaimer: Proximus deelt zijn geaggregeerde mobiliteitsgegevens met Sciensano om bij te dragen tot de strijd tegen de COVID-19 epidemie.

Onderstaande figuur toont de evolutie van de mobiliteit in België (zwarte curve) alsook in elke provincie en in Brussel (gekleurde curves). De mobiliteit wordt hier geëvalueerd op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens die door de telefoonoperator Proximus worden verzameld. De verticale stippellijnen geven de data aan van de belangrijkste maatregelen die zijn genomen in het kader van het COVID-19-crisismanagement.

In de afgelopen week is de algemene mobiliteit overal in België toegenomen. De mobiliteitsniveaus zijn nu vergelijkbaar met die van begin september 2020.

Evolutie van de mobiliteit in België (zwarte curve) en in elke provincie, op basis van de verplaatsingen buiten de postcode van de Proximus-abonnees, berekend als een wijziging ten opzichte van de referentieperiode 10-23 februari 2020



Opmerking: Elke provincie heeft zijn eigen referentieniveau (baseline). Als het niveau van de curve in de ene provincie lager is dan in een andere, betekent dit dus bijgevolg dat de mobiliteit in die provincie meer is afgenomen ten opzichte van de referentieperiode, maar niet noodzakelijkerwijs dat de mobiliteit in die provincie in absolute zin lager is.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie van de mobiliteit in de laatste weken. Het toont de verschillen per week in vergelijking met de variaties in mobiliteit die werden waargenomen tijdens de inperkingsperiode van maart-april 2020. In de periode van 18 maart tot 4 mei 2020 daalde de mobiliteit met 43,1% ten opzichte van de prepandemische referentieperiode (10-23 februari 2020). De getallen in onderstaande tabel zijn de verschillen tussen dit relatieve percentage dat kenmerkend is voor de inperkingsperiode en het percentage dat in elk van de laatste 8 weken is waargenomen. Hoe hoger het percentage, hoe dichter de mobiliteit bij het niveau van februari 2020 komt.

Verschil in mobiliteitsvariatie (%) ten opzichte van de eerste inperkingsperiode (van 18 maart tot 4 mei 2020) in België, in elke provincie en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De resultaten worden per week gegeven voor de laatste acht weken. De resultaten zijn rood gekleurd: hoe donkerder de cel, hoe meer de mobiliteit is toegenomen ten opzichte van de eerste inperkingsperiode.

	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18	Week 19	Week 20	Week 21	Week 22
België	21.5	29.0	28.8	30.5	26.8	26.9	27.3	35.0
Antwerpen	21.5	28.1	27.7	28.7	26.0	26.6	27.1	35.5
Brabant Wallon	23.6	32.9	33.1	35.2	31.2	31.5	30.4	37.5
Hainaut	23.7	31.9	32.4	34.0	29.6	29.7	30.1	37.8
Liège	21.5	29.3	29.1	30.9	27.6	26.7	27.0	34.7
Limburg	23.4	30.3	30.5	31.8	29.0	29.6	29.8	38.1
Luxembourg	24.7	33.0	32.7	34.3	30.4	30.3	29.7	38.2
Namur	21.0	29.1	29.4	31.3	28.3	28.2	27.7	36.2
Oost-Vlaanderen	18.5	24.5	24.1	25.7	21.8	22.4	23.4	31.2
Vlaams-Brabant	17.9	26.0	25.5	27.6	24.3	24.8	25.0	31.6
West-Vlaanderen	20.3	25.6	25.1	26.0	20.4	21.0	23.1	30.7
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	26.1	31.9	32.2	33.4	32.8	31.7	33.7	39.8

3.15.2. Gegevens verzameld door Google

Disclaimer: Google stelt zijn geaggregeerde mobiliteitsgegevens beschikbaar via [deze link](#) om bij te dragen tot de strijd tegen de COVID-19 epidemie.


De door Google verzamelde mobiliteitsgegevens geven inzicht in de mobiliteit binnen een regio of land. Dit zijn geaggregeerde datasets op basis van de geanonimiseerde gegevens van de gebruikers die hun locatie met Google delen. Hierdoor bevatten deze niet de gegevens voor de hele bevolking.

Onderstaande grafiek toont vier indicatoren die door Google worden aangeboden om veranderingen in de tijd in de mobiliteit te analyseren: woonplaats, werkplekken, detailhandel en recreatie⁷ en openbaar vervoersknooppunten. Het is belangrijk op te merken dat de categorie “woonplaats” wordt gemeten aan de hand van een verandering in gespendeerde duur, d.w.z. langer thuis blijven, terwijl de andere categorieën een verandering in het totale aantal bezoekers meten.

⁷ plaatsen zoals restaurants, cafés, winkelcentra, pretparken, musea, bibliotheken en bioscopen

Alle percentages in mobiliteit worden vergeleken met een mediane referentielijn (nulwaarde). Deze nulwaarde is per indicator berekend op basis van de mobiliteit van die indicator in de periode van 3 januari tot 6 februari 2020. Dit was de meest recente periode waarin de COVID-19-epidemie voor de meeste landen nog niet was begonnen. De referentielijn staat voor de nulwaarde van elke indicator. Alle trends in mobiliteit in tijd en ruimte hebben dus hun eigen unieke referentielijn.

Evolutie van de mobiliteit in België op basis van het aantal bezoeken op specifieke plaatsen en de tijd gespendeerd thuis, ten opzichte van de referentieperiode (3 januari - 6 februari 2020)



3.16. GEGEVENS VAN DE PASSENGER LOCATOR FORMS (PLF)

Bron: Paloma Dashboard (situatie op 10 juni 2021)

Het PLF is een online formulier dat door elke persoon (Belgisch of niet-Belgisch) moet worden ingevuld bij het reizen naar België vanuit een ander land, ongeacht het vervoermiddel.

De landen/regio's van herkomst van de reizigers worden ingedeeld in drie verschillende zones (rode zone, oranje zone en groene zone) op basis van het circulatieniveau van het virus en dus het risico op overdracht/besmetting.

Voor reizigers die in België aankomen gelden verschillende aanbevelingen wat betreft quarantaine en testen, afhankelijk van de zone van herkomst. De zones (rood, oranje en groen) worden door CELEVAL, de FOD Volksgezondheid en FOD Buitenlandse Zaken bepaald op basis van indicatoren zoals bijvoorbeeld de 14-daagse-incidentie van landen.

Aangezien de indeling van een land/regio wordt bepaald door de epidemiologische situatie, kan deze in de tijd variëren. De Belgische teststrategie is ook voortdurend in ontwikkeling. Terugkerende reizigers uit een rode zone moeten twee keer getest worden. Een eerste keer meteen bij de aankomst in België, en een tweede keer ten vroegste op de 7de dag na de datum van aankomst in België.

3.16.1. Aankomsten vanuit een rode zone en de positiviteitsratio

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de maandelijkse gegevens van de PLF's vanaf januari 2021. Het aantal reizigers dat uit een rode risicozone komt, het aantal uitgevoerde testen en de positiviteitsratio worden weergegeven voor België.

Deze gegevens worden aan het eind van elke maand verzameld en worden sterk beïnvloed door de op dat moment geldende teststrategieën.

Tegen eind januari werd gevraagd aan de reizigers die in België kwamen om zich twee keer te laten testen, kort na aankomst en op dag 7. Vanaf mei vertegenwoordigt het totaal aantal te testen personen met een INSZ alleen degenen die een CTPC-code hebben ontvangen die hen toegang geeft tot een screeningstest.

Het is belangrijk om op te merken dat een zone die gedefinieerd staat als rood wordt bepaald door de circulatie van het virus (hoge of lage incidentie). De rode zones wisselen dus in de tijd in functie van een epidemiologische situatie van een land/regio.

	Totaal aantal aankomsten	Aankomsten vanuit een rode zone	Uitgevoerde testen			Positiviteitsratio	
			Aantal te testen personen met een INSZ	Aantal uitgevoerde testen (% van het aantal uitgevoerde testen)	Test 1	Test 2	
				Test 1			
Januari 2021	250 007	218 706	118 827*	95 963 (80,7%)	NA*	3,4%	NA
Februari 2021	105 485	88 688	53 098*	34 821 (65,5%)	18 783 (35,4%)	2,1%	2,0%
Maart 2021	116 946	96 099	58 634*	27 416 (46,7%)	13 490 (23,0 %)**	2,7%	2,2%
April 2021	165 374	125 168	91 089*	52 266 (57,4 %)	27 769 (30,4 %)	2,9 %	2,3 %
Mei 2021	269 281	169 388	90 381**	72 708 (80,4 %)	47 189 (52,2%)	1,3%	0,9%


* Aantal personen met een INSZ die vanuit een rode zone in België komen

** Aantal personen met een INSZ en die een CPTC-code hebben ontvangen die hen toegang geeft tot een screeningstest.

3.16.2. Aantal PLF vanaf 15 februari 2021

In de periode van 15 februari 2021 tot 6 juni 2021 werden in totaal 663 428 PLF ingezameld. Voor deze PLF waren 70,6 % van de formulieren van reizigers uit rode zones en 15,6 % van reizigers uit oranje zones.

Aantal PLF per COVID-risicozone (15/02/21 – 06/06/21)



■ GREEN ZONE / UNKNOWN ■ ORANGE ZONE ■ RED ZONE

3.16.3. Aankomsten vanuit een rode zone en de positiviteitsratio (31/05/21-06/06/21)

Het aantal reizigers dat uit een rode risicozone komt en de positiviteitsratio voor de week van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021 worden hieronder gegeven voor België, per provincie en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze gegevens hebben alleen betrekking op reizigers die een PLF hebben ingevuld.

België/Provincies/ Regio	Totaal aantal aan- komsten	Aankomsten vanuit een rode zone		Aantal te testen personen met een INSZ*	Uitgevoerde testen		Positiviteitsratio		
		Aantal	% (van totaal aan- komsten)		Aantal uitgevoerde testen		Test 1	Test 2	
					Test 1	Test 2			
BELGIE	68 621	38 875		19 929	12 623	2 858	0,8%	0,6%	
Antwerpen	8 859	5 136	7,5%	2 773	1 841	435	0,9%	1,1%	
Brabant wallon	2 786	1 734	2,5%	1 124	683	115	1,5%	1,7%	
Hainaut	4 177	2 398	3,5%	1 383	820	151	0,2%	0,7%	
Liège	3 906	2 578	3,8%	1 459	844	172	0,0%	0,0%	
Limburg	2 228	1 266	1,8%	710	506	103	1,2%	0,0%	
Luxembourg	802	540	0,8%	256	150	35	1,3%	0,0%	
Namur	1 678	1 088	1,6%	654	390	108	0,5%	0,0%	
Oost-Vlaanderen	6 160	3 302	4,8%	1 859	1 269	319	0,7%	0,3%	
Vlaams-Brabant	6 631	3 839	5,6%	2 366	1 539	363	0,5%	0,3%	
West-Vlaanderen	5 449	2 933	4,3%	1 228	830	204	0,8%	0,5%	
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	18 351	13 486	19,7%	6 045	3 722	846	1,0%	0,8%	
Gegevens over provincie ontbreken	7 594	575	0,8%	72	29	7	3,4%	0,0%	

* Dit betreft het aantal personen dat een CTPC-code heeft gekregen om zich te laten testen

3.16.4. Herkomst van de reizigers en positiviteitsratio (31/05/21-06/06/21)


Onderstaande tabel toont de vijftien landen van waaruit de meeste reizigers in de week van 31 mei 2021 tot 6 juni 2021 in België zijn aangekomen en die een PLF hebben ingevuld. De bijbehorende positiviteitsratio wordt per land ook getoond.

Land	Aantal aankomsten	% (van het totaal aantal aankomsten)	Positiviteitsratio* test 1
Spanje	17 106	24,9%	0,7%
Frankrijk	8 347	12,2%	0,4%
Italië	5 057	7,4%	0,4%
Portugal	4 827	7,0%	NA%
Griekenland	2 714	4,0%	0,0%
Duitsland	2 468	3,6%	0,0%
Roemenië	1 704	2,5%	0,0%
Turkije	1 482	2,2%	1,2%
Verenigd Koninkrijk	1 374	2,0%	1,7%
Polen	1 175	1,7%	0,4%
Nederland	1 040	1,5%	0,0%
Verenigde Staten	827	1,2%	0,0%
Verenigde Arabische Emiraten	690	1,0%	2,9%
Bulgarije	661	1,0%	0,0%
Oostenrijk	626	0,9%	1,1%

*Positiviteitsratio op nationaal niveau. Niettemin kunnen er op regionaal niveau aanzienlijke verschillen worden waargenomen.

3.17. TIJDLIJN: BEVESTIGDE COVID-19-GEVALLEN EN REPOS TEN AANZIEN VAN DE EPIDEMIE IN BELGIË

12 500 -



Verdere informatie: <https://www.info-coronavirus.be/nl/>

Deze tijdlijn toont zowel het aantal bevestigde COVID-19-gevallen in België als de data waarop de belangrijkste maatregelen die na de eerste golf, d.w.z. vanaf 22 juni 2020, op nationaal niveau werden ingevoerd. Sinds die datum was er een wisselende circulatie van het virus, dus we beschrijven de versoepeling en aanscherping van de maatregelen alsook de veranderingen in de teststrategie.

De figuur toont de **maatregelen** die genomen zijn door de Nationale Veiligheidsraad (tot 30 september 2020) en vervolgens door het Overlegcomité om de gezondheidscrisis te beheersen. Het Overlegcomité is samengesteld uit 12 vertegenwoordigers van de verschillende landsregeringen en wordt voorgezeten door de eerste minister. Het doel van deze maatregelen is de circulatie van het virus in de bevolking te beperken. Dit om enerzijds de mortaliteit ten gevolge van COVID-19 zo veel mogelijk te verminderen en anderzijds om te voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast raken en dat de reguliere gezondheidszorg wordt vertraagd. Het potentiële effect van de maatregelen, met name de inperkingsmaatregelen, is echter niet onmiddellijk merkbaar.

Tijdens de tweede golf zijn er duidelijk geografische verschillen waargenomen in de evolutie van de epidemie. Daarom werden op verschillende tijdstippen specifieke maatregelen genomen op regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau. Deze worden echter niet in de tijdlijn weergegeven.

De figuur toont ook de wijzigingen in de **teststrategieën** die in de beschreven periode zijn uitgevoerd. Deze worden in de loop van de tijd aangepast aan de evolutie van de epidemie, de organisatie van de Belgische gezondheidszorg en de beschikbare middelen op een bepaald moment.

De teststrategieën worden ontwikkeld op basis van deskundig advies en in nauwe samenwerking met de bevoegde autoriteiten op het gebied van preventie, gezondheidszorg, infectieziektebestrijding en risicobeheer (RAG/RMG).

Het is belangrijk te benadrukken dat het aantal gediagnosticeerde gevallen afhankelijk is van de teststrategie. Deze tijdlijn is beschrijvend bedoeld en is niet bedoeld om de impact van individuele interventies in te schatten.


4. Modellering

4.1. REPRODUCTIEGETAL (R_t)

R_t is een schatting van de besmettingsgraad op een bepaald moment afhankelijk van menselijk gedrag en de biologische kenmerken van de pathogeen (het virus). Een epidemie breidt uit als $R_t > 1$ is en krimpt als $R_t < 1$ is. De waarden van R_t worden geschat op basis van een wiskundig model. Het model dat door Sciensano wordt gebruikt werd ontwikkeld door [Cori et al. \(2013\)](#) en werd aangepast in samenwerking met de UHasselt.

4.1.1. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames voor België

Het geschatte R_t op basis van nieuwe ziekenhuisopnames wordt zowel grafisch als in een tabel gepresenteerd. Naarmate de afname van de waarden waarvan R_t geschat wordt, wordt het betrouwbaarheidsinterval breder en wordt het moeilijker om een stabiele schatting voor te stellen. Het R_t moet daarom altijd geïnterpreteerd worden in combinatie met andere indicatoren van de ziekteverspreiding en -overdracht.



Reproductiegetal	Mediane schatting	95% betrouwbaarheidsinterval
R_t (04/06/21 tot 10/06/21)	0,825	0,749-0,906

4.1.2. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen voor België, per provincie, voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap

Deze schattingen van het reproductiegetal zijn gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests worden gediagnosticeerd.


	Mediane schatting	Ondergrens (kwantiel 2,5)	Bovengrens (kwantiel 97,5)
België	0,770	0,754	0,787
Antwerpen	0,817	0,776	0,860
Brabant wallon	0,784	0,710	0,862
Hainaut	0,721	0,679	0,764
Liège	0,759	0,709	0,810
Limburg	0,771	0,708	0,837
Luxembourg	0,615	0,517	0,721
Namur	0,672	0,593	0,756
Oost-Vlaanderen	0,744	0,693	0,797
Vlaams-Brabant	0,757	0,697	0,820
West-Vlaanderen	0,761	0,707	0,817
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0,868	0,819	0,919
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,647	0,433	0,903

Het is belangrijk om te benadrukken dat de geschatte waarden van R_t afhankelijk zijn van de gemaakte methodologische keuzes en de beperkingen van de gebruikte gegevens. Het ene model is niet beter dan het andere. Ze zijn complementair aangezien ze samen een vollediger beeld geven van de evolutie van de epidemie in België. Een voordeel van de R_t die zich baseert op de ziekenhuisopnames is dat deze niet onderhevig is aan tijdsgerelateerde variatie in de (onder)rapportering terwijl dit wel het geval is voor het R_t op basis van diagnoses. Anderzijds is een voordeel van het R_t gebaseerd op de diagnoses, dat die gevoeliger is voor een plotselinge verandering in het aantal diagnoses. Deze hogere variabiliteit brengt echter wel een moeilijkere interpretatie van de schatting met zich mee.

4.2. VOORSPELLINGSMODEL OP KORTE TERMIJN VOOR NIEUWE ZIEKENHUISOPNAMES

Onderstaande voorspellingen zijn gebaseerd op twee verschillende modellen van de Universiteit Hasselt (GAM) en Sciensano (INLA). Deze modellen gebruiken verschillende indicatoren, zoals het aantal bevestigde gevallen, het ziekteverzuim of de mobiliteit, om het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van bevestigde COVID-19 gevallen te voorspellen. Meer details over de modellen en aanvullende analyses zijn beschikbaar op de [epistat-website](#).

In de onderstaande figuur toont de zwarte lijn het aantal waargenomen nieuwe ziekenhuisopnames en de gekleurde lijnen geven de voorspellingen van elk model aan. Het betrouwbaarheidsinterval van elk model wordt aangegeven in de overeenkomende kleur.




Een verklarende nota omtrent de hierboven gebruikte voorspellingsmodellen is beschikbaar via [deze link](#).

4.3. VOORSPELLINGSMODEL VOOR DE BEZETTINGSGRAAD OP INTENSIEVE ZORGEN

Hieronder worden de voorspellingen en hun 95% betrouwbaarheidsintervallen weergegeven voor het aantal bezette IZ-bedden voor de komende 14 dagen. De stippellijn toont de geobserveerde bezettingsgraad voor de voorbije periode. Het model gebruikt telkens alle gegevens die tot op dat moment/heden beschikbaar zijn en probeert een zo goed mogelijke benadering te creëren voor alle geobserveerde waardes. Hierdoor is het mogelijk dat de voorspellingslijn die de periode die al voorbij is beschrijft nog verandert.

Het aantal beschikbare bedden op de IZ in fase 1 en 2 (zie paragraaf 3.4) wordt aangegeven door de bijbehorende horizontale lijnen. De grijze lijn toont de maximumcapaciteit die er dan beschikbaar is voor patiënten met COVID-19 op IZ. De rode lijn toont de maximumcapaciteit in fase 2.

Evolutie van de bezetting van de ICU-bedden



Hieronder worden de voorspellingen en hun 95% betrouwbaarheidsintervallen weergegeven voor het aantal bezette ICU-bedden voor de komende 14 dagen. Een mogelijke overschrijding van de ICU-capaciteit wordt in het rood weergegeven.

Datum	Geobserveerd	Voorspeld	2,5% BI	97,5% BI
2021-06-09	309	275	180	382
2021-06-10	303	262	179	358
2021-06-11		259	189	338
2021-06-12		250	172	346
2021-06-13		239	160	324
2021-06-17		207	139	286

5. Internationale en EU-epidemiologische situatie

5.1. INTERNATIONALE SITUATIE

31/12/19 - 10/06/21	Cases	Deaths	Proportion deaths/cases	5 most affected countries (cases)
Worldwide	171 049 036	3 549 704	2,1%	
America	67 895 582	1 659 173	2,4%	United States Of America Brazil Argentina Colombia Mexico
Europe	53 294 291	1 134 485	2,1%	France Turkey Russia United Kingdom Italy
Asia	44 947 054	624 255	1,4%	India Iran Indonesia Philippines Iraq
Africa	4 835 646	130 399	2,7%	South Africa Morocco Tunisia Ethiopia Egypt
Oceania	76 463	1 392	1,8%	Australia French Polynesia Papua New Guinea Guam New Zealand


Source: ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases>)

5.2. SITUATIE IN EUROPA (EU/EEA EN UK), BRON ECDC


ECDC disclaimer: National updates are published at different times and in different time zones. This, and the time ECDC needs to process these data, may lead to discrepancies between the national numbers and the numbers published by ECDC. Users are advised to use all data with caution and awareness of their limitations. Data are subject to retrospective corrections; corrected datasets are released as soon as processing of updated national data has been completed.

Note: ECDC switched to a weekly reporting schedule for the COVID-19 situation worldwide and in the EU/EEA and the UK on 17 December 2020. Hence, all daily updates have been discontinued from 14 December 2020. ECDC will publish updates on the number of cases and deaths reported worldwide and aggregated by week every Thursday.

Distribution of cumulative confirmed cases per 100 000 inhabitants (24/05/21 - 06/06/21)



Onderstaande grafiek toont de evolutie van de 14-daagse cumulatieve incidentie per 100 000 inwoners voor België en de landen van waar reizigers, na het invullen van een PLF, in België aankomen. Deze grafiek heeft enkel tot doel de epidemiologische situatie te beschrijven op basis van deze indicator en is niet bedoeld om een vergelijking tussen landen te maken. Het moet met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat de 14-daagse cumulatieve incidentie beïnvloed kan worden door verschillende factoren, zoals de teststrategie en de maatregelen die in de verschillende landen van toepassing zijn.



De huidige gegevens voor Frankrijk zijn niet beschikbaar voor dit rapport wegens retroactieve correctie van het aantal gevallen op vrijdag 21/05/2021

Country	Number of cases since the beginning of the epidemic	Number of deaths since the beginning of the epidemic	Number of cases in the last 2 weeks (24/05/21-06/06/21)	Incidence/100,000 for the last 2 weeks (24/05/21-06/06/21)
Denmark	286 948	2 520	12 535	215
Netherlands	1 662 281	17 659	35 465	204
Latvia	134 812	2 413	3 867	203
Greece	409 368	12 277	19 564	183
Belgium	1 071 404	25 043	21 010	182
Lithuania	276 759	4 317	5 077	182
Slovenia	255 432	4 707	3 659	175
France	NA	110 027	109 087	162
Spain	3 707 523	80 236	60 003	127
Ireland	263 647	4 941	5 744	116
Estonia	130 156	1 264	1 487	112
Cyprus	72 779	363	868	98
Luxembourg	70 182	818	575	92
Croatia	357 608	8 091	3 548	87
Norway	126 817	784	4 445	83
United Kingdom	4 516 892	127 840	54 354	80
Portugal	853 034	17 036	7 569	74
Italy	4 232 428	126 523	40 245	67
Slovakia	776 147	12 414	3 314	61
Austria	642 784	10 376	5 403	61
Germany	3 701 484	89 244	49 844	60
Liechtenstein	3 022	58	20	52
Czechia	1 663 607	30 164	5 515	52
Bulgaria	419 473	17 820	2 827	41
Hungary	806 089	29 866	3 743	38
Finland	93 281	959	1 662	30
Poland	2 875 328	74 160	9 147	24
Romania	1 078 952	30 878	3 179	16
Iceland	6 612	30	56	15
Malta	30 571	419	65	13
Sweden	NA	14 546	NA	NA

Source : ECDC (<https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea>)

6. Annex

6.1. SAMENVATTING VAN DE KERNINDICATOREN

Onderstaande tabel bevat de voornaamste indicatoren voor het opvolgen van de epidemie. Deze worden opgedeeld in drie categorieën: intensiteitsindicatoren met betrekking tot het aantal gediagnosticerde gevallen en uitgevoerde tests, indicatoren voor de ernst van de situatie betreffende ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en vaccinatie-indicatoren. Deze indicatoren worden per kalenderweek weergegeven voor de laatste vier weken.

Indicator	10/5-16/5	17/5-23/5	24/5-30/5	31/5-6/6
Indicatoren van intensiteit				
Gemiddeld aantal nieuwe gevallen per dag ^(a)	2 090	2 430	1 716	1 286
Verdubbelingstijd/Halveringstijd ^(b)	13	32	14	17
Reproductiegetal ^(c)	0,814	1,060	0,868	0,804
Aantal uitgevoerde testen per 100 000 inw.	2 547	3 054	2 656	2 702
Positiviteitsratio ^(a)	5,8%	5,4%	4,6%	3,4%
14-daagse incidentie per 100 000 inw. ^(d)	310	275	252	183
Indicatoren van ernst				
Gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor COVID-19 per dag ^(a)	138	119	87	71
7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames voor COVID-19 per 100 000 inw. ^(d)	8,41	7,22	5,32	4,35
Aantal ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(e)	1 802	1 501	1 219	967
Aantal IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(e)	619	542	442	331
Percentage erkende IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(f)	31%	27%	22%	17%
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen per dag	21	18	14	12
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra per dag ^(a)	2	1	2	3
Indicatoren van vaccinatie				
Daggemiddelde van het aantal toegediende dosissen ^(a)	85 903	107 467	90 463	127 826
Vaccinatiegraad voor België ^(g)	11,9%	15,1%	18,5%	22,9%

^(a) 7-dags gemiddelde. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de geconsolideerde gegevens voor de beschreven week.

^(b) De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticerde gevallen te halveren.

^(c) Reproductiegetal berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests werd gediagnosticerd. Het gaat hier om het productiegetal dat berekend is op de laatste dag van de beschreven week (zondag).

^(d) De incidentie wordt berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren.

^(e) Gegevens over de laatste dag van de beschreven week (zondag)

^(f) De bezettingsgraad is berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren. Het totale aantal IZ-bedden dat in november 2020 erkend was, bedroeg 1992 bedden voor België. Dit aantal omvat zowel IZ-bedden die beschikbaar zijn voor COVID-19-patiënten als IZ-bedden die beschikbaar zijn voor andere patiënten.

^(g) Vaccinatiegraad van de bevolking van 18 jaar en ouder (volledige vaccinatie)

6.2. AANTAL PERSONEN GEDIAGNOSTICEERD (PCR EN ANTIGEEN) TUSSEN 4 MEI 2021 EN 10 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Bevestigde gevallen	Aantal nieuwe gevallen per periode van 7 dagen
04/05/21	3 652	
05/05/21	3 633	20 009 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
06/05/21	3 490	Gemiddeld 2 858,4 gevallen per dag
07/05/21	3 304	Dus een incidentie over een week van
08/05/21	1 707	174,1/100 000 inwoners
09/05/21	867	
10/05/21	3 356	
11/05/21	2 988	
12/05/21	2 789	14 868 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
13/05/21	930	Gemiddeld 2 124,0 gevallen per dag
14/05/21	2 556	Dus een incidentie over een week van
15/05/21	1 267	129,4/100 000 inwoners
16/05/21	746	
17/05/21	3 592	
18/05/21	3 256	
19/05/21	3 145	14 304 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
20/05/21	2 387	Gemiddeld 2 043,4 gevallen per dag
21/05/21	2 438	Dus een incidentie over een week van
22/05/21	1 417	124,5/100 000 inwoners
23/05/21	772	
24/05/21	889	
25/05/21	2 741	
26/05/21	2 509	13 138 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
27/05/21	2 177	Gemiddeld 1 876,9 gevallen per dag
28/05/21	2 003	Dus een incidentie over een week van
29/05/21	1 103	114,3/100 000 inwoners
30/05/21	589	Een daling van -37,5% tussen deze 2 periodes
31/05/21	2 016	Een incidentie over een periode van 14 dagen van 185,8 nieuwe gevallen/100 000 inwoners
01/06/21	1 673	
02/06/21	1 491	8 211 gevallen tijdens deze periode van 7 dagen
03/06/21	1 457	Gemiddeld 1 173,0 gevallen per dag
04/06/21	1 339	Dus een incidentie over een week van
05/06/21	642	71,4/100 000 inwoners
06/06/21	387	
07/06/21	1 222	
08/06/21	1 010	De gerapporteerde gegevens van de afgelopen dagen vereisen altijd een geleidelijke consolidatie onder meer door het proces van staalafname tot rapportage.
09/06/21	462	
10/06/21	1	

Noot: Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het interactieve dashboard [epistat](#). De gegevens worden dagelijks geüpdateert (7/7).

6.3. AANTAL UITGEVOERDE TESTEN TUSSEN 4 MEI 2021 EN 10 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal testen
04/05/21	65 605
05/05/21	60 090
06/05/21	63 405
07/05/21	63 454
08/05/21	43 284
09/05/21	22 508
10/05/21	45 660
11/05/21	64 936
12/05/21	56 506
13/05/21	29 696
14/05/21	40 323
15/05/21	35 825
16/05/21	19 755
17/05/21	41 067
18/05/21	72 369
19/05/21	64 109
20/05/21	57 718
21/05/21	54 849
22/05/21	39 212
23/05/21	21 633
24/05/21	24 926
25/05/21	51 007
26/05/21	63 642
27/05/21	54 258
28/05/21	53 279
29/05/21	37 451
30/05/21	20 736
31/05/21	49 785
01/06/21	54 285
02/06/21	50 411
03/06/21	49 230
04/06/21	49 295
05/06/21	38 339
06/06/21	19 175
07/06/21	42 970
08/06/21	49 418
09/06/21	44 221
10/06/21	956

364 006 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld
52 001/dag

288 108 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld
41 158/dag

334 816 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld
47 831/dag

330 158 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld
47 165/dag

303 705 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld
43 386/dag

De gegevens van de laatste dagen zijn nog niet volledig. Het duurt enkele dagen voor alle testen aan Sciensano zijn gemeld.

6.4. AANTAL PERSONEN OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS TUSSEN 7 MEI 2021 EN 10 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal nieuwe ziekenhuis-opnames /dag	Aantal ontslagen /dag	Aantal gehospitaliseerde patienten	Aantal COVID bevestigde IZ-patienten	Aantal COVID mogelijke IZ-patienten
07/05/21	163	217	2 307	727	28
08/05/21	164	274	2 167	707	22
09/05/21	159	89	2 172	702	24
10/05/21	134	48	2 253	710	23
11/05/21	166	Dus gemiddeld 154,0/dag	275	2 108	686
12/05/21	148		217	2 025	660
13/05/21	144		235	1 912	644
14/05/21	102		91	1 917	643
15/05/21	168	867 nieuwe ziekenhuis-opnames	242	1 804	621
16/05/21	105	Dus gemiddeld 123,9/dag	92	1 802	619
17/05/21	99		45	1 857	613
18/05/21	131		222	1 753	595
19/05/21	141		174	1 702	589
20/05/21	121		169	1 640	562
21/05/21	127		171	1 600	540
22/05/21	123		189	1 491	544
23/05/21	88	705 nieuwe ziekenhuis-opnames	73	1 501	542
24/05/21	76	Dus gemiddeld 100,7/dag	38	1 532	542
25/05/21	90		84	1 547	531
26/05/21	110		202	1 463	508
27/05/21	91		166	1 366	491
28/05/21	83		144	1 290	469
29/05/21	92	548 nieuwe ziekenhuis-opnames	166	1 206	451
30/05/21	69	Dus gemiddeld 78,3/dag	48	1 219	442
31/05/21	56		47	1 232	439
01/06/21	92		153	1 159	404
02/06/21	81		132	1 124	378
03/06/21	75		126	1 063	365
04/06/21	74		109	1 007	342
05/06/21	76	424 nieuwe ziekenhuis-opnames	105	978	337
06/06/21	46	Dus gemiddeld 60,6/dag	39	967	331
07/06/21	42		45	968	336
08/06/21	73		139	888	319
09/06/21	65		94	852	309
10/06/21	48		84	820	302

6.5. AANTAL STERFGEVALLEN TUSSEN 4 MEI 2021 EN 10 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal sterfgevallen
04/05/21	40
05/05/21	38
06/05/21	38
07/05/21	26
08/05/21	42
09/05/21	32
10/05/21	28
11/05/21	17
12/05/21	19
13/05/21	21
14/05/21	20
15/05/21	22
16/05/21	17
17/05/21	24
18/05/21	17
19/05/21	25
20/05/21	16
21/05/21	18
22/05/21	18
23/05/21	11
24/05/21	19
25/05/21	16
26/05/21	14
27/05/21	6
28/05/21	11
29/05/21	16
30/05/21	18
31/05/21	14
01/06/21	11
02/06/21	16
03/06/21	15
04/06/21	10
05/06/21	13
06/06/21	7
07/06/21	4
08/06/21	13
09/06/21	6
10/06/21	2

244 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 34,9/dag

140 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 20,0/dag

124 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 17,7/dag

95 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 13,6/dag

76 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 10,9/dag

7. Preventie en informatie

1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen. Laten we de regels volgen.

Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan, moeten we samen de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio extra maatregelen van kracht. Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.



Was je handen
regelmatig



Draag
een mondmasker



Hou
1,5 m afstand



Beperk je tot
1 knuffelcontact



Denk aan
kwetsbare mensen



Werk thuis



Verlucht
binnenruimtes



Doe je activiteiten
liefst buiten



Je kan alle details
raadplegen op
www.info-coronavirus.be

Een initiatief van de Belgische overheid. .be