Congruent	Incongruent	D	C平均值	I平均值	差异点估计	S	D平均值	手工计算		t统计		@
12.079	19.278	-7.199	14.051125	22.01591667	-7.964791667	4.86482691	-7.964791667	0.5864368767	23.66654087	t=-7.96/(4.86／24开平方)		0.05
16.791	18.741	-1.95						36.17771879	4.86482691	-8.025514403		
9.564	21.214	-11.65						13.58076046				
8.63	15.687	-7.057						0.8240857101				
14.669	22.803	-8.134						0.02863146007				
12.238	20.878	-8.64						0.4559062934				
14.692	24.572	-9.88						3.66802296				
8.987	17.394	-8.407						0.1955482101				
9.401	20.762	-11.361						11.53423104				
14.48	26.282	-11.802						14.72416779				
22.328	24.524	-2.196						33.27895729				
15.298	18.644	-3.346						21.33323646				
15.073	17.51	-2.437						30.55648071				
16.929	20.33	-3.401						20.82819438				
18.2	35.255	-17.055						82.63188754				
12.13	22.158	-10.028						4.256828627				
18.495	25.139	-6.644						1.744490627				
10.639	20.429	-9.79						3.33138546				
11.344	17.425	-6.081						3.548671043				
12.369	34.288	-21.919						194.7199302				
12.944	23.894	-10.95						8.911468793				
14.233	17.96	-3.727						17.95887821				
19.71	22.058	-2.348						31.54834863				
16.004	21.157	-5.153						7.906172377				



P	df	t	so	Cohen's d	CI		r^2
0.0001	23	2.069		-1.637219949	Md+/-t*(Sd/n开平方）		t^2/t^2+df
		-2.069	-8.03<-2.069				0.7368688442
			Reject H0		-7.96+/-2.069*（4.86/sqrt(24))		
					-10.01253768		
					-5.907462317		