Departamento de Matemáticas 1º Bachillerato CCSS

Examen de números reales

Nombre:	Fecha:				
Tiompo: 50 minutos	Tipe: B				

Esta prueba tiene 8 ejercicios. La puntuación máxima es de 16. La nota final de la prueba será la parte proporcional de la puntuación obtenida sobre la puntuación máxima.

Ejercicio:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Puntos:	2	2	2	3	2	3	1	1	16

1. Indica a cuáles de los conjuntos \mathbb{N} , \mathbb{Z} , \mathbb{Q} , \mathbb{R} pertenecen cada uno de los (2 puntos) siguientes números:

	N	\mathbb{Z}	\mathbb{Q}	\mathbb{R}
5				
-7				
0, 23				
$\sqrt{\frac{18}{2}}$				
$-\sqrt{3}$				
$\sqrt[3]{-5}$				
$4, \widehat{7}$				
$\frac{-\pi}{2}$				
$-\sqrt{25}$				
$\sqrt{-4}$				

2. Efectúa la siguiente operación, dando el resultado en notación científica y con la mantisa redondeada a las centésimas. Da, en notación científica también, una cota del error absoluto producido en el redondeo. (2 puntos)

$$\frac{5,12\cdot 10^3\cdot 4,2\cdot 10^7}{1,8\cdot 10^{15}}$$

3. Expresa en forma de intervalo:

(a)
$$|x-4| < 5$$
 (1 punto)

(b)
$$|x+3| \geqslant 2$$
 (1 punto)

4. Opera y simplifica:

(a)
$$4\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 11\sqrt{125} - 20\sqrt{5}$$

(b)
$$\left(\sqrt[4]{a^3} \frac{1}{a}\right) : \left(a\sqrt{a}\right)$$

(c)
$$\sqrt{8ab} \cdot \sqrt[3]{a^2b}$$
 (1 punto)

5. Racionaliza y simplifica:

(a)
$$\frac{10}{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

(b)
$$\frac{4+\sqrt{6}}{2\sqrt{3}}$$

6. Calcula x, aplicando la definición de logaritmo:

(a)
$$\log_2 0.5 = x$$
 (1 punto)

(b)
$$\log_4 x = -\frac{1}{2}$$
 (1 punto)

(c)
$$\log_x 36 = 4$$
 (1 punto)

7. Calcula:

(a)
$$\log_3 \frac{1}{9} - \log_5 0, 2 + \log_6 \frac{1}{36} - \log_2 0, 5$$

8. Calcula sabiendo que $\log a = 2.5$ y $\log b = -1.2$:

(a)
$$\log \frac{\sqrt[5]{a^2b^4}}{\sqrt[3]{a^5b}}$$