

Departamento de Matemáticas 4º Académicas



Examen de potencias, radicales y logaritmos

Nombre:	Fecha:
Tiempo: 50 minutos	Tipo: C

Esta prueba tiene 9 ejercicios. La puntuación máxima es de 23. La nota final de la prueba será la parte proporcional de la puntuación obtenida sobre la puntuación máxima. Para la recuperación de pendientes de 3º se tendrán en cuenta los apartados: 3.a, 3.b, 4, 5.a, 5.b, 5.c

Ejercicio:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Puntos:	2	1	2	2	5	4	4	1	2	23

1. (2 puntos) Indica a cuáles de los conjuntos \mathbb{N} , \mathbb{Z} , \mathbb{Q} , \mathbb{R} pertenecen cada uno de los siguientes números:

	\mathbb{N}	\mathbb{Z}	\mathbb{Q}	\mathbb{R}
8 16				
$\sqrt[3]{-27}$				
3,01				
$-\frac{12}{4}$				
$ \begin{array}{c c} -\frac{12}{4} \\ -\sqrt{25} \end{array} $				
$\sqrt{8}$				
4				
π				
$\sqrt{-4}$				
$\frac{39}{13}$				

		N	\mathbb{Z}	Q	\mathbb{R}
	$\frac{8}{16}$			X	X
	$\sqrt[3]{-27}$		X	X	X
	3,01			X	X
	$-\frac{12}{4}$		Χ	X	Χ
Solución:	$-\sqrt{25}$		X	X	Χ
	$\sqrt{8}$				X
	4	X	X	X	X
	π				X
	$\sqrt{-4}$				
	$\frac{39}{13}$	X	X	X	X
					•

2. (1 punto) Representa en la recta real y en forma de intervalo el siguiente conjunto numérico:

$$\{x \in \mathbb{R} \, | -2 \leqslant x < 4\}$$

Solución: [-2, 4)

- 3. Opera:
 - (a) (1 punto)

$$\frac{\left(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5\right)^{-4}}{\left(2^{-2} \cdot 3^{-3}\right)^3}$$

Solución: $\frac{3}{2^6 \cdot 5^4}$

(b) (1 punto)

$$\frac{9xy^3z^2}{14x^0yz^3}:\frac{18x^2yz^2}{21xy^3z}$$

Solución: $\frac{3y^4}{4z^2}$

4. (2 puntos) Expresa en notación científica, opera y simplifica:

$$\frac{0'0001 \cdot 0'01 \cdot 10000}{0'1 \cdot 100 \cdot 0'01}$$

Solución: 10^{-1}

- 5. Opera y simplifica cada una de estas expresiones:
 - (a) (1 punto)

$$4\sqrt{20} - 3\sqrt{45} + 11\sqrt{125} - 20\sqrt{5}$$

Solución: $34\sqrt{5}$

(b) (1 punto)

$$\sqrt{72} \cdot 3\sqrt{8}$$

Solución: 72

(c) (1 punto)

$$\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$$

Solución: $\sqrt[8]{2^7}$

(d) (2 puntos)

$$\frac{\left(3\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)^2}{3}$$

Solución: $7 + 2\sqrt{6}$

- 6. Racionaliza y simplifica:
 - (a) (2 puntos)

$$\frac{10}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}$$

Solución: $2\sqrt{3} + \sqrt{2}$

(b) (2 puntos)

$$\frac{\sqrt{45} + \sqrt{180}}{\sqrt{176} + 4\sqrt{44}}$$

Solución: $\frac{3\sqrt{55}}{44}$

- 7. Sin utilizar la calculadora, resuelve los siguientes logaritmos:
 - (a) (1 punto) $\log_8 \frac{1}{8}$

Solución: -1

Solución: $\log_3 27 = \log_3 3^3 = 3$

(b) (1 punto) $\log_9 3$

(d) (1 punto) $\log_5 \sqrt{125}$

Solución: $\frac{1}{2}$

Solución: $\log_5 \sqrt{125}$ $\log_5 5^{3/2} = \frac{3}{2}$

(c) $(1 \text{ punto}) \log_3 27$

- 8. Calcula:
 - (a) (1 punto)

$$\log_2 8 + \log_3 27 + \log_5 125$$

Solución: 9

9. Calcula aplicando la propiedades de los logaritmos:

(a) (2 puntos)

$$\log 4 + \log 8 + 3\log 5 - 2\log 2$$

Solución: 1