C. B. Gazolla, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

A Voz da Vítima Silvestre: Perícia Criminal Ambiental em Caso de Morte Violenta de Fauna Silvestre no Extremo Sul da Bahia

C. B. Gazolla[a,*]

[a]*24ª CRPT – Porto Seguro ,Departamento de Polícia Técnica , Bahia (BA_)Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: camilla.gazolla@dpt.ba.gov.br. Tel.: +55-44-99801-4166.*

Palavras-chave:modelo; MS Word; ABC; Congresso Nacional de Criminalística; Máximo 5 palavras-chave.

1. INTRODUÇÃO

Crimes contra a fauna silvestre representam uma grave ameaça à biodiversidade global, com impactos ecológicos e sociais significativos. No Brasil, a ocorrência desses delitos é alarmante, especialmente em regiões de alta riqueza biológica como o Extremo Sul da Bahia [1]. A perícia criminal ambiental emerge como ferramenta indispensável para a elucidação desses casos, fornecendo subsídios técnicos que permitem diferenciar eventos naturais de ações antrópicas deliberadas, e assim, embasar a responsabilização legal dos infratores. Na área de criminalística ambiental, frequentemente ressaltam a complexidade da identificação de espécies e da determinação da causa mortis em animais silvestres, muitas vezes dependendo de técnicas de alto custo e complexidade, como o DNA *Barcoding,* que nem sempre estão disponíveis em todos os laboratórios periciais [2].

Contudo, a experiência prática demonstra que metodologias periciais robustas e acessíveis podem ser igualmente eficazes. A utilização criteriosa da literatura técnica especializada, aliada à caracterização morfológica macroscópica e ao estudo biogeográfico de distribuição das espécies, pode ser plenamente suficiente para a identificação taxonômica e a elucidação da dinâmica criminal. Tais abordagens, por seu menor custo e maior aplicabilidade em diferentes contextos, podem ser facilmente adotadas no dia a dia da perícia criminal ambiental, otimizando recursos e agilizando as investigações. Diante desse cenário, o presente trabalho teve como objetivo principal identificar as espécies de fauna silvestre envolvidas em um caso de morte violenta no Extremo Sul da Bahia, verificando, inclusive, se se tratavam de espécies em extinção, e determinar o nexo causal entre as lesões observadas e a ação humana, demonstrando a eficácia de uma abordagem pericial baseada em recursos disponíveis e conhecimento técnico aprofundado.

2. METODOLOGIA

A presente investigação pericial foi conduzida a partir da análise de três amostras biológicas correspondentes a carcaças de animais silvestres, apreendidas na localidade de Trancoso, Extremo Sul da Bahia. O objetivo central foi a identificação taxonômica das espécies envolvidas e a determinação do nexo causal entre as lesões observadas e a ação humana, com vistas à elucidação de um crime ambiental.

O exame pericial consistiu primariamente em uma análise macroscópica visual detalhada das amostras. Este procedimento incluiu a observação direta das características morfológicas externas e internas dos espécimes, utilizando-se de fotografias digitais para registro e documentação. As dimensões foram estimadas com o auxílio de escala métrica forense, e a análise foi realizada sob condições de iluminação por luz branca, visando otimizar a visualização dos detalhes. É importante ressaltar que, devido à indisponibilidade de técnicas de alto custo, como o sequenciamento de DNA (DNA *Barcoding*) ou análises microscópicas avançadas de tecidos, a metodologia foi adaptada para maximizar a eficácia dos recursos disponíveis.

A identificação taxonômica das espécies baseou-se em uma abordagem integrada que combinou a análise de caracteres morfológicos diagnósticos (e.g., fórmula dentária, padrão de dígitos, características da pelagem) com o estudo biogeográfico de distribuição das espécies. Para tanto, foram consultadas e confrontadas informações provenientes de literatura científica especializada e manuais de referência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Esta abordagem, embora de menor custo, demonstrou ser plenamente suficiente para a identificação precisa dos espécimes, incluindo a verificação de seu status de conservação, e pode ser facilmente replicada em contextos periciais com recursos limitados. A análise necroscópica das carcaças focou na avaliação das lesões e alterações *post-mortem*. A correlação entre os achados morfológicos e os padrões de lesão permitiu inferir a natureza da intervenção que levou à morte dos animais, estabelecendo o nexo causal com a ação humana deliberada.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise pericial das três amostras biológicas revelou os seguintes achados:

3.1. Amostra I: Caracterização macroscópica do Bicho-preguiça – Bradipus veriegatus

Animal de pequeno a médio porte, com aproximadamente 45 cm (quarenta e cinco), corpo recoberto por pelagem longa, densa, áspera, com coloração variando marrom-pálido ao marrom-amarelado, com manchas esbranquiçadas concentradas na parte dorsal próxima aos membros posteriores [3,4]. Cabeça: decapitação completa; possui crânio arredondado; rostro curto; cavidade oral ampla; dentição homodonte, ou seja, ausência de diferenciação típica entre incisivos, caninos e molares, sendo considerada uma "dentição simplificada", resultado de vestígios evolutivos, característica observada na subordem Xenarthra [5, 6, 7, 8, 9]. De acordo com o Manual de Avaliação de risco de extinção dos Xernatros Brasileiros – Série Estado de Conservação da Fauna Brasileira nº2, publicado, em 2015, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) [10] é possível, no caso indivíduos adultos, diferenciar se tal animal é macho ou fêmea, com base na presença de uma mancha dorsal interescapular ("espéculo"), caracterizada por uma área circunscrita com pelagem mais curta, composta por uma faixa mediana de coloração escura (preta) ladeada por bandas de coloração amarelada a alaranjada. Tal característica não foi observada, portanto, sugere-se fortemente tratar-se de indivíduo fêmea. Não foi possível tal confirmação com base na observação da região perineal/genital, bem como anatômica dos órgãos internos, visto que se observou ausência completa das estruturas anatômicas correspondentes à genitália externa, compatível com remoção por ação mecânica (arrancamento/seccionamento traumático). Membros torácicos anteriores: membros alongados com três dígitos bem definidos, presença de garras longas, curvas e robustas (falciformes) adaptadas à suspensão arbórea. Esse padrão morfológico é diagnóstico para o gênero *Bradypus*. Membros posteriores: estrutura robusta e mais curta em relação aos membros anteriores, presença de dígitos com garras curvas e adaptadas à sustentação e fixação em substrato arbóreo. Observações periciais relevantes: Presença de seccionamento completo de estruturas anatômicas (cabeça, membros e retiradas de vísceras) com padrão de corte provocado por ação realizada por instrumento cortante. Ausência de sinais típicos de predação animal (Fig. 1).



Figura 1: Peças encaminhadas para perícia, correspondendo a região anatômica da cabeça, extremidades de membros anteriores e posteriores, além do tegumento correspondente ao tronco do animal.

3.1.1 – Biogeografia do Bicho-preguiça na Bahia

De acordo com a classificação mais recente publicada pela Fundação Internacional de Conservação dos Bichos-preguiça [11], as espécies que possuem três dígitos são as seguintes (Fig. 2):




Figura 2: Esquema visual gerado por MANUS (2026) adaptado de "The Sloth Conservation Foundation" [11]. Disponível em: https://www.slothconservation.org/slothopedia

Com relação à distribuição geográfica, também publicada pela Fundação Internacional de Conservação dos Bichos-preguiça [11] e reforçado pelo Manual do ICMBio [10], na região da Bahia, duas espécies são indicadas para esta localidade (Fig. 3):



Figura 3: Mapa da Bahia com a distribuição geográfica das espécies de Bicho-preguiça presentes na região. Imagem gerada por MANUS (2026) adaptado de de "The Sloth Conservation Foundation" [11]. Disponível em: https://www.slothconservation.org/slothopedia

A preguiça-de-coleira habita apenas a Mata Atlântica, ou seja, é uma espécie endêmica, sendo encontrada em fragmentos florestais no estado da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Seu nome vem da mancha escura ao redor do pescoço, que lembra uma coleira, característica não observada no material encaminhado para perícia. Além dessa, outras características como comprimento de 50 a 70 cm e pelagem variando do marrom ao cinza a distinguem dos aspectos observados durante o processamento pericial. Portanto, considerando as características morfológicas observadas, bem como os aspectos biogeográficos, conclui-se tratar da espécie *Bradypus variegatus*, popularmente conhecida como preguiça comum.

3.1.2. Identificação taxonômica:

Reino: Animalia; Filo: Chordata; Classe: Mammalia; Superordem: Xenarthra; Ordem: Pilosa; Subordem: Folivora; Família: Bradypodidae; Gênero: *Bradypus*; Espécie: *Bradypus variegatus*. De acordo com o Processo de Avaliação do Risco de Extinção da Fauna Brasileira (ICMBio, 2024) da espécie *Bradypus variegatus* Schinz, 1825; esta se inclui na categoria MENOS PREOCUPANTE (LC) datada em 27/11/2018 e publicada em 2024 [12].

3.2. Amostra II: Caracterização macroscópica do crânio de Jacaré – Caiman latirostris

Tratava-se de segmento anatômico correspondente à cabeça de réptil da ordem Crocodylia (jacaré), apresentando-se em estado de conservação parcial, com ausência de tecidos moles em grande parte de sua extensão, pois estes encontravam-se tratados quimicamente e exposição de estruturas ósseas. Crânio: decapitação completa; possui comprimento estimado de 21,5 cm (vinte e um centímetros e meio) com conformação estrutural alongada e afilada (rostro longo) em formato triangular. Presença de fenestrações ósseas evidentes (órbitas e aberturas temporais), com ausência de conteúdo interno; Cavidades orbitais amplas, bilateralmente simétricas, com bordas irregulares decorrentes da perda de tecidos moles [13]. A peça encontrava-se com predomínio de tecido do tipo ósseo exposto; além disso, foram observados resquícios de tegumento ressecado em tonalidade escura, aderido principalmente à região anterior em decorrência do processo de taxidermia. Coloração predominantemente castanho-escura a enegrecida externamente, e amarelada a bege nas áreas ósseas expostas. Apresenta textura rugosa, compatível com placas dérmicas queratinizadas remanescentes. Região mandibular: a mandíbula encontrava-se articulada ao crânio, porém com evidente exposição óssea e perda dos tecidos moles adjacentes. Arcada dentária parcialmente preservada do tipo homodonte e polifiodonte, ou seja, todos com a mesma forma cônica e pontiaguda, além de capacidade de reposição contínua ao longo da vida. Além disso, os dentes são cônicos, de inserção tecodonte, distribuídos ao longo da maxila e mandíbula. Alguns elementos dentários encontravam-se ausentes, com alvéolos expostos e os remanescentes apresentavam coloração amarelada e desgaste superficial. Na cavidade oral, observou-se fórmula dentária de 18/18, sendo 18 dentes superiores e 18 inferiores (em cada lado) e ligeiramente separados um do outro, fixados em cavidades ósseas distintas. Tal característica consiste em formula dentária de *Caiman latirostris* (Brazaitis, 1973) [13]. Cavidades e estruturas internas: amplamente abertas, em decorrência da ausência de tecidos moles. Não havia evidência de massa encefálica preservada. Integridade estrutural e alterações: presença de uma fratura linear na extremidade anterior da mandíbula, característico de ação provocada por instrumento cortocontundente. Considerações morfológicas relevantes: a morfologia observada como rostro longo e estreito; Dentição cônica homogênea; Disposição das cavidades cranianas; é compatível com espécimes de jacaré, pertencente à família Alligatoridae. Não havia sinais de predação com base nas lesões apresentadas, mas sim de ação humana deliberada, com emprego de instrumento e intenção de segmentação do corpo, além de taxidermia para conservação da peça anatômica em questão (Fig. 4 e 5).



Figura 4: Peça encaminhada para perícia, correspondendo a região anatômica do crânio de um jacaré.




Figura 5: Formulação dentária com padrão 18

3.2.1. Biogrografia do Jacaré na Bahia

De acordo com o Manual de Crocodilianos da Região Nordeste do Brasil no território brasileiro [14], são reconhecidas seis espécies de jacarés. Dentre essas, três possuem registro de ocorrência na Região Nordeste: *Caiman crocodilus, Caiman latirostris e Paleosuchus palpebrosus.* A espécie *Caiman crocodilus* apresenta distribuição restrita à porção noroeste dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, havendo ainda registros potenciais para a região oeste do estado do Rio Grande do Norte [14]. Sendo assim, na Bahia, mais especificamente na região do extremo Sul, são observadas as espécies *Caiman latirostris*, que possui distribuição geográfica mais ampla, e *Paleosuchus palpebrosus* que possui menor abundância registrada na Região Nordeste (Fig. 6) [14].

Portanto, considerando as características morfológicas observadas, bem como os aspectos biogeográficos, conclui-se tratar da espécie Caiman latirostris, popularmente conhecida como jacaré de-papo-amarelo.

3.2.2. Identificação taxonômica

Reino: Animalia; Filo: Chordata; Classe: Reptilia; Ordem: Crocodylia; Família: Alligatoridae; Gênero: *Caiman*; Espécie: *Caiman latirostris* Atualmente, o jacaré-de-papo-amarelo (*Caiman latirostris*) não é considerado uma espécie em alto risco de extinção. De acordo com as avaliações do ICMBio e listas de fauna ameaçada, a espécie é classificada como "Menos Preocupante" (LC - Least Concern) [15].




Figura 6: Mapa da Bahia com a distribuição geográfica das espécies de jacarés presentes na região. Imagem gerada por MANUS (2026) com alterações autoral e adaptado do Manual de Crocodilianos da Região Nordeste do Brasil. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Paulo-Mascarenhas-Junior2/publication/353953898_Crocodilianos_da_regiao_nordeste_do_Brasil_Historico_status_e_es trategias_para_a_conservacao

3.3. Amostra III: Caracterização macroscópica do crânio de Macaco – Callithrix penicillata

Tratava-se de estrutura correspondente a um crânio de pequeno mamífero primata neotropical medindo aproximadamente 8,5cm (oito centímetros e meio). A parte óssea apresentava-se seca, com ausência de tecidos moles aderidos, apresentando coloração esbranquiçada a levemente amarelada, compatível com processo de tratamento pós-morte. Observa-se integridade estrutural preservada, sem sinais evidentes de carbonização ou putrefação ativa. Crânio: O crânio apresentava dimensões reduzidas, com conformação típica de primatas do gênero *Callithrix*, caracterizando-se por: Neurocrânio relativamente arredondado e de pequeno volume; Viscerocrânio proporcionalmente desenvolvido, com região facial projetada anteriormente (prognatismo moderado); Órbitas amplas, circulares e voltadas anteriormente, sem a presença de tecidos moles; Dentição: Presença de arcadas dentárias superior e inferior, com dentes preservados parcial ou totalmente; Dentição heterodonte e difiodonte, ou seja, com incisivos, caninos e molares diferenciados e duas gerações de dentes (decídua e permanente). Tais animais não apresentam dimorfismo sexual [16]. Foi observada a presença de um tufo preto na lateral esquerda do crânio, sendo esta ornamentação, uma característica marcante dos calitriquídeos [17]. Justamente a presença dos tufos pretos pré-auriculares lon-

gos e negros, em forma de pincel, é o que assegura-lhe o nome de sagui-de-tufo-preto e os diferenciam das demais espécies do gênero [18]. Observações periciais relevantes: Presença de seccionamento completo do crânio com padrão de corte provocado por ação realizada por instrumento cortante. Ausência de sinais típicos de predação animal (Fig. 7A e 7B).

3.3.1. Biogrografia dos Saguis na Bahia

De acordo com Raylands et al (2000) o gênero *Callithrix* apresenta seis espécies, sendo todas endêmicas no Brasil [19]. Dessas, quatro espécies são catalogadas, de acordo com a Lista de Mamíferos para o Estado da Bahia para a referida localidade, sendo elas: *C. geoffroyi* (sagui-da cara-branca), *C. jacchus* (sagüi-de-tufos-branco), *C. kuhlii* (sagui-de-wied) e *C. penicillata* (sagui-de tufo-preto) [20]. Portanto, considerando as características morfológicas observadas, bem como os aspectos biogeográficos, conclui-se tratar da espécie *Callithrix penicillata*, popularmente conhecida como Sagui-de-tufo-preto (Fig. 8).



Figura 7: A - Peça encaminhada para perícia, correspondendo a região anatômica do crânio de um macaco. B – seta em vermelho indicando o "tufo preto" característico da espécie em questão.




Figura 8: Mapa da Bahia com a distribuição geográfica das espécies de saguis *Callithrix* presentes na região. Imagem gerada por MANUS (2026) e adaptada de Nicolaevsky et al (2011).

3.3.2. Identificação taxonômica

Reino: Animalia; Filo: Chordata; Classe: Mammalia; Ordem: Primate o Família: Cebidae; Subfamília: Callitrichinae; Gênero: *Callithrix*; Espécie: *Callithrix penicillata*. Atualmente, a espécie *Callithrix penicillata* (sagui-de-tufos-pretos) não é considerada ameaçada de extinção. Na verdade, ela é classificada como "Menos Preocupante" (LC - Least Concern) na Lista Vermelha de espécies ameaçadas [21].

4. CONCLUSÕES

A identificação taxonômica precisa, crucial para o enquadramento legal, foi alcançada por meio de uma metodologia robusta pautada na análise aprofundada de artigos científicos que caracterizam as espécies, bem como no emprego de estudos biogeográficos detalhados para a delimitação da ocorrência a nível de espécie. Esta abordagem pericial demonstra-se de extrema importância não apenas pela sua capacidade de conduzir à identificação inequívoca da espécie desejada, mas também por sua eficiência e viabilidade econômica, otimizando recursos e tempo na investigação de crimes contra a fauna. A integração de dados bibliográficos e biogeográficos permite uma inferência segura sobre a origem e a identidade dos espécimes, mesmo na ausência de material genético ou tecidos moles em estado ideal de conservação.

Portanto, foram identificados espécimes pertencentes a três espécies distintas da fauna silvestre brasileira: *Bradypus variegatus* (preguiça-comum), *Caiman latirostris* (jacaré-de-papo-amarelo) e *Callithrix penicillata* (sagui-de-tufo-preto). Todas as espécies possuem ocorrência registrada para a região do extremo sul da Bahia, reforçando a origem local dos vestígios. Os vestígios periciais apresentam um padrão de lesividade comum, caracterizado por decapitação completa, seccionamento de tecidos moles e desarticulação de estruturas osteoarticulares. A regularidade das bordas das lesões e a precisão dos pontos de corte (especialmente em articulações) são tecnicamente incompatíveis com processos de predação por animais silvestres ou decomposição natural. Tais achados evidenciam o emprego de instrumentos cortantes e/ou cortocontundentes manejados por ação humana deliberada. Observou-se ainda que os espécimes foram submetidos a processos de taxidermia e tratamento químico, visando a conservação artificial das estruturas cranianas e tegumentares.

Na Amostra I (*B. variegatus*), o esquartejamento e a evisceração completa indicam uma manipulação sistemática da carcaça.

A conduta observada que inclui a morte, a mutilação e a utilização indevida de espécimes da fauna silvestre, encontra-se em estrita consonância com as infrações penais tipificadas na Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), especificamente nos seguintes dispositivos: Art. 29: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente e; Art. 32: Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Conclui-se, portanto, que os achados periciais estabelecem nexo causal direto entre a intervenção humana e a morte violenta dos animais.

AGRADECIMENTOS

A Perita Criminal Dra Camilla Borges Gazolla gostaria de agradecer o apoio na identificação taxonômica em nível de espécie dos Biólogos Ms Juliana Vallim Gaiotto (CRBIO 108799), Dr Patrik Ferreira Viana (Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia – INPA) e Dr Gabriel Magezi, mastozoologista, que colaboraram com o apoio técnico ao referido laudo pericial, bem como à Revista Brasileira de Criminalística e à ASBAC – Sindicato dos Peritos Criminais da Bahia pelo apoio concedido.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] B. R. Martins; M. B. D. C.da Silva; G. Narezi; V.A. Becegato. Crimes ambientais no Parque Nacional do Pau Brasil e na sua zona de amortecimento no período de 2011 a 2021. *Rev. Geo e Ambiente* **v. 46** (2023).

[2] R.H. Alves; C.B.V. de Carvalho. Estudos forenses sobre DNA Barcoding no Brasil. Braz. J. *Forensic Sci. Med. Law Bioeth.* 12**(v.4)**: 303-326 (2025).

[3] L.H. Emmons. Neotropical rainforest mammals. a field guide. *University of Chicago Press.* 281p (1990).

[4] J.F. Eisenberg & K.H. Redford. Mammals of the Neotropics: the Central Neotropics. Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. Vol. 3. *University of Chicago Press.* 609p (1999).

[5] R.M. Wetzel. The identification and distribution of recent Xenarthra (=Edentata). Pp. 5-21. In: Montgomery, G.G. (ed.). The evolution and ecology of armadillos, sloths, and vermilinguas. *Smithsonian Institution Press* (1985).

[6] F. Miranda & A.M. Costa. Xenarthra (tamanduá, tatu, preguiça). Pp. 402-414. In: Cubas, Z.S.; Silva, J.C.R. & Catão-Dias, J.L. (eds.). *Tratado de animais selvagens – medicina veterinária.* 1354p (2006).

[7] J.A.F. Silva. Mamíferos terrestres de médio e grande porte dos estados da Paraíba, Pernambuco e Ceará. *Dissertação* (Mestrado em Ciências Biológicas-Zoologia). Universidade Federal da Paraíba. 212p. (2012).

[8] L. Hautier, H. Gomes Rodrigues, G. Billet, et al. The hidden teeth of sloths: evolutionary vestiges and the development of a simplified dentition. *Sci Rep* **v.6,** 27763 (2016). https://doi.org/10.1038/srep27763

[9] F. C. Santos, P. V. Albuquerque, F. C. A. Aguiar Júnior, G. P. Andrade, A. G. Ribeiro, J. C. S. Nascimento, J. Evêncio Neto, M. F. L, Freitas. Morphological analysis of the sloth tongue: Bradypus variegatus (Schinz, 1825). *Acta Veterinaria Brasilica* 18(**v.3**), (2024). https://doi.org/10.21708/avb.2024.18.3.12499

[10] *Manual de Avaliação de risco de extinção dos Xernatros Brasileiros* – Série Estado de Conservação da Fauna Brasileira nº2, publicado, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) (2015).

[11] *Sloth Conservation Foundation. Slothopedia*. Disponível em: https://www.slothconservation.org/slothopedia. (2025).

[12] P.M. Santos,; M.L. Reis; N. Moraes-Barros; G.A.A. Xavier. *Bradypus variegatus.* Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade - *SALVE* - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br. (2024). DOI: https://doi.org/10.37002/salve.ficha.22380.2.

[13] P. Brazaitis. The identification of living crocodiles. *Zoologica*, **v. 58,** n.1-4: 59-101 (1973).

[14] J. M. S. Correia; E. M. Santos; P. B. Mascarenhas; R. S. L. Barboza. Crocodilianos da Região Nordeste do Brasil: Histórico, status e estratégias para conservação. In: BARRETO-LIMA, André Felipe; SANTOS, Marcelo Renan de Deus; NÓBREGA, Yhuri Cardoso (Org.). *Tratado de Crocodilianos do Brasil.* 1. ed. Vitória, ES: Instituto Marcos Daniel, p. 498-544 (2021).

[15] M. E. Coutinho; B. Marioni; I. P. Farias et al. Avaliação do risco de extinção do jacaré-de-papo-amarelo *Caiman latirostris* (Daudin, 1802) no Brasil. In *Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade - SALVE*. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Disponível em: https://bdc.icmbio.gov.br/items/6aded43f-55cd-4033-aa86-ef977ba85def (2013).

[16] M. F. Stevenson; A. B. Rylands. The marmosets, genus Callithrix. In: Mittermeier, R. A.; Rylands, A. B.; Coimbra-Filho, A.; Fonseca, G. A. B. Ecology and

behavior of neotropical primates. *World Wildlife Foundation*, (1988). **v. 2**, p. 131–222.

[17] Verona, C. E. S.; Pissinatti, A. Primates – Primatas do Novo Mundo (Sagui, Macaco-prego, Macaco-aranha, Bugio). In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. *Tratado de animais selvagens: medicina veterinária*. (2006). p. 358–377.

[18] P. Auricchio. Primatas do Brasil. São Paulo*: Terra Brasilis*, (1995). 168 p.

[19] A. B. Rylands; H. Scheneider; A. Langguth et al. An assessment of the diversity of New World Primates. *Neotropical Primates*, Arlington, **v. 8**, n. 2, p. 61-93. (2000)

[20] C. R. Cassano; J. M. Almeida-Rocha; M. R. Alvarez; *et al.* Primeira avaliação do status de conservação dos mamíferos do estado da Bahia, Brasil. *Oecologia Australis*, Rio de Janeiro, **v. 21**, n. 2, p. 156–170, (2017). DOI: 10.4257/oeco.2017.2102.06.

[21] J. Rimoli; G. V. Bianconi; M. F. L. de Oliveira; et al. Lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção da fauna do estado da Bahia: mamíferos. *Salvador: Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia,* (2015).