M. L. Pellizzari, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Pets que comem cadáveres: relatos de casos na perícia do RS e comparativo com outros animais

M. L. Pellizzari[a,*]

[a]*Departamento de Criminalística, Instituto-Geral de Perícias, Porto Alegre (RS), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: mariana-pellizzari@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-98448-7307.*

Palavras-chave: Cadáveres, lesões postmortem, necrofagia, pets

1.INTRODUÇÃO

A interação entre animais domésticos (*pets*) e cadáveres humanos é um fenômeno que ocorre com certa frequência em contextos forenses, especialmente em locais fechados onde há presença de cães e gatos. A atividade de necrofagia (necro "morto" + fagia "comer") pode provocar alterações significativas no cadáver, interferindo diretamente no exame pericial.

A atuação desses animais modifica tecidos, desloca partes do corpo e produz lesões que podem mimetizar traumas ante e *perimortem*, dificultando a elaboração das hipóteses de dinâmica do local, a determinação de origem de lesões, da causa da morte e do intervalo pós-morte. Sendo assim, compreender os padrões de necrofagia de cães e gatos é essencial para evitar interpretações equivocadas durante o atendimento de local de morte.

Este trabalho tem como objetivo relatar casos atendidos no RS e analisar a ação necrófaga de animais domésticos sobre cadáveres humanos, destacando suas características, impactos na perícia e a importância de uma correta análise nos casos atendidos.

2. NECROFAGIA REALIZADA POR CÃES E GATOS

As referências analisadas [1-4] demonstram que tanto cães quanto gatos podem interagir com cadáveres humanos, porém com padrões distintos de comportamento e dano.

Os gatos tendem a apresentar uma atuação mais seletiva, consumindo principalmente tecidos moles, como pele, gordura e músculos. Em geral, as regiões de preferência são a face, pescoço e extremidades superiores. A destruição óssea é rara, acontecendo apenas de forma secundária. Todavia, em situações com grande número de animais, a extensão dos danos pode ser significativamente ampliada, incluindo a remoção de órgãos internos e exposição de cavidades corporais.

Já os cães apresentam comportamento mais agressivo e destrutivo. São capazes de remover grandes quantidades de tecido, provocar lacerações extensas e até mesmo fraturas e amputações. Regiões como cabeça, pescoço e membros (superiores e inferiores) são frequentemente afetadas. Em casos extremos, há relatos de decapitação pós-morte, demonstrando a intensidade da ação desses animais.

Um aspecto digno de nota é que essa atividade necrófaga não está necessariamente relacionada à fome. Estudos indicam que cães podem iniciar o contato com o cadáver por comportamento exploratório ou tentativa de reanimar o tutor, evoluindo posteriormente para mordeduras e consumo de tecidos.

A atuação necrófaga de animais domésticos representa um desafio significativo para a perícia, pois as lesões produzidas podem ser confundidas com traumas causados por terceiros. Além disso, a remoção de tecidos e órgãos pode inviabilizar a identificação da causa da morte, especialmente quando estruturas essenciais são destruídas.

Outro fator importante é a possibilidade de alteração do intervalo *postmortem*. A remoção de tecidos pode acelerar o processo de decomposição, enquanto a ingestão de larvas e insetos pelos *pets* pode retardar certos processos, comprometendo assim os métodos tradicionais de cronotanatognose.

3. RELATO DE CASOS

Passamos aos relatos de alguns casos atendidos em locais de morte no Rio Grande do Sul.

3.1. Casos com cães

A seguir, exposição de quatro casos de necrofagia em local de morte realizada por cães, onde se observam nos cadáveres lesões de bordos irregulares, com perda de substância (nariz e lábios) e exposição de tecidos subcutâneos, ausência de partes anatômicas (como dedos e membros) e decapitação. As quatro mortes eram suspeitas de causas naturais. Os ferimentos observados não apresentavam reações vitais, tais como equimoses no entorno nem extravasamento expressivo de sangue, sugerindo compatibilidade com ferimentos realizados *postmortem*.

Nos casos 1 e 2, Fig. 1 a Fig. 3, o intervalo entre o último contato com a pessoa ainda viva e o encontro do cadáver não passava de 12 horas, e ainda, havia ração disponível para os animais. No caso 3, Fig. 4 e Fig. 5, a vítima era acumuladora de animais, havia mais de 20 cães presos no interior da residência com o cadáver. Houve decapitação e abertura da cavidade abdominal, por onde consumiram todo o trato gastrointestinal. No caso 4, a vítima demorou dias até ser encontrada, o cachorro consumiu as pernas e pés do cadáver, Fig. 6, que estavam pendentes para fora da cama.



Figura 1. Caso 1 – consumo de tecidos moles da face.



Figura 2. Caso 1 – ausência de dedos.



Figura 3. Caso 2 – consumo de tecidos moles da face.



Figura 4. Caso 3 – pescoço do cadáver decapitado.



Figura 5. Caso 3 – cães junto à parte do crânio.



Figura 6. Caso 4 – ossos da perna à mostra.

3.2. Caso com gato

O caso 5, Fig. 7 a Fig. 9, apresentado a seguir, de necrofagia em local de morte foi realizada por um gato. Observam-se no cadáver lesões de bordos irregulares, com perda de substância (nariz e lábios) e exposição de tecido subcutâneo. Trava-se de um homicídio onde houve estrangulamento e ação contusa de objeto sobre a cabeça, a isso se deve a aparência mais sanguinolenta das lesões.




Figura 7. Caso 5 – consumo de tecidos moles da face.



Figura 8. Caso 5 – detalhe da borda da lesão.



Figura 9. Caso 5 – pegadas das patas do gato moldadas em sangue.

3.3 Casos com outros animais

Para fins de comparação, os casos 6 e 7, Fig. 10 e Fig. 11, apresentam lesões por mordeduras de roedores, sendo as mortes nesses dois casos suspeitas de causas naturais, e o caso 8, Fig. 12, homicídio, apresenta lesões de mordeduras por formigas.



Figura 10. Caso 6 – mordeduras por roedores.



Figura 11. Caso 7 – mordeduras por roedores.



Figura 12. Caso 8 – mordeduras por formigas.

4. CONCLUSÕES

A atividade necrófaga de animais domésticos em cadáveres humanos possui grande relevância na prática forense, podendo alterar significativamente o local da morte e dificultar a interpretação dos vestígios.

Cães e gatos apresentam padrões distintos de atuação, sendo os cães geralmente responsáveis por danos mais extensos e destrutivos dos tecidos, enquanto os gatos tendem a produzir danos mais superficiais.

Foi observado nos atendimentos que os *pets* atuaram em áreas do corpo que estavam expostas (descobertas), evitando áreas cobertas por roupas, o que diferencia de casos de ataques/predação, onde comumente se vê ações em que as roupas são rasgadas pelas mordidas.

A correta identificação dessas alterações é essencial para diferenciação entre lesões ante e *postmortem* e para evitar erros na determinação da causa da morte.

Dessa forma, o conhecimento dos padrões de necrofagia desses animais é fundamental para a precisão das perícias criminais em atendimentos de locais de morte assim como posteriormente nas necropsias.

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos colegas Leandro Corrêa de Moura, Luciana Farias Pereira e Rafael Nepomuceno Campos por compartilhar os registros de seus atendimentos em locais de morte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C. Buschmann; B. Solarino; K. Püschel; F. Czubaiko; S. Heinze; M. Tsokos. Post-mortem decapitation by domestic dogs: three case reports and review of the literature. *Forensic Science, Medicine and Pathology* **7:** 344-349 (2011).

[2] L. Indra; C. Schyma; S. Lösch. Cat and dog scavenging at indoor forensic scenes: strategies for documentation and detection. *Forensic Science, Medicine and Pathology* **20:** 1022-1032 (2024).

[3] R.W. Byard. Domestic dogs (Canis lupus familiaris) and forensic practice. *Forensic Science, Medicine and Pathology* **12**: 241-242 (2016).

[4] R.W. Byard. Postmortem predation by a clowder of domestic cats. *Forensic Science, Medicine and Pathology* **17:** 144-147 (2021).