2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

# Levantamento de fauna periciada no Distrito Federal entre 2009 e 2025

J. J. Y. A. Sato[a,b,*], M. A. Berçot[b], P. H. C. Naves[b], A. M. Trein[b], L. P. A. Deus[b], A. E. Maia[b], D. B. Luz[b], Y. N. G. Fonseca[b], F. P. Rodrigues[a], G. C. Dalton[b, *]

[a]*Universidade de Brasília, Brasil*

[b]*Instituto de Criminalística, Polícia Civil do Distrito Federal, Brasil*

[*]*Endereço de e-mail para correspondência: cgdalton2010@gmail.com Tel.: +55-61-98175-3216 / yurikajuliane@@gmail.com Tel.: +55-61-98287-6499.*

*Palavras-chave: fauna; tráfico de animais silvestres; maus-tratos; perícia.*

## 1. INTRODUÇÃO

O tráfico de animais é caracterizado como crime pela legislação brasileira, representando uma grande ameaça à biodiversidade nacional, entretanto, estima-se que 38 milhões de animais são traficados anualmente no país [1]. A RENCTAS (Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres) classifica o Distrito Federal como localidade de venda de animais silvestres [2], indicando a existência de um mercado consolidado na capital do país.

Nos casos de animais domésticos, evidencia-se a legislação acerca principalmente de maus-tratos, como abandono, agressão, situação precária de higiene, indisponibilidade de abrigo, alimentação e água, esforços excessivos, rinhas, entre outros.

Diante disso, destaca-se a importância de analisar a fauna recebida para perícia, a fim de compreender a dinâmica do tráfico e padrões de maus-tratos, afim de subsidiar melhores políticas públicas de combate. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou o levantamento de dados entre 2009 e 2025 sobre a fauna no Distrito Federal objeto de perícia na Seção de Crimes Contra o Meio Ambiente do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal.

## 2. MATERIAIS E MÉTODOS

Foram analisados laudos periciais elaborados entre 2009 e 2025 pela Seção de Crimes Contra o Meio Ambiente (SCMA) do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal (IC/PCDF), com o objetivo de levantar dados sobre crimes contra a fauna, identificar espécies mais recorrentes e caracterizar artefatos associados às ocorrências. Os dados foram armazenados e avaliados em planilha eletrônica (Excel), a fauna foi organizada em grupos de invertebrados, peixes, répteis, aves e mamíferos. Os espécimes foram classificados em nativos e exóticos, e com relação a ameaça de extinção, com dados do SALVE (Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade) quando nativo, e da IUCN (The International Union for Conservation of Nature) quando exótico.

## 3. RESULTADOS

Foram analisados 1815 laudos entre 2009 e 2025 (Fig. 1), destes, 1249 (68,82%) caracterizavam aves, 251 (13,83%) mamíferos, 102 (5,62%) peixes, 76 (4,19%) répteis e 2 (0,11%) invertebrados, somando 18.036 indivíduos, excluídos os invertebrados que tiveram sua contabilização realizada em quilos (Fig. 2).





**Figura 1.** Quantidade de laudos acerca da perícia de aves, mamíferos, répteis, peixes e invertebrados.





**Figura 2.** Proporção de indivíduos em cada grupo faunístico.

### *3.1 Invertebrados*

Os invertebrados aparecem somente em 2024 e 2025, com um laudo em cada ano, em ambos se tratavam da família Palaemonidae, uma família de camarões. Não foi possível a determinação de gênero ou espécie. Os camarões foram quantificados em quilos, somando 4,75 kg.

### *3.2 Peixes*

Os peixes totalizam 4250 indivíduos, divididos em 32 famílias e representando 23,14% dos animais, não sendo possível a identificação de 9 espécimes. A família mais representativa foi Cichlidae, com 1795 indivíduos, seguida de Characidae (562 indivíduos) e Prochilodontidae (531 indivíduos). Das 98 espécies identificadas, 9 se tratavam de espécies exóticas, representando 1262 indivíduos (29,69%). A espécie mais abundante foi *Oreochromis niloticus* (tilápia-do-nilo), com 890 indivíduos, seguido de *Piaractus mesopotamicus* (pacu-caranha), com 325 indivíduos e *Cichla ocellaris* (tucunaré) com 241 indivíduos. Destaca-se que 1.645 indivíduos foram identificados somente à nível de gênero, e 69 apenas à nível de família.

Somente uma espécie está ameaçada de extinção, o Pintado *(Pseudoplatystoma corruscans)*, categorizada como vulnerável, com 8 indivíduos.

### *3.3 Répteis*

Os répteis aparecem em 76 laudos e somam 163 indivíduos, representando somente 0,90% dos animais. Possuem representantes em todas as ordens da classe Reptilia, a exceção de Rhynchocephalia. Testudine apresentou 70 indivíduos divididos em oito espécies, Squamata com 69 indivíduos divididos em 12 espécies e Crocodylia com 19 indivíduos divididos em três espécies. Agrupadas, as serpentes representam a subordem mais representativa, com 53 indivíduos. Dentre os exames de crocodilianos, todos envolviam animais abatidos, na forma de couro ou artefatos.

Dentre os espécimes, cinco não foram identificados e 11 só permitiram identificação à nível de ordem. O gênero *Chelonoidis sp.* é o único representante com espécies ameaçadas de extinção, a *C. carbonaria* (Jabuti-piranga), classificada como Vulnerável, e *C. denticulatus* (Jabuti-tinga), classificada como em perigo.

### *3.4. Aves*

Aves representam 63,36% dos animais, somando 11.428 indivíduos, distribuídos em 1.250 laudos (68,87%). Apresentando 116 espécies, destas, 14 são exóticas (107 indivíduos, representando 0,94% das aves). Apresentam quatro espécies classificadas como vulneráveis à extinção (*Sporophila falcirostris*, *S. frontalis*, *S. melanogaster* e *Carduelis yarrellii*), somando 205 indivíduos, e uma criticamente em perigo, *Sporophila maximiliani*, com 42 indivíduos. Apenas 13 indivíduos não foram identificados, e 47 eram híbridos. Dentre os híbridos, 45 se tratavam do pintagol, híbrido de pintassilgo (*Spinus magellanicus*) com canário (*Serinus canaria*).

Dos 68 gêneros, o com maior quantidade de espécies foi Sporophila (20), seguido de Turdus (6), Amazona (5) e Icterus e Euphonia (ambos com 4 espécies). Sicalis com somente duas espécies apresentou mais indivíduos (5.581), destes 5.535 eram *S. flaveola*, tendo uma ocorrência com 1.800 indivíduos. A espécie representa 48,43% das aves e 30,69% de todos os animais, e apareceu em 343 laudos periciais (27,46% de todos os laudos e 18,9% entre os laudos de aves), com uma média de 16,25 canários por laudo.

As espécies de *Sporophila* somam 2.138 aves, sendo as mais comuns *S. nigricollis*, com 933 *indivíduos S. angolensis*, com 289 indivíduos e *S. caerulescens*,

com 281 indivíduos. As espécies *Amazona aestiva*, *Sporophila caerulescens*, *S. nigricollis* e *Sicalis flaveola* aparecem em todos os anos analisados.

### *3.5 Mamíferos*

Foram periciados 2.193 espécimes de mamíferos, com 163 representantes silvestres, 191 animais de criação e 1.812 animais de companhia. Não foi possível a identificação de 78 indivíduos, sendo que 51 provavelmente se tratavam de animais de companhia.

Dentre o grupo, cinco indivíduos de quatro espécies diferentes (*Blastocerus dichotomus*, *Tayassu pecari*, *Myrmecophaga tridactyla* e *Saguinus niger*) são classificados como vulneráveis à extinção.

Agrupando as espécies de tatu, foram contabilizados 67 espécimes, e apenas três foram periciados vivos, todos da espécie *Euphractus sexcinctus*. A espécie mais presente foi *Dasypus novemcinctus,* com 35 indivíduos.

Dentre as carcaças, foram encontradas 171, sendo as mais expressivas as de *D. novemcinctus*, com 35 indivíduos, 22 não identificadas, 17 de *Cuniculus paca*, 14 de *Canis lupus* e 13 de *E. sexcinctus*.

A grande maioria dos mamíferos silvestres abatidos examinados se emquadram na motivação de consumo humano, podendo ser próprio ou para comercialização ilegal de carne.

#### *3.5.1 Cães e gatos*

Os cães e gatos aparecem expressivamente a partir de 2017 e 2018 respectivamente, conforme Fig. 3, totalizando 1207 cães e 451 gatos. Dentre os cães, 883 eram sem raça definida, um percentual de 41,26% dos cães. As raças Lhasa Apso e Shitzu aparecem com 52 indivíduos cada, e Yorkshire Terrier com 51, majoritariamente associados com situações de cativeiro para reprodução e venda de filhotes.





**Figura 3.** Quantidade de indivíduos de cães e gatos periciados entre os anos 2009 e 2025 na Seção de Crimes Contra o Meio Ambiente.

### *3.6 Artefatos*

Os artefatos configuram objetos relacionados à crimes contra à fauna. Foram periciados 1.838 artefatos, agrupados por sua utilização como artefatos de pesca, rinha, artesanato, medicamento e para aves cativas.

Os artefatos para aves cativas, incluindo gaiolas, caixas de madeira, caixa de transporte, alçapão e anilha, somaram 755 objetos, representando 41,1% dos artefatos. O segundo grupo mais predominante foram objetos de pesca, com 524 artefatos, incluindo rede de pesca, rede de emalhar, tarrafa, vara de pesca, armadilha tipo covo, vara de pesca, anzol, linha de pesca, rede de arrasto, molinete, isca artificial, boia, flutuador, fieira e caixa térmica. Já os artefatos relacionados à rinha de aves, como anilha de asa, biqueira e botoqueira, espora plástica, fragmento de espora e bucha somaram 372 artefatos.

Também foram encontrados artefatos relacionados a crimes ambientais, como faca, facão, arbalete, estilingue e serra, somando 27 objetos, medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, antiparasitários e analgésicos (Chemitril, Cor-trat, Tyladen, Metronidazol e Dipirona), somando 23 objetos e 121 artefatos de artesanato, com acessórios utilizando partes animais, como colares, pulseiras e brincos.

## 4. DISCUSSÃO

Os resultados revelam um perfil de tráfico de fauna majoritariamente composto por aves, com maior prevalência dos passeriformes, dados que corroboram com resultados da literatura [3]. *Sicalis flaveola* (canário-da-terra-verdadeiro) foi a ave mais apreendida, dado semelhante aos registrados pelo IBAMA e instituições parceiras entre 2005 e 2009 [4]. Apesar da situação crítica de tráfico, a espécie não é considerada ameaçada de extinção, e tem sua população considerada estável [5,6].

A segunda espécie de maior frequência no levantamento foi o cão doméstico (*Canis lupus familiaris*), com 1.211 indivíduos, representando 6,71% dos animais apreendidos. A maioria se tratava de cães sem raça definida, associados principalmente a situações de acumulação. Os registros de cães aparecem a partir de 2017 e apresentam um aumento de casos em 2020, mesmo ano que a Lei nº 14.064/2020 (Lei Sansão) foi sancionada, que elevou as penas para crimes de maus-tratos contra cães e gatos na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998).

A presença de animais exóticos representa muitas vezes riscos à fauna nativa e para a saúde

pública [7]. O grupo com maior quantidade de indivíduos exóticos foram os peixes, com 1.262 indivíduos. A tilápia-do-nilo (*Oreochromis niloticus*) é a maior representante, com 890 indivíduos. Essa espécie foi introduzida nos ecossistemas aquáticos brasileiros para fins de pesca e psicultura, mas autores já apontam problemas ecológicos relacionados à sua presença [8]. No Distrito Federal a tilápia-do-nilo apresenta ocorrência em todas as três regiões hidrográficas [9, 10, 11]

De acordo com a IUCN, os animais considerados como ameaçados de extinção são os classificados como vulnerável (VU), em perigo (EN) e criticamente em perigo (CR). Foram contabilizados 164 espécimes ameaçados, destes 73,78% eram aves. Os répteis foram o grupo com maior proporção de animais ameaçados de extinção, com 7,97% dos indivíduos ameaçados. No grupo dos mamíferos, houve uma maior proporção de espécies ameaçadas de extinção, com 19% classificados como vulneráveis.

Entre os mamíferos silvestres, o tatu foi o mais frequente, com ocorrências majoritariamente em carcaças. Esses animais são alvo de caça para consumo da carne e também pela sua carapaça, que pode servir de matéria-prima para artesanato ou fins medicinais, podendo apresentar riscos de zoonoses [12]. Já entre os répteis houve uma prevalência de serpentes, animais que ao longo dos últimos anos passaram a se tornar animais de companhia mais populares [13].

A quantidade de artefatos por cada grupo, são proporcionais aos números encontrados dos respectivos grupos de animais alvo dos objetos. Os achados de medicamentos anti-inflamatórios e antibióticos condizem com outros achados acerca do uso em rinhas de galo [14]

## 5. CONCLUSÕES

Os dados analisados mostram um padrão demonstrado em outros estudos sobre tráfico de animais, com predominância de aves, especialmente do canário-da-terra-verdadeiro, que, apesar disso, não é considerada em risco de extinção. A expressiva aparição de cães domésticos, sobretudo em 2020, pode refletir o impacto da Lei Sansão nas denúncias e fiscalização de maus-tratos. A alta presença de espécies exóticas de peixes pode corroborar com o alerta de riscos ecológicos associados.

Embora as aves apresentem o maior número de indivíduos ameaçados, os répteis apresentam uma proporção relativa maior quando comparados dentro do grupo. Os achados de tatus predominante em carcaça, estão associados ao consumo, artesanato e fins medicinais atribuídos ao animal, e podem representar riscos de saúde pública por zoonoses. O maior número de serpentes entre os répteis pode representar o aumento da popularidade do animal como pet não convencional. Por fim, a apreensão de medicamentos pode ser associada ao número de ocorrências envolvendo rinhas de galo.

Diante do exposto, conclui-se, portanto, que os crimes contra fauna na região do Distrito Federal são multifacetados. Recomenda-se o fortalecimento de políticas públicas direcionadas à educação ambiental, combate de rinhas e acumulação de animais, assim como o monitoramento contínuo de espécies exóticas e ameaçadas, a fim de melhorar ações de conservação da biodiversidade.

## AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à direção do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal por proporcionar as condições necessárias para que esse estudo acontecesse.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] RENCTAS – Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. 1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre. 2001

[2] RENCTAS – Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres. Principais Rotas Terrestres Utilizadas para o Tráfico de Animais Silvestres: Região Centro-Oeste.

[3] F. J. V. Costa *et al*. Espécies de Aves Traficadas no Brasil: Uma Meta-Análise com Ênfase nas Espécies Ameaçadas. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science* **7**: 324-346 (2018).

[4] G. F. G. Destro *et al*. Efforts to Combat Wild Animals Trafficking in Brazil. *Biodiversity* **20**: 421-435 (2012).

[5] L. F. Silveira *et al. Sicalis flaveola*. *Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio*. Retirado em 21/05/2026, de https://salve.icmbio.gov.br/

[6] BirdLife International. *Sicalis flaveola*. *The IUCN Red List of Threatened Species*. Retirado em 21/05/2026, de https://www.iucnredlist.org/species/22723346/132162254

[7] N. M. S. Andrade *et al.* Impactos da Introdução de Fauna Exótica Invasora no Brasil: Foco nos vetores

de doenças e suas consequências para a saúde pública. *PhD Scientific Review* **5**:38-57 (2025).

[8] J. L. Attayde *et al.* Impactos da Introdução da Tilápia do Nilo, *Oreochromis niloticus*, sobre a Estrutura Trófica dos Ecossistemas Aquáticos do Bioma Caatinga. *Oecol. Bras.* **11**: 450-461 (2007).

[9] MMA – Ministério do Meio Ambiente; ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Planalto Central – Brasília. 2015

[10] J. M. Barbosa; E. C. Soares. Perfil da icitiofauna da bacia do Rio São Francisco: Estudo preliminar. *Rev. Bras. Enga. Pesca* **4**:155-170 (2009).

[11] S. C. S. da Luz; H. C. Lima; W. Severi. Composição da ictiofauna em abientes marginais e tributários do médio-submédio rio São Francisco. *Rev. Bras. Ciênc. Agrár.* **7**:358-366 (2012).

[12] I. M. Ferreira; P. F. Salla; S. M. Pacheco. Hunting, handling and consumption of tatu (mammalia: cingulata) and the risk of zoonoses. *Brazilian Journal of Development* **7:**71236-71241 (2021).

[13] T. O. Lima *et al.* Manejo reprodutivo de jiboias e outros boídeos criados em cativeiro. *Anais do XXIII Congresso Brasileiro de Reprodução Animal*. 276-283 (2019).

[14] V. E. Dallabrida *et al.* Relato de caso: a Medicina Veterinária Forense na identificação de maus tratos em galos (*Gallus gallus domesticus*) utilizados com a finalidade de rinha. *Revista Brasileira de Criminalística* **12**: 47-53 (2023).