

**TREINO DISCRIMINATIVO: COMPARAÇÃO ENTRE
PROCEDIMENTOS QUE REQUEREM OU NÃO EXTINÇÃO DAS
RESPOSTAS DIANTE DO S^Δ.**

Verônica B. Haydu, Ana Paula Tanno,
Débora M. de Sousa, Ingrid Caroline de O. Ausec, Márcia Maria P.
Maggio, Sara Maria de Melo, Sueleni Zambotti e Dione de Rezende.
Depto. de Psicol. Geral e Anál. do Comportamento, UEL, Londrina, PR.

A aquisição da discriminação de estímulos foi investigada usando-se três caixas de Skinner modelo FUNBEC em três diferentes condições de treino. A resposta de pressão à barra de três ratos albinos, adultos, privados de água por 24 horas foi modelada na presença de um estímulo luminoso de intensidade 1, em seguida os sujeitos foram submetidos a um dos seguintes procedimentos: 1) luz (SD) era apresentada em períodos de duração variada e a resposta era reforçada em um esquema de reforçamento VI 15 seg. Os períodos de luz foram intercalados por períodos sem luz (S^Δ) com duração de um minuto (procedimento denominado de discriminação com erro e introdução inicial dos estímulos); 2) os estímulos discriminativos foram introduzidos após duas sessões em Crf, o SD tinha duração variada e o S^Δ durou de 1 min (procedimento denominado de discriminação com erro com introdução tardia de estímulo); 3) após as sessões de modelagem na presença da luz o esquema de VI 15 seg foi introduzido juntamente com o S^Δ. A duração inicial de S^Δ foi de 6 seg e foi aumentando gradualmente à cada três seg no decorrer da sessão até chegar a 1 min de duração. A intensidade de luz do SD também foi sendo reduzida a cada 25 min de cada sessão até chegar na intensidade 1. A duração de S^Δ (1 min) e a intensidade de SD (1 min) permaneceram constantes a partir desses valores ao longo das sessões (procedimento denominado de discriminação sem erro). A aquisição da discriminação foi mais rápida com o uso do procedimento de discriminação sem erro em comparação ao procedimento de discriminação com erro em suas duas modalidades. Provavelmente o fato do procedimento de discriminação sem erro produzir um menor número de respostas diante do S^Δ contribuiu para o resultado obtido.