

POLIDIPSIA INDUZIDA POR CONTINGÊNCIA EM RATOS. Verônica B. Haydu, Adilson de Andrade, Ariane S. Buranello, Fabiana Tutida, Juliana Liberatti, Reginaldo Henrique P. do Nascimento, Renata de Oliveira Montemor e Dione de Rezende. Dep. de Psicol. Geral e Anál. do Comportamento, UEL, Londrina, PR.

O comportamento de beber água em excesso foi analisado em três ratos albinos, experimentalmente ingênuos, privados de alimento a 20% do seu peso *ad libitum*. Como aparelho foi utilizada uma caixa de Skinner modelo FUNBEC modificada, dotada de uma barra, um dispensador automático de alimento e uma plataforma retangular, medindo 8x12 cm que era acionada por um peso de mais ou menos de 30 g. Água ficava sempre disponível para o sujeito na gaiola experimental. Respostas de pressão à barra e tempo em que o sujeito ficava sobre a plataforma não tinham consequências e eram registradas automaticamente. Os sujeitos foram submetidos aos seguintes procedimentos: 1) registro da linha de base dos comportamentos de consumo de água, pressão à barra, tempo de permanência na plataforma; 2) uma sessão em que no início da mesma 36 *pellets* de alimento (em forma de pilula) eram fornecidas ao sujeitos, liberadas uma a uma, automaticamente, a cada 10 seg (alimentos maciço); 3) oito sessões de liberação do alimento em FT 90 seg; e 4) uma sessão de alimento maciço. Os resultados indicam que o comportamento de beber ocorreu durante as sessões experimentais, mas não foi caracterizado como comportamento induzido por contingência, porque não ocorreu em excesso nas sessões de FT 90 em comparação as sessões do alimento maciço. Concluiu-se que provavelmente um maior número de sessões sob FT 90 seriam necessários para que o comportamento de beber se caracterizasse como induzido pelo esquema.