

TREINO DE DISCRIMINAÇÃO COM DUAS CONDIÇÕES DE ESTÍMULOS LUMINOSOS. Verônica B. Haydu, Andréa S. Rodrigues, Gilson V. de Mores Jr. e Dione de Rezende Depto. de Psicol. Geral e Anál. do Comportamento. UEL, Londrina, PR.

A Análise do processo de aquisição da resposta de discriminação de estímulos, utilizando duas condições de luminosidade foi realizada. Um rato albino, adulto, privado de água por 24 horas foi usado como sujeito experimental. Uma caixa de Skinner modelo FUNBEC com uma lâmpada fixada na parte superior foi utilizada como equipamento. Após a resposta de pressão à barra ter sido fortalecida em um esquema de Crf, o sujeito foi submetido ao treino de discriminação. As respostas de pressão à barra eram reforçadas em um esquema VR 3 (FR 5) na presença de um estímulo luminoso (S^D) e não reforçadas durante o período de S^A (escuro). A duração de S^D variava em função do número de reforçamentos obtidos (FR 5) e alternava com períodos de S^A . Observou-se que na primeira sessão a taxa de respostas em presença de S^D e S^A eram consideravelmente próximas mas que a partir da quinta sessão os sujeitos já discriminavam os estímulos. O índice de discriminação acima de 95% foi alcançado na nona sessão. Concluiu-se que os esquemas programados nas condições de S^D e S^A foram aproximados para estabelecer a discriminação entre os estímulos.