

GENERALIZAÇÃO DE ESTÍMULOS LUMINOSOS EM RATOS.

Verônica B. Haydu, Hellen Patrícia P. Furtado, Jane Carla Portella, Karen Andrea M. Gumiero, Karina G. da Silva, Luciana B. dos Santos, Monica M. Bueno, Dione de Rezende. Depto. de Psicol Geral e Anál. do Comportamento. UEL, Londrina, PR.

A generalização de estímulos após treino com um estímulo específico foi demonstrada, utilizando três ratos albinos, de linhagem Wistar e ingênuos experimentalmente. Os sujeitos encontravam-se privados de água por 24 horas antes de cada sessão. O equipamento consistiu de caixas de condicionamento operante modelo FUNBEC, contendo um dispositivo de controle de diferentes intensidades de luz. O procedimento constou de três etapas. Na primeira etapa realizou-se o treino de bebedouro e modelagem da resposta de pressão à barra, seguida de fortalecimento em esquema de reforçamento contínuo. Na segunda etapa, um esquema de reforçamento em VI 60 seg foi colocado em efeito até a taxa de resposta de pressão à barra ficar estável. Uma luz, utilizada como estímulo treino, esteve presente tanto na primeira como na segunda etapa. Na terceira etapa realizou-se o teste de generalização em extinção em que cinco intensidades de luz foram apresentadas aleatoriamente, inclusive a ausência de luz. Observou-se que os sujeitos responderam com alta taxa de resposta na presença do estímulo treino e dos estímulos testes, não se tendo obtido um gradiente de generalização típico dos procedimentos de laboratório. No entanto, houve uma certa diminuição da taxa de resposta em presença dos estímulos testes que mais se diferenciavam do estímulo de treino. Conclui-se que houve generalização de estímulos, mas que um controle mais apropriado das condições ambientais é necessário para que se possa obter gradiente de generalização típicos.