

EFEITOS DE DIFERENTES GRAUS DE PRIVAÇÃO DE ÁGUA SOBRE A TAXA DE RESPOSTA DE PRESSÃO À BARRA. Dione de Rezende, Ana Paula Troncoso e Verônica B. Haydu. Depto. de Psicol. Geral e Anál. do Comportamento. UEL, Londrina, PR.

O efeito do nível de privação de água sobre a taxa de resposta de pressão à barra em um rato albino, de linhagem Wistar e ingênuo experimentalmente foi avaliado. O aparelho foi uma caixa experimental padrão, modelo Funbec. O sujeito foi exposto a 22 sessões divididas em 4 etapas intercaladas com sessões de linha de base. Na primeira etapa foram realizadas 10 sessões em esquema de reforçamento contínuo e com o sujeito privado de água por 24 h; na segunda, 4 sessões em VI 30 seg e privação de 72 h; na terceira, 4 sessões em VI 30 seg e privação de 48 h e na quarta etapa, VI 30 seg e privação de 24 h. Houve diferença estatisticamente significantes nas taxas de respostas apresentadas pelos sujeitos submetidos aos três diferentes graus de privação. Na comparação dos pares, verificou-se que não houve diferença significativa entre a taxa de respostas na condição de 24 h de privação com reforçamento em CRF em comparação com a condição de 48 h de privação. Não houve diferença significativa, também, nas taxas de respostas nas condições de privação de 24 h com reforçamento em CRF e em VI 60. Pode-se concluir que quanto maior é a privação de água maior é a taxa de resposta de pressão à barra.