KIT 11 – SOLICITAÇÃO DE RADIOGRAFIAS EM TRAUMA / ORTOPEDIA

Referências: ABRAMEDE 2024 • ATLS 10ª Edição • SBOT • Canadian C-Spine Rules • Ottawa Ankle / Knee / Foot Rules

---

1. OBJETIVO

Padronizar a solicitação de radiografias musculoesqueléticas no pronto-socorro, evitando exames desnecessários em contusões leves e otimizando o diagnóstico de fraturas clinicamente suspeitas.

---

2. PRINCÍPIOS GERAIS

- A radiografia deve ser **guiada pelo exame físico** (dor localizada, deformidade, crepitação, impotência funcional).
- **Evitar pedidos por rotina** ("RX de membro todo" sem critério).
- Priorizar **exame direcionado à área de dor**.
- Utilizar critérios clínicos validados (**Canadian / Ottawa Rules**) antes da solicitação.

---

3. REGIÕES – INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

A) COLUNA CERVICAL – CANADIAN C-SPINE RULE

Solicitar RX / TC se:	Evitar RX se:
Idade ≥ 65 anos ou trauma de alta energia.	Trauma leve, <65 anos, mecanismo simples.
Dor cervical localizada, déficit neurológico.	Ausência de dor e livre movimento cervical.
Incapaz de rodar o pescoço 45° bilateralmente.	Movimento cervical preservado e sem dor.

B) OMBRO / CLAVÍCULA

Solicitar RX	Evitar RX
Trauma direto, dor intensa, deformidade ou limitação de movimento.	Dor muscular leve, sem deformidade.
Queda sobre ombro ou mão estendida.	Amplitude de movimento preservada.

Solicitar RX	Evitar RX
Suspeita de luxação ou fratura.	Contusão isolada, sem dor óssea.

C) COTOVELO / ANTEBRAÇO

Solicitar RX	Evitar RX
Dor no olécrano, cabeça do rádio ou úmero distal.	Dor leve, sem edema ou limitação de movimento.
Déficit de extensão total do cotovelo.	Movimento preservado, sem deformidade.
Mecanismo de queda sobre mão estendida.	Contusão superficial ou leve.
Deformidade visível ou edema localizado.	Dor muscular inespecífica.

D) PUNHO / MÃO

Solicitar RX	Evitar RX
Dor na tabaqueira anatômica (suspeita de escafóide).	Dor leve, movimento completo.
Edema localizado ou deformidade.	Contusão leve sem limitação.
Trauma direto, queda com punho em extensão.	Dor difusa sem foco ósseo.

E) JOELHO – OTTAWA KNEE RULES

Solicitar RX	Evitar RX
Idade ≥ 55 anos.	Trauma leve, sem edema.
Dor na patela ou cabeça da fíbula.	Marcha normal e amplitude preservada.
Incapaz de flexionar o joelho a 90°.	Dor leve sem limitação.
Incapaz de sustentar peso por 4 passos.	Deambula normalmente.

F) PERNA (TÍBIA / FÍBULA)

Solicitar RX	Evitar RX
Trauma direto com dor localizada intensa.	Dor muscular difusa sem edema.
Deformidade, crepitação, edema local importante.	Contusão leve com marcha preservada.
Queda ou acidente com suspeita de fratura fechada/aberta.	Dor leve e exame físico normal.
Comprometimento neurovascular distal.	Ausência de sinais clínicos de fratura.

G) TORNOZELO / PÉ – OTTAWA ANKLE RULES

Solicitar RX	Evitar RX
Dor óssea em maléolo medial/lateral (6 cm acima da borda).	Entorse leve, sem dor óssea.
Dor na base do 5º metatarso ou navicular.	Marcha preservada e dor leve.
Incapaz de sustentar peso por 4 passos.	Deambula normalmente, dor difusa.

H) QUADRIL / FÊMUR / BACIA

Solicitar RX	Evitar RX
Queda em idoso, dor intensa, rotação externa do membro, encurtamento.	Dor leve em partes moles.
Incapacidade de deambular.	Marcha normal e exame físico sem alterações.
Trauma de alta energia.	Contusão leve.

4. PRIORIDADES

- Sempre iniciar com **exame físico e palpação direcionada**.
- Não solicitar RX de "membro completo" — use **região específica**.
- Se o paciente **não apoia o peso ou há deformidade**, RX indicado.
- Em trauma de alta energia ou politrauma, priorizar **TC conforme protocolo ATLS**.
- Em dor musculotendínea sem sinais de fratura → **preferir USG musculoesquelético**.

---

5. RESUMO PRÁTICO

Região	Indicar RX se:	Evitar RX se:
Coluna cervical	Critérios de alto risco (Canadian).	Movimenta livre, sem dor.
Ombro / Clavícula	Trauma direto, limitação, deformidade.	Contusão leve.
Cotovelo / Antebraço	Dor óssea, limitação de extensão, edema.	Movimento preservado.
Punho / Mão	Dor na tabaqueira, deformidade, edema.	Contusão leve.
Joelho	Ottawa Rules positivas.	Marcha normal.
Perna (Tíbia/Fíbula)	Dor localizada, deformidade, edema.	Dor difusa leve.

Região	Indicar RX se:	Evitar RX se:
Tornozelo / Pé	Ottawa Ankle Rules positivas.	Entorse leve.
Quadril / Fêmur / Bacia	Dor intensa, incapacidade de deambular.	Dor leve em partes moles.

6. CONCLUSÃO

A padronização dos critérios reduz solicitações desnecessárias, melhora o fluxo ortopédico e evita exposição radiológica desnecessária.
Aplicar as **regras de decisão clínica (Canadian e Ottawa)** assegura alta sensibilidade para fraturas clinicamente relevantes.

- ✅ Diagnóstico seguro
- ✅ Redução de exames desnecessários
- ✅ Menor tempo de espera
- ✅ Comunicação uniforme com ortopedia