REVISÃO DE ESTATÍSTICA:

MEDIDAS E VARIÁVEIS

Revisão completa de estatística descritiva e probabilidade básica.

04 de novembro de 2026



MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Resumo essencial para entender o centro dos dados por diferentes perspectivas

MÉDIA	Soma dos valores dividida pelo total. Sensível a valores extremos.
MODA	Valor que ocorre com maior frequência no conjunto de dados.
MEDIANA	Valor central que divide o conjunto ordenado em duas metades iguais.

EXEMPLO: 2, 4, 4, 6, 8, 10

MÉDIA: 5
MODA: 4
MEDIANA: 5



MEDIDAS DE DISPERSÃO

AMPLITUDE TOTAL	Diferença entre o maior e o menor valor.
VARIÂNCIA	Mede a dispersão dos dados em relação à média, em unidades ao quadrado.
DESVIO PADRÃO	Raiz quadrada da variância. Está na mesma unidade dos dados e é sempre ≥ 0.
EXEMPLO	Variância = 25 Desvio padrão = 5

MESMA MÉDIA, DISPERSÕES DIFERENTES



Os valores estão próximos da média.

Menor risco, maior previsibilidade.



Os valores estão mais afastados da média.

Maior risco, menor previsibilidade.

A MÉDIA ISOLADA PODE OCULTAR RISCOS RELEVANTES. → O **DESVIO PADRÃO** FACILITA A INTERPRETAÇÃO E A TOMADA DE DECISÃO.

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

Contagens que assumem valores inteiros e enumeráveis.

- Representam **valores contáveis**: 0, 1, 2, ...
- **Exemplos:** número de caras em moedas, falhas em sistemas e eventos discretos.
- Possuem um **conjunto discreto** de números inteiros como possíveis valores.
- Essenciais para **modelagem** probabilística, tomada de decisão e controle de qualidade.

DISCRETA	CONTÍNUA
Contagens inteiros e finitas ou enumeráveis. Exemplos: 0, 1, 2, 3, ...	Medições em uma escala contínua. Exemplos: peso, altura, tempo.





