MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

Resuma dados em um **valor representativo.**

MÉDIA

$\bar{x}$

Soma dos valores dividida pelo total; sensível a outliers.

MODA

M

Valor que ocorre com maior frequência.

MEDIANA

Me

Valor central que divide o conjunto ordenado ao meio (50% acima e 50% abaixo).

EXEMPLO PRÁTICO

2, **4, 4, 6,** 8, 10

MODA — MEDIANA — MÉDIA = 5,67



MEDIDAS DE DISPERSÃO


Quantificam quão espalhados os dados estão em torno da média.

Amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor da amostra

Variância é a média dos quadrados dos desvios em relação à média, em unidades ao quadrado

Desvio Padrão é a raiz quadrada da variância, na mesma unidade dos dados

> **Exemplo:** variância = **25**
> desvio padrão = **5**



Mesmo com a mesma média, o desvio padrão mostra o quanto os dados se espalham.

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS DISCRETAS

Assumem valores inteiros contáveis, em um conjunto finito ou enumerável

Exemplos: número de caras em lançamentos de moedas e falhas em um sistema

Característica: conjunto discreto de valores inteiros

Aplicação: base para análise probabilística e controle de qualidade em contextos técnicos

