

Estudio Hidrodinámico de la Interacción entre Eyecciones de Masa Coronal

Cristian David Chavez Aponte

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

2026

Estudio Hidrodinámico de la Interacción entre Eyecciones de Masa Coronal

Presenta

Cristian David Chavez Aponte

Como trabajo de grado para optar por el título de
Físico

Director:

Dr. Miguel Andrés Paez Murcia

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Facultad de Ciencias Básicas, Escuela de Física

Tunja, Boyacá, Colombia

2026

Tareas

Papers importantes de explorar en la evolucion de la tesis

1. dos papers adicionales para mirarlos. En algun momento serán necesario leerlos por ahora solo los dejo presentes. Si puede darle un mirada rapida, aqui puede usar IA <https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abaef9/pdf> <https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac17e9/pdf>

Papers obligatorios para analizar:

1. Metodología:

- KINEMATIC TREATMENT OF CORONAL MASS EJECTION EVOLUTION IN THE SOLAR WIND
- Direct First Parker Solar Probe Observation of the Interaction of Two Successive Interplanetary Coronal Mass Ejections in 2020 November
- An Analytical Model of Interplanetary Coronal Mass Ejection Interactions
- Morphological and Kinematic Evolution of Three Interacting Coronal Mass Ejections of 2011 February 13-15
- Analyses of the Evolution and Interaction of Multiple Coronal Mass Ejections and Their Shocks in July 2012
- The Interaction Between Coronal Mass Ejections and Streamers: A Statistical View over 15 Years (1996 - 2010)
- The Interaction of Two Coronal Mass Ejections: Influence of Relative Orientation
- Characteristics of Kinematics of a Coronal Mass Ejection during the 2010 August 1 CME-CME Interaction Event
- SWASTi-CME: A Physics-based Model to Study Coronal Mass Ejection Evolution and Its Interaction with Solar Wind
- A STATISTICAL STUDY OF MAIN AND RESIDUAL ACCELERATIONS OF CORONAL MASS EJECTIONS

2. Cálculos & Discusión

- Successive Interacting Coronal Mass Ejections: How to Create a Perfect Storm
- Interaction of coronal mass ejections and the solar wind. A force analysis

3. Discussion:

- Deriving the Interaction Point between a Coronal Mass Ejection and High-speed Stream: A Case Study

- Interaction of a coronal mass ejection and a stream interaction region: A case study
- Interaction between Two Coronal Mass Ejections in the 2013 May 22 Large Solar Energetic Particle Event
- The Role of Coronal Mass Ejection Interactions in the Acceleration of Solar Energetic Particle Events
- Do Interacting Coronal Mass Ejections Play a Role in Solar Energetic Particle Events?
- Radio Signatures of Coronal Mass Ejection Interaction: Coronal Mass Ejection Cannibalism?

4. Conclusiones

- Does the direct interaction between coronal mass ejections play a role in the acceleration of solar energetic particles?
- Numerical Simulation of the Interaction of Two Coronal Mass Ejections from Sun to Earth





Figura 0.1: Frecuencia de palabras en paper Gonzalez-Esparza et al. (2004).

Cronograma



Agradecimientos

Resumen

Índice general

Tareas	3
Agradecimientos	7
Resumen	8
Índice de Tablas	11
Índice de figuras	12
1 Introducción	17
1.1. Capas del Sol	20
1.2. Rotación diferencial del Sol	27
1.3. Dinamo Solar	28
1.4. Ciclo Solar	30
1.5. Viento solar	34
1.6. Magnetohidrodinámica	38
2 Eyecciones de masa coronal (CMEs)	42
2.1. Origen de la CME	43
2.2. Propiedades de la CME	46
2.3. Clasificación	52
2.4. Comportamiento en el medio interplanetario	53
2.5. Detección y observación de CMEs	54
2.6. Influencia en el clima espacial	57
3 Interacción CME - CME	59
3.1. Variación de las propiedades en la interacción	60

<i>ÍNDICE GENERAL</i>	10
3.2. Estructuras resultantes de la interacción	66
3.3. Interacción CME-CME y los eventos de SEPs	68
4 Problema	75
5 Análisis de resultados	76
6 Discusión	77
7 Conclusiones y perspectivas	78
Bibliografía	79
Índice Alfabético	89

Índice de Tablas

1.1. Propiedades de la tacoclina en $R = 0,7R_{\odot}$	23
2.1. Estimaciones de las fuentes de energía en la corona solar reportadas en Forbes (e.g., 2000)	43
2.2. Parámetros Estadísticos de CME Derivados	51

Índice de figuras

0.1. Frecuencia de palabras en paper Gonzalez-Esparza et al. (2004).	5
1.1. Representación gráfica de las capas del Sol, sus estructura y fenómenos. .	21
1.2. Distribución interna de densidad y temperatura en función del radio $R_{\odot}$	22
1.3. Mapa de contornos del perfil de rotación interna del Sol	24
1.4. Fotografía de la granulación solar	25
1.5. Comportamiento poloidal y toroidal del campo magnético del Sol	29
1.6. Primeros registros fotográficos de plagas	31
1.7. Número de manchas solares y CMEs en función del tiempo	32
1.8. Dibujo del eclipse de 1860 con la primera observación de una Eyección de Masa Coronal	33
1.9. Distribución del viento solar al rededor del Sol	35
1.10. Gráficos polares de la velocidad del viento solar en función de la latitud para las dos primeras órbitas de Ulysses	37
2.1. Velocidades medias y medianas anuales de las CMEs desde 1996 hasta 2010	47
2.2. Evolución morfológica de la CME debida a efectos convectivos y gradientes de presión	48
2.3. Resultados de velocidad, campo magnético y densidad del viento solar generados por la simulación hecha por Odstreil et al. (2002)	49
2.4. Gráfica de velocidad de propagación de la CME en función del tiempo, con sus diferentes etapas	50
2.5. Gráficas experimentales de altura, velocidad de propagación y aceleración de la CME en función del tiempo	51
2.6. Resultados del modelo usado en Mayank et al. (2023) sobre la cinemática de la CME, comparado con datos experimentales	55

2.7. Gráficas de velocidad radial, densidad, temperatura y campo magnético radial tomados por OMNI comparados con la simulación de Mayank et al. (2023)	56
3.1. Características del ambiente del viento solar a 0.083AU y a 1AU	70
3.2. Características de las CMEs, con V_e las velocidades de las CMEs, incremento de la densidad $\Delta N_e = N_e/N_0$ y de la temperatura $\Delta T_e = T_e/T_0$, τ_e como la duración de la generación de la CME, M_e es la masa total y U_e es la energía cinética total.	71
3.3. Resultados de la simulación de una CME a 1D hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004	71
3.4. Condiciones de las CME utilizadas en la simulación en 2D	71
3.5. Simulación en 2D de dos CMEs hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004	72
3.6. Simulación en 2D de dos CMEs hecha por Gonzalez-Esparza et al., 2004, 29 horas después del lanzamiento de la primera CME	73

Acrónimos

A

AU Unidad Astronómica (en inglés *Astronomical Unit*),

AR Región Activa (en inglés *Active Region*),

B

C

CME Eyección de Masa Coronal (en inglés *Coronal Mass Ejection*),

CH Agujero Coronal (en inglés *Coronal Hole*),

CDAW Coordinated Data Analysis Workshop

D

DST Tiempo de Tormenta Perturbadora (en inglés *Disturbance Storm Time*),

E

F

G

H

HELCATS Heliospheric Cataloguing, Analysis and Techniques Service

I

IMF Campo Magnético Interplanetario (en inglés *Interplanetary Magnetic Field*),

J

K

L

LASCO Large Angle and Spectroscopic Coronagraph

M

MHD Magnetohidrodinámica

MDI Michelson Doppler Imager

N

O

P

Q

R

S

SF Llamaradas Solares (en inglés *Solar Flares*),

SW Viento Solar (en inglés *Solar Wind*),

Sunspots Manchas Solares

SEP Partícula Energética Solar (en inglés *Solar Energetic Particle*),

SMEI Generador de imágenes de Eyecciones de Masa Coronal (en inglés *Solar Mass Ejection Imager*),

SWOOPS Solar Wind Observations Over the Poles of the Sun

SOHO Solar and Heliospheric Observatory

T

TRACE Transition Region and Coronal Explorer

U

UVCS Ultraviolet Coronagraph Spectrometer

V

W

X

Y

Z

CAPÍTULO 1

Introducción

”No mires al sol con inocencia, pues en su núcleo de fuego no late la vida, sino una conciencia antigua y soñolienta que, al despertar, nos reducirá a polvo.”

-H. P. Lovecraft

El Sol, como el motor y centro del Sistema Solar, se ha considerado como una deidad en el pasado y ha alimentado la curiosidad del hombre, por ejemplo en Curd (2010) se dice que Anaxágoras de Clazómenas (500 – 428 a.C.) creó una teoría en la que afirmaba que el Sol era una masa de metal incandescente y no el carro del dios Helios, como se creía entonces. Ya en la actualidad, gracias a avances en la ciencia y en la tecnología, se ha desarrollado un enorme marco teórico que entiende en gran medida el funcionamiento del Sol, permitiendo el estudio y la clasificación de diferentes eventos solares como lo son las Llamadas Solares (en inglés *Solar Flares*), (SF) y los eventos de Eyección de Masa Coronal (en inglés *Coronal Mass Ejection*), (CME); así como las Manchas Solares (Sunspots) y los Agujero Coronal (en inglés *Coronal Hole*),s (CHs). Estos fenómenos presentan un gran impacto en el clima espacial y por ende en la magnetósfera de la Tierra.

La Tierra, así como todos los planetas del Sistema Solar, describe un desplazamiento al rededor del Sol que sigue una trayectoria en forma de elipse en donde el Sol se ubica en uno de sus focos. Así pues, la Tierra presenta un perihelio y un afelio, el primero es el punto en el que la Tierra se encuentra más cercana al Sol ($\sim 1,471 \times 10^8$ km); mientras que el segundo es el punto más alejado de la órbita terrestre con respecto al Sol ($\sim 1,521 \times 10^8$ km), según S. Hughes (e.g., 2024). En

1976 la International Astronomical Union definió la Unidad Astronómica (en inglés *Astronomical Unit*), ([AU](#)), como una distancia de 149597870 km (e.g., Standish, 2004; Stix, 2002), siendo una cantidad que se encuentra entre la magnitud del perihelio y el afelio.

La masa del Sol $m_{\odot}$ se calcula en $1,9889 \times 10^{30}$ kg, aunque debido a la energía emitida, en forma de radiación y partículas hacia el medio interplanetario, ocurre una pérdida de masa de $\sim 4 \times 10^9$ kg s⁻¹ por radiación y 10^9 kg s⁻¹ por viento solar o liberación de partículas. Por lo tanto, si consideramos estas dos pérdidas de masa desde que el Sol entró en la secuencia principal, es decir, desde que empezó a fusionar hidrógeno en helio, comprendiendo un tiempo aproximado de $1,5 \times 10^{17}$ s, el Sol habría perdido menos de 10^{27} kg en toda su vida (e.g., Pitjeva et al., 2012; Stix, 2002), tres ordenes de magnitud por abajo de su masa total. Por otro lado, el radio solar se calcula con ayuda del diámetro angular de su disco solar visible y la AU, por lo que el radio del Sol $r_{\odot}$ se calcula en $6,96 \times 10^8$ metros (e.g., Rozelot et al., 2018). Conociendo su tamaño y su masa, es posible determinar su densidad media que se toma como $\bar{\rho}_{\odot} = 1,408$ g cm⁻³; además, la aceleración gravitacional en su superficie $g_{\odot}$ es de 274 m s⁻² (e.g., Stix, 2002).

Desde una perspectiva cotidiana el Sol podría parecer un astro estable, pero en realidad atraviesa ciclos solares de aproximadamente 11 años que producen una periodicidad en la actividad solar, modulando entre un mínimo y un máximo solar la frecuencia e intensidad de eventos tales como [CMEs](#) o [SFs](#) (e.g., Gnevyshev, 1977; Hathaway, 2015), y por ende afectando el medio interplanetario o . Es en esta última en donde la actividad solar conduce a la existencia del viento solar y éste al clima espacial, el cual es afectado por la evolución de las erupciones más violentas del Sistema Solar: las CMEs. Las CMEs arrastran consigo campos magnéticos, que comprimen el viento solar y el campo magnético interplanetario (e.g., Gopalswamy et al., 2000; Lugaz et al., 2017; Subramanian et al., 2016; Vršnak et al., 2012), por lo que su impacto se extiende desde la heliosfera interna hasta los confines del Sistema Solar; además, pueden llegar a afectar a la Tierra, donde pueden desencadenar auroras intensas, alterar sistemas de navegación e interferir con comunicaciones (e.g., T. Howard, 2014; Palacios et al., 2018), de ahí la importancia del estudio del origen y evolución de las CMEs.

El Sol está conformado por plasma y éste a su vez por núcleos de Hidrógeno,

Helio, Carbono, Nitrogeno, Oxígeno, entre otros (e.g., Asplund et al., 2009; Cermak, 2025), los cuales son el resultado mayormente de la fusión de hidrógeno en helio dentro del núcleo del Sol, liberando energía en forma de calor y radiación. El plasma genera campos magnéticos a gran escala debido al movimiento de los iones, pero no presentará campos eléctricos al considerarlo como plasma no colisional, ya que se toma como neutro fuera de la esfera de Debye (e.g., Judge, 2020), como ocurre con el viento solar (e.g., Artemyev et al., 2018). Sin embargo, al tener un plasma colisional se encuentra que existe un campo eléctrico interno sostenido por el plasma y su resistividad generada por las colisiones presentadas, un ejemplo de esto es la fotosfera en donde la resistividad del plasma no permite homogeneización de la carga lo que lleva a la existencia de un campo eléctrico.

Por otro lado, la fuerza gravitacional autoejercida por el Sol obliga a que éste colapse sobre si mismo, pero eso no es lo que sucede. Existe una fuerza que contraresta los efectos gravitacionales, generada por la presión del plasma y radiación que se genera en su interior. Por lo tanto, el Sol se encuentra en un equilibrio hidrostático, lo que significa que el gradiente de presión hacia afuera ($\frac{\partial P}{\partial r}$) contrarresta exactamente la fuerza gravitatoria ($-\rho g$) que, según Kopal (e.g., 1966) y Stix (2002), se puede escribir como:

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -\rho g \quad (1.1)$$




Es este equilibrio el que explica porque el Sol, y en general cualquier estrella, no colapsa sobre si mismo ni se dispersa en el espacio. La fuerza gravitacional ocurre gracias a la masa del Sol, pero el gradiente de presión es generado esencialmente por la fusión nuclear en su núcleo, en donde se presentan las condiciones extremas de temperatura ($\gtrsim 10^7$ K) y presión suficientes para fusionar Hidrógeno en Helio (e.g., Fiorentini et al., 2004). Esta fusión genera grandes cantidades de energía que es transportada hasta la superficie en forma de radiación, para luego ser emitida al medio interplanetario una vez haya pasado por todas las capas del Sol: Núcleo, Zona Radiativa, Tacoclina, Zona Convectiva, Fotosfera, Cromosfera y finalmente llegar a la Corona Solar.

En las páginas que siguen se presenta un recorrido por las capas del Sol y su rotación diferencial, también por los conceptos fundamentales de la actividad solar y

el viento solar, además de cómo todo ello se relaciona con los principios básicos de las CMEs y el contexto en el que sus interacciones ocurren y adquieren relevancia en el clima espacial cercano a la Tierra.

1.1. Capas del Sol

El Sol genera su energía a través de la fusión del hidrógeno en elementos más pesados, dicha fusión tiene lugar en el núcleo del Sol, mostrado como la región central en la Figura 1.1, que contiene el 35 % de la masa total en un volumen de radio 0,2 veces el radio del Sol $R_{\odot}$, reportado en [Software and Data for Solar Neutrino Research](#). También se muestran las demás capas del Sol, estructuras y fenómenos solares a tratar más adelante. Las reacciones nucleares más frecuentes pertenecen a la cadena ppI, representando aproximadamente el 85 % de todas las reacciones protón-protón las cuales producen el 98,8 % de la energía solar total (e.g., Bahcall & Ulrich, 1988; Stix, 2002). Esta cadena comprende las siguientes etapas, donde en cada paso se presenta una liberación de energía en forma de calor (Q):



La cadena de reacciones nucleares parte de dos núcleos de protio que se fusionan en uno de deuterio liberando un positrón y un neutrino electrónico, en seguida el núcleo de deuterio y un protón se fusionan en uno de helio-3 liberando un fotón; finalmente el núcleo de helio-3 se fusiona con otro núcleo de helio-3 para formar helio-4 o partícula alfa (α), liberando dos protones que aseguran la continuidad de la reacción. Estas reacciones son responsables de la mayor parte de la generación de energía en el Sol, transportada por gradientes de temperatura y presión para luego ser irradiada en la fotosfera (e.g., D. W. Hughes et al., 2007), presentando una luminosidad $L_{\odot}$ de aproximadamente $4 \times 10^{26} \text{ W}$ (e.g., Judge, 2020).




Figura 1.1: Esquema de la estructura interna y externa del Sol, mostrando sus principales capas físicas y fenómenos asociados. En el interior se distinguen el núcleo, la zona radiativa y la zona convectiva, separadas por la tacoclina. En la superficie solar aparecen las regiones de la fotosfera, cromosfera y corona, junto con manifestaciones de la actividad magnética a través de manchas solares, espículas, granulación, bucles coronales, plages y plumas polares, estas últimas asociadas con líneas de campo magnético abiertas. También se ilustran estructuras coherentes extendidas como los corrientes coronales y la hoja de corriente ecuatorial. Adaptado de Judge (2020).

La distribución de la densidad en el interior del Sol se muestra en la Figura 1.2, así como el comportamiento de la temperatura, en función del radio solar $R_{\odot}$. Se puede ver la diversidad de densidades en el Sol, tomando valores desde $150,5 \text{ g cm}^{-3}$ en un radio de $0,0016 R_{\odot}$ hasta $9,45 \times 10^{-4} \text{ g cm}^{-3}$ en un radio de $0,98 R_{\odot}$, indicando que el núcleo es la región más densa del Sol, como era de esperarse. Además, el perfil de la temperatura interna también presenta un comportamiento diverso, puesto que en centro se tiene una temperatura de $1,5 \times 10^7 \text{ K}$ mientras que en la superficie se tiene $8 \times 10^4 \text{ K}$, indicando nuevamente que las condiciones extremas se presentan en el núcleo del Sol.




Figura 1.2: Distribución radial de densidad y temperatura en el modelo solar estándar BS2005-AGS,OP (Bahcall-Serenelli 2005 con composición AGS,OP) interno. La densidad, en azul, muestra un decrecimiento de $\sim 150 \text{ g cm}^{-3}$ en el centro a $\sim 10^{-4} \text{ g cm}^{-3}$ en la superficie. La temperatura, en rojo, disminuye desde $\sim 1,5 \times 10^7 \text{ K}$ en el núcleo hasta $\sim 5800 \text{ K}$ en la fotosfera. La línea discontinua indica la ubicación de la tacoclina, en $R = 0,71 R_\odot$. Adaptado de Bahcall et al. (2005) con [Software and Data for Solar Neutrino Research](#).

La energía generada en el núcleo es recibida por la zona radiativa la cual tiene una temperatura $10^7 - 10^6 \text{ K}$ con un radio de $0,71 R_\odot$ y permite el fácil transporte de energía por parte de los fotones generados en la fusión nuclear, puesto que las distancias recorridas por los fotones son más grandes que las recorridas por las partículas cargadas generadas en la reacción. Ya que en esa región se presenta una gran concentración de iones, el fotón no es absorbido por parte de núcleos con uno o dos electrones, a través del efecto fotoeléctrico. Los fotones son absorbidos en regiones donde la temperatura disminuye lo suficiente como para permitir la recombinación de iones y electrones, y por consecuencia la fotoionización, disminuyendo la distancia del fotón antes de ser absorbido.

Así pues, el transporte de energía es principalmente por radiación y no por conducción, sin embargo en regiones de baja temperatura ya no se puede transportar energía de esa manera (e.g., Judge, 2020), por lo que se presenta localmente una acumulación de energía lo que lleva a un calentamiento del plasma y por ende una

expansión en contra de la presión de su entorno hacia afuera, puesto que es en esa dirección en la que la presión es menor, formando una celda de convección. Es acá en donde la zona convectiva entra en juego, pero primero es necesario mencionar la tacoclina.

La zona radiativa está envuelta por la tacoclina, una región delgada de aproximadamente $0,04 R_{\odot}$ de espesor, en la que se presenta un cizallamiento extremo debido al cambio entre la rotación rígida de la zona radiativa y la rotación diferencial de la zona convectiva (e.g., Ossendrijver, 2003; Spiegel & Zahn, 1992; Strugarek et al., 2023) permitiendo el transporte del momento angular y campos magnéticos.

La tacoclina se muestra en la Figura 1.3 como la curva discontinua, en donde hay una transición brusca en las velocidades de rotación; la zona convectiva se muestra con diferentes colores indicando una rotación diferencial, caso contrario a la zona radiativa que se muestra en gran parte de un solo color señalando una rotación rígida. Algunas propiedades de la tacoclina se mencionan en la Tabla 1.1 tomada de D. W. Hughes et al. (e.g., 2007).

Tabla 1.1: Propiedades de la tacoclina en $R = 0,7R_{\odot}$

Propiedad	Símbolo	Valor	Unidad
Densidad	ρ	0.21	g cm^{-3}
Presión	p	$6,7 \times 10^{13}$	$\text{g cm}^{-2} \text{s}^{-2}$
Temperatura	T	$2,3 \times 10^6$	K
Velocidad del sonido	c	$2,3 \times 10^7$	cm s^{-1}
Opacidad	κ	19	$\text{g}^{-1} \text{cm}^2$
Aceleración gravitacional	g	$5,4 \times 10^4$	cm s^{-2}




Figura 1.3: Mapa de contornos del perfil de rotación interna del Sol, medido por el instrumento Michelson Doppler Imager (MDI) de la misión Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), usando la técnica inversión helioseísmica y el método SOLA (Subtractive Optimally Localized Averages). Muestra la velocidad de rotación en unidades de frecuencia angular (nHz) y en función de la profundidad radial y la latitud del Sol. En color se muestran las velocidades en (nHz), recordando que 1 nHz equivale a una rotación cada 36,5 días, donde en rojo se indican las regiones de rotación rápida mientras que, progresivamente, el color morado indica las regiones de rotación lenta. Las líneas de contorno indican superficies con la misma velocidad de rotación y la curva discontinua señala la base de la zona convectiva, es decir, la tacoclina. En la zona en blanco cerca al eje de rotación no se puede inferir confiablemente la rotación. Tomado de Schou et al. (1998) y Thompson et al. (2003).

Posteriormente, la energía pasa de la tacoclina hacia la zona convectiva que tiene una temperatura entre 10^4 y 10^6 K conteniendo el 2% de la masa de la estrella (e.g. D. W. Hughes et al., 2007), véase también [Software and Data for Solar Neutrino Research](#). Esta zona presenta gradientes de temperatura y velocidad que inducen flujos de calor y campo magnético desde la zona radiativa hacia la superficie, lo cual produce células de convección (e.g., Stein, 2012) que se enfrían a medida que la radiación escapa de su superficie; al tener muchas células se crea una estructura celular superficial conocida como granulación mostrada en la Figura 1.4, que junto con la rotación diferencial del Sol, alimenta el dinamo solar (e.g., Ossendrijver, 2003).

Las células de convección se pueden agrupar en dos categorías: la granulación y la supergranulación (e.g., Leighton, 1963). Por un lado, en la granulación se presentan células con diámetros entre 700 y 1000 km con una duración promedio de 8 a 10 minutos, además están caracterizadas individualmente por un centro brillante que indica material más caliente que asciende y por bordes más oscuros con material frío que desciende, véase la Figura 1.4. Por otro lado, en la supergranulación se encuentran las células con diámetros promedio de 30000 km que duran al rededor de 20 horas antes de desintegrarse o reformarse; presentan una dinámica de flujo desde su centro hacia sus bordes con una velocidad de $0,5 \text{ km s}^{-1}$, favoreciendo la concentración del campo magnético en sus bordes.




Figura 1.4: Fotografía de la granulación solar tomada desde la estratosfera el 17 de agosto de 1959. Las células de convección se muestran en blanco, mientras que sus bordes en negro. Tomado de Leighton (1963).

Ahora, sobre la zona convectiva se encuentra la fotosfera con un rango de temperatura de $10^3 - 10^4 \text{ K}$, donde la densidad del plasma disminuye lo suficiente como

para que los fotones puedan escapar libremente al espacio, enfriando el plasma (e.g., P. R. Wilson, 1969), lo que significa que el flujo de energía deja de ser convectivo y pasa a ser radiativo. Cabe señalar que la energía irradiada es solo el 0,01 % de la energía total producida en el núcleo, el resto de energía se utiliza en el calentamiento y movimiento del plasma (e.g., Judge, 2020). Gracias a la luz liberada en esta región es posible estudiar el espectro térmico en el que irradia el Sol, coincidiendo con el de un cuerpo negro de una temperatura de ~ 6000 K que alcanza su máximo en las longitudes de onda visibles.

La siguiente capa es la cromosfera, la cual está situada por encima de la fotosfera y es en donde se rompe el equilibrio radiativo, además el hidrógeno es predominantemente neutro diferenciando la cromosfera de la corona, la cual está totalmente ionizada. Tiene una temperatura entre $\sim 4 \times 10^3$ K a 500 km de altura llegando hasta los 8×10^3 K a los 2000 km, antes de llegar al millón de grados que tiene la corona. La densidad en la cromosfera disminuye considerablemente, puesto que en la cromosfera superior la densidad es aproximadamente ocho órdenes de magnitud menor que en la fotosfera, según Carlsson et al. (e.g., 2019). Cabe señalar que, en la cromosfera media y alta, el campo magnético domina la dinámica del plasma, por lo que es una región extremadamente inhomogénea llena de espículas, las cuales son chorros gigantescos y dinámicos de plasma que brotan de la cromosfera y pueden extenderse entre 3 y 5 Mm, en algunos casos hasta 15 Mm, más allá del limbo visual (e.g., Carlsson et al., 2019).

La cromosfera está envuelta por la corona solar con una temperatura de $\sim 10^6$ K, la cual se expande en el medio interplanetario dando origen al viento solar que es una corriente de plasma formada principalmente en los CHs. En la corona solar se presentan líneas de campo magnético abiertas y cerradas, las primeras se denominan así porque no se cierran localmente en regiones próximas como en el caso de las líneas cerradas, si no que se extienden hacia el medio interplanetario.

En la corona solar se manifiesta la actividad solar que comprende diferentes eventos como lo son las SFs (e.g., Schrijver, 2008; Sweet, 1969) y las Sunspotss, así como las CMEs.

1.2. Rotación diferencial del Sol

Para poder investigar el interior del Sol se utiliza una técnica, denominada heliosismología, que estudia las oscilaciones detectadas en la superficie solar para estudiar el interior del Sol. Los modos principales en los que se clasifican las oscilaciones son el modo acústico (Modo p) en donde la fuerza restaurativa es la presión, el modo de gravedad (Modo g) con la flotabilidad como la fuerza restaurativa y el modo de oscilaciones superficiales (Modo f) que ocurren en la superficie de forma similar a olas en el agua (e.g., Thompson, 2004). Se detectan las oscilaciones midiendo el desplazamiento Doppler de las líneas espectrales, lo que indica el movimiento de la superficie, para luego comparar las frecuencias observadas y las calculadas teóricamente a partir de modelos solares, permitiendo corregir el conocimiento sobre la rotación interna del Sol (e.g., Christensen-Dalsgaard, 2002).

Gracias a la heliosismología es posible la investigación en el interior del Sol, estudiando características como lo es su rotación. El Sol, compuesto por un fluido ionizado, presenta una rotación diferencial, la cual indica que no todas las partes que lo componen tienen la misma velocidad angular o lineal, por lo que se generan regiones con diferentes velocidades tangenciales a la superficie de forma que el Sol no rota como un cuerpo rígido, sino que la velocidad tangencial es más grande en el ecuador que en los polos.

Se ha encontrado que el periodo de rotación diferencial superficial de latitudes bajas, cerca al ecuador, es de aproximadamente 25 días pero aumenta a medida que se acerca a los polos, donde es de aproximadamente 35 días (e.g., Thompson et al., 2003). Además, las capas del Sol también presentan una rotación diferencial, como se muestra en la Figura 1.3, donde los colores indican la frecuencia de rotación dada en nHz. El color rojo indica las zonas con una frecuencia mayor lo que significa un periodo menor y por ende una velocidad de rotación mayor; las regiones moradas indican lo contrario, zonas con una frecuencia menor que indican un periodo mayor y por lo tanto una velocidad de rotación menor. Así pues, la zona convectiva presenta una distribución de velocidades de rotación similar a la superficial, determinada a través de la observación de manchas solares y demás fenómenos solares ocurridos en la superficie. Cabe señalar que los principios que rigen el movimiento del interior

radiativo de una estrella son la conservación de la masa, del momentum y del calor (e.g., Spiegel & Zahn, 1992).

Esta rotación diferencial es la que alimenta el dinamo solar generando estructuras como [Sunspots](#), [CMEs](#), [SFs](#), siguiendo una periodicidad de 11 años llamada ciclo solar. Además, la rotación diferencial explica la generación y mantenimiento en el tiempo del campo magnético del Sol, el cual varía a lo largo del ciclo solar, siendo resultado del complejo movimiento del plasma solar conductor. Cabe señalar que la rotación diferencial convierte el campo magnético poloidal en un campo magnético toroidal, como se verá en la Sección 1.3.

1.3. Dinamo Solar

Las cargas experimentan fuerzas electricas y magnéticas en función de su velocidad relativa al campo magnético en el que estén sumergidas, ésto se entiende como la fuerza de Lorentz que consiste en la superposición de la fuerza magnética y eléctrica, como se muestra en la ecuación (1.2).

$$F = qE + q(v \times B) \quad (1.2)$$

Donde q es la carga de la partícula y v es su velocidad, E y B son el campo eléctrico y magnético, respectivamente, en los que la partícula está sumergida. Así pues, la dinámica del plasma está fundamentada en la interacción de la fuerza de Lorentz, siendo un fluido que se rige por la interacción electromagnetica, lo que significa que es indispensable la Magnetohidrodinámica ([MHD](#)) para describir la evolución del plasma sumergido en un campo magnético. El dinamo magnetohidrodinámico ocurre gracias a la energía nuclear y rotacional dentro del Sol, dicha energía produce el movimiento del fluido y éste a su vez influye en la creación de campos magnéticos; el campo magnético creado genera una fuerza de Lorentz sobre el fluido que altera el movimiento del fluido nuevamente, lo que clasifica esta situación como un caso dinámico. En Lugaz et al. (2005, e.g.,), se define el dinamo MHD como un sistema de fluido conductor en el que el magnetismo se mantiene en el tiempo.

También, la rotación diferencial influye en la intensidad del campo magnético puesto que produce una deformación del mismo, convirtiendo el campo poloidal

(panel izquierdo de la Figura 1.5) en uno toroidal a través del efecto Ω (panel central de la Figura 1.5). Este efecto estira las líneas magnéticas poloidales (norte-sur) para convertirlas en un potente campo toroidal (este-oeste), del tal forma que las líneas se envuelven al rededor del eje de rotación, amplificando el campo magnético toroidal en la tacoclina (e.g., D. W. Hughes et al., 2007). Un campo magnético toroidal es fuertemente inestable, por lo que forma tubos de flujo magnético que emergen en la zona convectiva y se manifiestan como manchas solares en la fotosfera (panel derecho de la Figura 1.5), posteriormente generan las CME como se verá más adelante. Una vez liberada la energía a través de reconexión magnética, el campo magnético se convierte en poloidal nuevamente, pero con una polarización invertida siguiendo el ciclo de Hale de 22 años (Lugaz et al., 2005; Ossendrijver, 2003, e.g.,), lo que se denomina efecto α en el cual las células de convección adquieren un carácter ciclónico o helicidad debido a la fuerza de Coriolis. Por lo que la convección impulsa la rotación diferencial a través de la redistribución del momento angular; esta rotación genera el campo toroidal y la helicidad de las células de convección regenera el campo poloidal, todo ello coordinado en la tacoclina.




Figura 1.5: Comportamiento poloidal y toroidal del campo magnético del Sol. El panel a) muestra campos poloidales, el b) muestra su conversión en campos toroidales mediante el efecto Ω , produciendo líneas de campo que envuelven el eje de rotación. El panel c) muestra el campo magnético que emerge a través de la superficie, regenerando el campo poloidal mediante el efecto α . Adaptado de Judge (e.g., 2020).

1.4. Ciclo Solar

La actividad magnética solar, incluyendo las manchas solares y las CMEs, siguen un ciclo solar con un periodo de 11 años aproximadamente conocido como ciclo de Schwabe (e.g., Hathaway, 2015; Ossendrijver, 2003), como se muestra en la Figura 1.7. A continuación se describen dichos fenómenos y su comportamiento a lo largo del ciclo solar.

Manchas Solares

Fueron utilizadas por Galileo en 1612 para determinar el periodo de rotación del Sol sobre su propio eje, encontrando un valor de 27 días, según Vaquero y Vázquez (2009, e.g.,). Este periodo de rotación se estandarizó en 1859 bajo el nombre de rotación de Carrington, gracias a Richard Christopher Carrington quien la definió con mayor precisión, observando un valor de 27,3 días, correspondiente a la rotación del Sol vista desde la Tierra.

Las manchas solares son regiones oscuras, puesto que son relativamente más frías que las demás regiones en la superficie del Sol, además de presentar una alta actividad magnética lo que conlleva a que el intenso campo magnético en esa región, entre 0,1 y 0,3 Teslas según Ossendrijver (e.g., 2003), inhiba el transporte del calor del interior solar a la superficie. Al suprimir este flujo de energía, la región se enfría aproximadamente $1500 - 2000\text{ }^{\circ}\text{C}$ en comparación con la fotosfera circundante que está a unos $5800\text{ }^{\circ}\text{C}$ (e.g., Solanki, 2003).

Una característica de las manchas solares son las plages mostradas en la Figura 1.6, observadas por primera vez en 1903, son regiones brillantes en la cromosfera que se observan como parches luminosos. Las plages están asociadas a manchas solares y regiones magnéticas activas, por lo que son un indicador de la actividad solar, además son zonas en las que el campo magnético es más fuerte. Cabe aclarar que las manchas solares son oscuras en la fotosfera mientras que las plages son brillantes en la cromosfera.




Figura 1.6: Fotografía de la cromosfera solar tomada en 1903 por Hale y Ellerman; las manchas luminosas están asociadas con las manchas solares, siendo el primer registro fotográfico de plages. Tomado de Judge (2020).

Frecuentemente, las manchas solares forman pares bipolares de una mancha principal cercana al ecuador. También son un indicador clave de la actividad solar, por lo que su aparición varía a lo largo del ciclo solar, por lo tanto también están relacionadas proporcionalmente con la producción de CMEs (e.g., Hathaway, 2015; Webb & Howard, 1994). Las manchas solares, al almacenar enormes cantidades de energía, pueden llegar a presentar reconexiones magnéticas abruptas que liberan dicha energía en forma de SFs y desencadenar las erupciones más violentas del Sistema Solar, las CMEs.

Las manchas solares tienen un comportamiento periódico descrito por la secuencia temporal mostrada en la Figura 1.7. Se puede ver que el ciclo que sigue el número de manchas solares tiene un periodo de aproximadamente 11 años, por lo que sigue el ciclo de Schwabe (e.g., Hathaway et al., 1994).




Figura 1.7: En el eje izquierdo se indica el perfil anual de la serie temporal de aparición de manchas solares desde 1700 (curva azul), adaptado de la World Data Center for the Sunspot Index and Long-term Solar Observations ([WDC-SILSO](#)). En el eje derecho se muestra la cantidad de CMEs anuales desde 1996 (curva naranja), adaptado de la base de datos [SOHO-LASCO](#), generada y mantenida en el Centro de Datos CDAW por la NASA y la Universidad Católica de América en cooperación con el Laboratorio de Investigación de la Marina.

Eyecciones de masa coronal

Las CMEs fueron descubiertas a inicios de la década de los 70s (e.g., Hansen et al., 1971; Tousey, 1973), con ayuda de la creación del coronógrafo en 1931 por Bernard Lyot y su posterior desarrollo, además de la implementación de un disco que bloqueaba la luz de la fotosfera denominado disco de ocultación (e.g. T. Howard, 2014). La primera CME registrada fue el 18 de julio de 1860 por Ernst Wilhelm Leberecht Tempel, mostrada en la Figura 1.8, a pesar de que en ese entonces no se sabía que era una CME (e.g., «A&G Volume 62 Issue 3, Full Issue», 2021).

Las CMEs son eventos recurrentes, sin embargo presentan una ocurrencia casi periódica, como muestra la curva naranja en la Figura 1.7, en donde se puede ver una variación similar a la indicada por el número de manchas solares. Los máximos de la cantidad de CMEs coinciden con los máximos del número de manchas solares, por lo que las CMEs también siguen el ciclo de Schwabe de 11 años (e.g., Lamy et al., 2019; Robbrecht et al., 2009; Webb, 1991; Webb & Howard, 1994).




Figura 1.8: Dibujo del eclipse de 1860 registrado por Ernst Wilhelm Leberecht Tempel. Se piensa que esta es la primera observación de una eyección de masa coronal. Tomada de «Photographs and Drawings of the Corona» (1879).

Llamaradas solares

Las llamaradas solares (**SFs**) son procesos ocurridos en la corona solar debido a los bucles solares, impulsadas por la reconexión magnética que ocurre cuando una línea de campo magnético de un bucle solar presenta una torcedura que hace que se presente una reconexión de forma agresiva, liberando una enorme cantidad de energía magnética en forma de radiación ($\sim 10^{20}$ Joules) desde el rango de las ondas de radio hasta el de los rayos gamma, calentando el material presente en esa región, como lo menciona Longcope (e.g., 2020).

Además, las **SFs** aceleran partículas en un instante de tiempo relativamente corto en comparación a las CMEs. Sin embargo, la teoría sobre el origen de las SFs aún se mantiene en desarrollo, ya que se deben buscar sistemas magnéticos estables la mayor parte del tiempo y capaces de almacenar cantidades enormes de energía, cientos de veces mas grande que la almacenada de cualquier otra forma, antes de liberarla

en un instante corto de tiempo. Por otro lado, las SFs grandes están asociadas inevitablemente con CMEs, por lo que muestran oscilaciones cuasi-periódicas de aproximadamente 11 años, siguiendo el ritmo del ciclo de manchas solares (e.g., Kossobokov et al., 2011).

Por otro lado, se ha encontrado que las SFs y las CMEs rápidas presentan una correlación, puesto que son manifestaciones de la misma liberación de energía, gracias a las observaciones de SOHO y Skylab (e.g., Feynman & Hundhausen, 1994; Gosling et al., 1976; Kahler, 1992; Low, 1994; Zhang et al., 2001), donde la componente de energía cinética de la CME es la más importante (e.g., Emslie et al., 2012); dicha liberación de energía es la respuesta a la constante inyección de flujo magnético a la corona desde la zona convectiva.

1.5. Viento solar

El Sistema Solar está inmerso en un medio gaseoso conocido como Viento Solar (en inglés *Solar Wind*), (SW), el cual es un flujo de plasma generado en los CHs, (e.g., Biermann, 1951; Cranmer, 2009; Cranmer & Winebarger, 2019; Parker, 1958; Schwenn, 2007), dividido en lento ($\lesssim 500 \text{ km s}^{-1}$) a bajas latitudes y rápido ($\gtrsim 675 \text{ km s}^{-1}$) a altas latitudes del Sol (e.g., Stakhiv et al., 2015). Sin embargo, se ha encontrado un tercer tipo de viento solar con velocidades entre 500 y 675 km s^{-1} (e.g., Stakhiv et al., 2015), que es el viento solar limitrofe que separa el rápido del lento, como se muestra en la Figura 1.9.

El descubrimiento del viento solar empieza con la observación de la cola de los cometas, de donde se documentaron dos tipos de colas.

La formación de líneas abiertas de campo magnético debido a los agujeros coronales de altas latitudes. Líneas magnéticas cerradas en latitudes bajas cercanas al Sol.

Por otro lado, se toma que la temperatura del plasma en la corona es de $2,85 \times 10^6 \text{ K}$ y tiene una densidad de $2,5 \times 10^{-16} \text{ g cm}^{-3}$ así como un campo magnético B_0 que se escribe como una expansión en dipolos y octupolos magnéticos, con una intensidad máxima de 8,4 Gauss (0,84 mT) en los polos y 2,2 Gauss (0,22 mT) en el ecuador. En comparación con el de la Tierra que es de 0,25 Gauss.

El Viento Solar influye fuertemente en el clima espacial, así como los eventos de CME y de SF, también es un indicador de las fronteras del Sistema Solar (e.g., Stone et al., 2013), es decir, los límites de la Heliosfera. Cabe señalar que el clima espacial comprende las condiciones rápidamente cambiantes en la ionosfera de la Tierra y sus capas superiores, presentando un problema para la tecnología moderna.

Por otro lado, debido a la rotación del Sol, el Campo Magnético Interplanetario (en inglés *Interplanetary Magnetic Field*), (IMF) llevado por el viento solar toma una forma de espiral doble de Arquímedes, ya que el viento solar se libera radialmente de la superficie Solar (e.g., Parker, 1958). Debido a la rotación del Sol, las líneas de campo magnético se curvan de tal forma que aparecen componentes azimutales, perpendiculares a la componente radial, por lo que esta curvatura se irá acumulando en función de la distancia al Sol haciendo que la componente azimutal tome mayor relevancia (e.g., Lugaz et al., 2005).




Figura 1.9: Diagrama de la distribución de los tipos de viento solar. En rojo está el viento lento, en azul el viento rápido y en verde el viento de interfaz. Tomado de Stakhiv et al. (2015).

La estructura del viento solar varía a lo largo del ciclo solar, como lo observó el experimento Solar Wind Observations Over the Poles of the Sun (SWOOPS) a bordo de la nave espacial Ulysses (e.g., McComas et al., 2003). En la Figura 1.10 se muestra lo reportado por el instrumento, los paneles superiores muestran gráficos polares que reportan la velocidad del viento solar observada, mientras que el panel

inferior muestra la cantidad de manchas solares a lo largo de un periodo de 11 años. La cantidad de manchas solares indica un mínimo solar (panel izquierdo) y un máximo solar (panel derecho), los cuales corresponden a la primera y segunda órbita polar de la nave Ulysses, además están sobrepuestos a imágenes del Sol y la corona solar características del mínimo y máximo solar, respectivamente. Durante la primera órbita de Ulysses se muestra una notable distribución bimodal, con velocidades intensas en latitudes altas debido los agujeros coronales que cubren los polos, mientras que se registraron velocidades bajas sobre el ecuador. Ya en la segunda órbita se evidencia un comportamiento completamente diferente, altamente variable en todas las latitudes, debido a la presencia de [CMEs](#), agujeros coronales de baja latitud y regiones activas.




Figura 1.10: Gráficos polares de la velocidad del viento solar en función de la latitud para las dos primeras órbitas de Ulysses. Paneles superiores: Velocidad del viento solar medida por el instrumento **SWOOPS**, codificada por color según la polaridad del **IMF**, en rojo se indica un IMF hacia afuera (positivo) y en azul un IMF hacia adentro (negativo). Ambas se representan sobre imágenes solares compuestas características del mínimo solar (17/08/1996) y el máximo solar (07/12/2000). Paneles inferiores: Latitud heliográfica de Ulysses durante su órbita única de alta inclinación alrededor del Sol. El número de manchas (panel inferior) muestra que la primera órbita se produjo durante el mínimo del ciclo solar, mientras que la segunda abarcó el máximo solar. Tomado de McComas et al. (2003)

La velocidad clave relacionada con la propiedad electromagnética del viento solar es la velocidad de Alfvén, misma velocidad en la que se propagan las ondas de Alfvén a lo largo de las líneas de campo magnético en un plasma. La velocidad de Alfvén se define como:

$$v_A = \frac{B}{\sqrt{\mu_0 \rho}} \quad (1.3)$$

En donde el campo magnético se muestra como B , la densidad másica del plasma como ρ y la permeabilidad del vacío como μ_0 .

1.6. Magnetohidrodinámica

La magnetohidrodinámica estudia el comportamiento de un fluido conductor inmerso en un espacio con campo magnético, dicho comportamiento se afectará así mismo, en Cowling (e.g., 1976) se muestra un texto en donde se condensa una introducción a la MHD, de ahí se tiene lo siguiente:

Ecuaciones de la magnetohidrodinámica

Se parte de las ecuaciones de Maxwell y de la hidrodinámica, llegando primero a la ecuación de continuidad hidrodinámica, que es de la forma:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla(\rho v) = 0 \quad (1.4)$$

Con ρ la densidad y v la velocidad del medio. Las ecuaciones que constituyen la magnetohidrodinámica, además de la ya mencionada, son:

$$\nabla \times H = 4\pi j, \quad \nabla \cdot j = 0 \quad (1.5)$$

$$\nabla \times E = -\mu \left(\frac{\partial H}{\partial t} \right), \quad \nabla \cdot H = 0 \quad (1.6)$$

$$j = \sigma(E + \mu v \times H) \quad (1.7)$$

$$\rho \frac{\partial v}{\partial t} + \rho v \cdot \nabla v = -\nabla p + \rho g + F + \mu j \times H \quad (1.8)$$

Donde j es la densidad de corriente, H es el campo magnético, E es el campo eléctrico, g es la gravedad, σ es la conductividad eléctrica, v es la velocidad del medio, p es la presión y F es la fuerza de viscosidad que para un líquido viene dada por:

$$F = \rho \nu \nabla^2 v \quad (1.9)$$

Con ν la viscosidad cinemática. Además, se debe considerar la energía interna por unidad de masa, dada por:

$$\rho \frac{dU}{dt} = \frac{p}{\rho} \frac{d\rho}{dt} + \lambda \nabla^2 T \quad (1.10)$$

Donde U es la energía interna por unidad de masa, T es la temperatura y λ es la conductividad térmica.

Efectos electromagnéticos

Con las ecuaciones anteriores es posible llegar a la ecuación:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \nabla \times (v \times H) + \frac{\nabla^2 H}{4\pi\mu\sigma} \quad (1.11)$$

Que es la variación del campo magnético en función de la velocidad del medio y del campo magnético mismo. Ya si consideramos el medio en reposo tenemos:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\nabla^2 H}{4\pi\mu\sigma} \quad (1.12)$$

Que es una ecuación de difusión, el coeficiente que acompaña al laplaciano del campo magnético se le conoce como la difusibilidad magnética: $\eta = \frac{1}{4\pi\mu\sigma}$. Las consecuencias de esta ecuación (para un medio estático) es que el campo magnético presenta un decrecimiento en un tiempo de decrecimiento que depende de la longitud por la que circula la corriente; para los conductores presentes en el cosmos, de gran tamaño, el tiempo de decrecimiento es, por ejemplo, de 15000 años para el campo magnético terrestre. El autor llega a encontrar que el tiempo de decrecimiento del campo magnético de una mancha solar es de 300 años, mientras que para el campo magnético del Sol es de 10^{10} años, todo esto en reposo.

La ecuación para un medio con velocidad pero con una conductividad muy grande (o una resistencia despreciable) de tal forma que la difusibilidad magnética sea casi nula, es:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \nabla \times (v \times H) \quad (1.13)$$

Esta ecuación es similar que la ecuación del torbellino, pero para el campo magnético. En el contexto del torbellino, la ecuación implica el arrastre de líneas de torbellino por el líquido. Según Alfvén, cuando la conductividad domina se pueden despreciar los términos de fuerzas inducidas, si la materia se mueve paralelo a las líneas de campo magnético, el material no modificará el campo en el cual se está moviendo, lo que implica que las líneas de campo están congeladas"; si la materia se mueve en dirección perpendicular a las líneas de campo se encuentra que la materia en movimiento modifica el campo al arrastrar sus líneas de campo.

Ahora, se define el número de Reynolds magnético como:

$$R_{mag} = \frac{LV}{\eta} \quad (1.14)$$

Donde L es una longitud comparable con las dimensiones del campo y V es una velocidad comparable con las velocidades reales. Este número nos indica que domina en el campo, si el arrastre de las líneas de campo o el decrecimiento del campo magnético. Por lo general, a nivel cósmico, lo que predomina es el arrastre de las líneas de campo magnético pero de forma lenta lo que lleva a algo como líneas de campo congeladas", mientras que en un laboratorio en la Tierra predomina es el decrecimiento del campo magnético.

Campos congelados

La ecuación para campos congelados viene de las ecuaciones anteriores y tiene la forma:

$$\frac{\partial \left(\frac{H}{\rho} \right)}{\partial t} + v \cdot \nabla \left(\frac{H}{\rho} \right) = \left(\frac{H}{\rho} \cdot \nabla \right) v \quad (1.15)$$

Ahora, si se presenta una perturbación en un tubo de líneas de fuerza, debido al arrastre de las líneas de campo, la magnitud del campo magnético y de la densidad presentarán una variación, pasando de ser H y ρ a ser H' y ρ' , este cambio se puede ver en la ecuación:

$$\frac{H'}{\rho'} = \left(\frac{H}{\rho} \cdot \nabla \right) r' \quad (1.16)$$

Siendo la forma integral de la ecuación anterior.

Energía magnética

Conociendo la densidad volumétrica de energía magnética: $\frac{\mu H^2}{8\pi}$ podemos encontrar la energía total del campo al integral en todo el volumen ocupado por el mismo:

$$W_H = \frac{1}{8\pi} \int_V \mu H^2 dV \quad (1.17)$$

Podemos determinar la variación de esta energía magnética de a través de:

$$\frac{dW_H}{dt} = \frac{1}{4\pi} \int \mu \{ H \cdot \nabla (v \times H) + \eta H \cdot \nabla^2 H \} d\tau \quad (1.18)$$

El segundo término de la parte derecha de la ecuación se puede reescribir como:

$$\frac{1}{4\pi} \int \mu \eta H \cdot \nabla^2 H d\tau = - \int \frac{j^2}{\sigma} d\tau \quad (1.19)$$

Por lo que este término representa la transformación de energía magnética a calor por efecto Joule a una razón de $\frac{j^2}{\sigma}$ por unidad de volumen. Ahora, el primer

término de la parte derecha de la ecuación de la variación de la energía en el tiempo nos indica el trabajo realizado por la materia en el movimiento contra la fuerza magnética $j \times \mu H$. Esta fuerza magnética se puede escribir de la forma:

$$j \times \mu H = -\nabla \left(\frac{\mu H^2}{8\pi} \right) + \nabla \cdot \left(\mu \frac{HH}{4\pi} \right) \quad (1.20)$$

Esta ecuación nos dice que la fuerza magnética equivale a una **presión hidrostática** transversal (debida al primer término de la parte derecha, $\frac{\mu H^2}{8\pi}$) y a una **tensión magnética** a lo largo de las líneas de campo (debida al término de $\frac{\mu H^2}{4\pi}$), en otras palabras son las tensiones de Maxwell. Cabe señalar que todo alargamiento de las líneas de fuerza lleva a un aumento de la energía magnética. Por otro lado, si las líneas de fuerza se separan, que es lo mismo a decir que la intensidad del campo magnético disminuye, la energía magnética disminuye.

CAPÍTULO 2

Eyecciones de masa coronal (CMEs)

“El sol era como una gran lámpara de policía en el cielo, interrogándome sin piedad.”

-Charles Bukowski

En 1939, Lyman (1939) demostró que el material eyectado desde el Sol en forma de filamento, tendría una temperatura tan alta que no se condensaría en materia sólida en el medio interplanetario, si no que se expandiría en forma de un gas tenue ya que una vez que los gases han alcanzado la velocidad de escape del filamento, ninguna porción grande del filamento puede condensarse, independientemente de la temperatura a la que pueda descender. Por lo que se creará una atmósfera al rededor del Sol, que hoy denominamos heliosfera.

Las eyecciones de masa coronal son desprendimientos de nubes de plasma a gran escala que pueden envolver múltiples sistemas de flujo de campo magnético de la superficie del Sol y se propagan a través de la heliosfera. Pueden salir eyectadas a grandes velocidades, por lo que si la CME se propaga a una velocidad supersónica hará que se rompa la barrera magnetosónica en el viento solar generando una onda de choque en su frente (e.g., Gosling et al., 1976; Sonett et al., 1964), la cual acelera partículas de plasma y produce eventos Partícula Energética Solar (en inglés *Solar Energetic Particle*), (SEP), según Kahler et al. (e.g., 1978, 1983). Las SEPs son relevantes en la exploración espacial puesto que representan un riesgo para los exploradores humanos que viven y trabajan más allá de la orbita terrestre así como los aparatos electrónicos presentes en esas regiones.

Así pues, las eyecciones de masa coronal son el principal método de aceleración

de partículas energéticas solares junto con las SFs, pero con la diferencia de que éstas últimas ocurren en un lapso de tiempo mucho más corto en comparación con las CMEs. Por lo que, las partículas alcanzarán una mayor energía al generarse a través de las eyecciones de masa coronal debido a que están bajo una aceleración durante más tiempo en comparación con el tiempo de aceleración de las partículas en una Llamada Solar.

2.1. Origen de la CME

La explicación más aceptada actualmente para la causa de las CMEs consiste en la pérdida de estabilidad o equilibrio en el campo magnético coronal (e.g., Forbes, 2000; Low, 1996) debido a la acumulación de tensión magnética en cuerdas de flujo magnético. Por lo que su origen está íntimamente ligado a la reconfiguración a gran escala del campo magnético en regiones en las que se presenta una topología magnética compleja. Se cree que este campo magnético se origina en la tacoclina (e.g., Glatzmaier, 1985) y que asciende gracias a la flotabilidad magnética (e.g., Browning & Priest, 1986; Low, 1996).

La erupción comienza con una expansión lenta de las estructuras de bucles o loops, aumentando la inestabilidad magnética y probocando un evento de CME que involucra una reconexión magnética. Así pues, el campo magnético entra en erupción liberando la energía acumulada en forma de energía cinética y radiación.

Tabla 2.1: Estimaciones de las fuentes de energía en la corona solar reportadas en Forbes (e.g., 2000)

Forma de energía	Valores promedio observados	Densidad de energía (ergs cm ⁻³)
Cinética ($\frac{1}{2}m_p n V^2$)	$n = 10^9$ cm ⁻³ , $V = 1$ km s ⁻¹	10 ⁻⁵
Térmica ($n k T$)	$T = 10^6$ K	0,1
Gravitacional ($m_p n g h$)	$h = 10^5$ km	0,5
Magnética ($B^2/8\pi$)	$B = 100$ G	400

Por un lado, la densidad de energía necesaria en la fuente de una CME para impulsarla es del orden de 100 ergs cm⁻³ (e.g., Forbes, 2000), ya que esa es la densidad energética con la que se produce; por otro lado la densidad de energía presente en la corona solar tiene contribuciones cinéticas, térmicas, gravitacionales y

magnéticas, mostradas en la Tabla 2.1 adaptada de Forbes (e.g., 2000), superando la energía necesaria para generar una CME. Las densidades de energía se determinan teniendo en cuenta el volumen de la corona, tomado como 10^{30} cm^3 , además de considerar una densidad n en la corona de $\sim 10^9 \text{ cm}^{-3}$ así como una velocidad $V \sim 1 \text{ km s}^{-1}$ de las estructuras convectivas. También se toma una temperatura T de $\sim 10^6 \text{ K}$ junto con una gravedad superficial de $2,47 \times 10^4 \text{ cm s}^{-2}$ y una altura h de $\sim 10^{10} \text{ cm}$. Para la densidad de energía magnética se toma un campo magnético de 100 G . Así pues, se evidencia que la extracción de solo una cuarta parte de la densidad de energía magnética es suficiente incluso para impulsar las CMEs más intensas.

En Lugaz et al. (e.g., 2005) se asume que el medio de la corona solar y heliosfera está compuesto por plasma magnetizado que se comporta como un gas ideal, de constante adiabática de $\gamma = 5/3$ inmerso en un campo magnético congelado, por lo que no se suaviza ni desaparece; además se considera como un caso ideal donde el plasma tiene una conductividad infinita, lo que significa que se puede despreciar la difusión resistiva. Esta difusión es un proceso en el cual el campo magnético se suaviza o disminuye debido a que los iones en el plasma se ven frenados por la resistividad del medio, lo que terminaría con iones estáticos que pierden energía por efecto Joule y, por lo tanto, no poseerán la velocidad necesaria para generar el campo magnético interno.

Para conseguir erupciones es necesario que se consigan las siguientes condiciones:

- Suficiente Energía magnética libre y Helicidad. La energía libre magnética hace referencia al exceso de energía necesaria para sostener una estructura de material en la corona solar, por lo tanto se tiene que la energía total es la suma de la energía potencial de la estructura más la energía libre, o:

$$E_{free} = E_T - E_{Potencial} \quad (2.1)$$

Por lo que ese exceso de energía es el que se puede liberar al medio interplanetario a través de las eyecciones de masa coronal, cuando las líneas de campo magnético, también llamadas bucles magnéticos activos, que almacenan dicha energía y se vuelven inestables, indicando una proporcionalidad entre la inestabilidad y la energía almacenada. La energía libre almacenada en las Región Activa (en inglés *Active Region*),s (ARs) a menudo excede la energía

requerida para una erupción incrementando la inestabilidad de la complejidad magnética en la región. Por otro lado la helicidad es la que mide cuán retorcidas, trenzadas o entrelazadas están las líneas de campo magnético dentro de una región, se define como:

$$\mathcal{H} = \int_V \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} dV, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (2.2)$$

Donde $\mathbf{A}$ es el potencial vector del campo magnético y $\mathbf{B}$ es el campo magnético. Si se tiene un tubo de flujo magnético, como una cuerda o lazo, la helicidad mide si está enroscado como una espiral o si hay trenzado entre varios tubos. Esta energía libre magnética y helicidad se genera por:

- Flujo emergente, refiriéndose al proceso donde campos magnéticos generados en el interior del Sol gracias al dinamo solar ascienden a la superficie atravesando la zona convectiva y emergen en la fotosfera generando manchas solares, para luego penetrar en la atmósfera solar.
- Movimiento de cizallamiento y rotación, indicando movimientos en la superficie del Sol que deforman y retuercen las líneas del campo magnético coronal, permitiendo almacenar energía magnética libre y helicidad. Ocurre cuando se tienen dos regiones con líneas de campo magnético perpendiculares a la superficie del Sol que se desplazan en direcciones opuestas, provocando que las líneas de campo se estiren y deformen aumentando la energía magnética almacenada y por ende la tensión magnética. Esta última se define como:

$$T = \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{B} \quad (2.3)$$

La tensión magnética busca reducir la torsión o curvatura de una línea de campo magnético, esto hace que ayude a generar estabilidad en las diferentes estructuras solares. Cuando hay demasiada tensión magnética en una línea de campo magnético, esta será inestable y se producirá una erupción como medida para liberar energía acumulada. Además, puede presentar torsión si una de las regiones presenta una rotación sobre su propio eje, lo que generaría una estructura helicoidal.

- Desencadenantes y procesos eficientes de conversión de energía, liberando la energía magnética libre y helicidad en poco tiempo.

Se presentan dos tipos de mecanismos desencadenantes:

- El primero es bajo un proceso no lineal asociado con la reconexión magnética, como lo muestran modelos como el Corte de ataduras o "The tether-cutting model", así como el modelo de Ruptura magnética o "Magnetic breakout model"
- El segundo es por la pérdida de equilibrio debido a inestabilidades en las diferentes estructuras, inestabilidades como la de Kink o la Inestabilidad Toro (torus instability).

2.2. Propiedades de la CME

La tasa de eventos de CMEs es de 2 a 3 CMEs por semana en el mínimo solar y de 5 a 6 CMEs por día en el máximo solar, indicando una estrecha relación con el ciclo solar, además sus tiempos de propagación desde el Sol hasta la Tierra son entre 3 y 4 días (e.g., Lugaz et al., 2017). Una CME lleva consigo 10^{21} Maxwells (10^{13} Wb) de flujo de campo magnético en promedio, lo cual la asocia con la reconfiguración de los campos magnéticos de la corona solar. Una CME puede tener una masa entre $10^8 - 10^{14}$ kg según Vourlidis et al. (e.g., 2010) que estudia una muestra de 14007 CMEs registradas desde el 22 de febrero de 1996 hasta el 31 de julio de 2009, comprendiendo un ciclo solar completo.

Se estimó un límite de $\sim 10^{36}$ erg en energía cinética para la máxima liberación de energía por medio de CMEs, lo que implica un límite en la velocidad máxima de la CME de ~ 4000 km s $^{-1}$; se sugiere que se debe a la máxima energía libre disponible en las regiones solares activas (e.g., Gopalswamy et al., 2010). El evento con mayor energía cinética fue registrado el 28 de Octubre de 2003, siendo de tipo Halo con $1,2 \times 10^{33}$ erg y una velocidad de 2459 km s $^{-1}$, además generó un Tiempo de Tormenta Perturbadora (en inglés *Disturbance Storm Time*), (DST) de -363 nT (e.g, Gopalswamy et al., 2005).

Una CME tiene tres partes importantes (e.g., Fisher et al., 1981), siendo el filamento la parte interna que hace alusión a una bombilla y es la parte en la que se arrastra material relativamente más frío. En seguida se presenta una cavidad central envuelta por un borde delantero en donde se arrastra material coronal y

viento solar ubicado delante del campo central de la CME o Core, en donde va la nube magnética, presentando una estructura de campo magnético espiral altamente estructurada T. Howard (e.g., 2014).

Una característica importante de las CMES es su velocidad, la cual tiene una contribución dada por la influencia electromagnética del medio y una contribución dada por la influencia de la densidad del viento solar. Las CMES pueden alcanzar velocidades entre 300 y 1000 Km s^{-1} , (e.g., T. Howard, 2014), sin embargo Zhang y Dere (e.g., 2006) reporta un rango de velocidades entre 50 y 3000 km s^{-1} , con una velocidad media de 350 km s^{-1} fuera de la corona solar. Por su parte, Gopalswamy et al. (e.g., 2004) indica que la velocidad promedio de la población general es de $\sim 450 \text{ km s}^{-1}$. También, Webb y Howard (e.g., 2012) reporta en la Figura 2.1 las velocidades medias y medianas anuales de las CMES desde 1996 hasta 2010, indicando una correlación con la actividad solar en el ciclo solar 23.




Figura 2.1: Velocidades medias y medianas anuales de las CMES de LASCO desde 1996 hasta 2010 (Webb & Howard, 2012)

La velocidad depende de la magnitud de la aceleración y su duración, la cual va desde los 6 minutos hasta los 1200 minutos, con una media de 54 minutos y un promedio de 180 minutos. Mientras que la magnitud de la aceleración está centrada

en cero, con un rango de $\pm 30 \text{ m s}^{-2}$. También, se encontró que la aceleración principal media de una muestra de 50 CMES es de 170 m s^{-2} , con un promedio de 330.9 m s^{-2} , un valor máximo de 4464.9 m s^{-2} y un valor mínimo de 2.8 m s^{-2} . Por otro lado, la aceleración residual tiene una media de 3.1 m s^{-2} y un promedio de 1 m s^{-2} , además tiene un máximo de 52 m s^{-2} y un mínimo de -131 m s^{-2} .

Otras propiedades de las CMES son su tamaño, su campo magnético, su tasa de expansión, su dirección de propagación, su tiempo de llegada y la probabilidad de impacto con la Tierra.

La tasa de expansión se toma como esférica debido a la convección isotrópica con el viento solar, según Riley y Crooker (2004) un conjunto de puntos ubicados de forma esférica mantendrán su latitud pero variarán su distancia al centro a través de la forma: $\Delta R = v_R \Delta t$; ΔR es la variación de la componente radial del vector posición del punto, v_R es la velocidad del viento solar y Δt es el cambio en el tiempo. También, hay otra contribución a la expansión debido a un gradiente de presión uniforme entre la CME y el viento solar, donde la presión en el medio circundante es menor que la presión de la CME, de tal forma que se expande y no colapsa, teniendo $-\Delta P$. Entonces, se tiene la Figura 2.2 que representa estas dos contricuiones a la expansión.




Figura 2.2: Efectos cinematicos en la evolución de la CME. En a) se muestra la evolución convectiva o expansión esférica; y en b) se muestra la expansión de la CME causada por un gradiente de presión entre ella y el viento solar ambiental (Riley & Crooker, 2004)

Entonces, al considerar ambas contribuciones en la expansión de la CME se puede llegar a encontrar algo similar a lo mostrado por la simulación MHD de Odstreil

et al. (2002), la cual se muestra en la Figura 2.3, en donde se puede ver como la CME presenta una deformación que la aplasta en la dirección de su propagación y la expande perpendicularmente a su dirección de propagación. El panel izquierdo de la Figura 2.3 muestra la evolución de la CME 42 horas después de su generación en el origen.




Figura 2.3: Propagación de una CME en la heliosfera, en donde la escala de colores muestra el mapa de velocidades, la densidad del plasma se muestra en relación a la densidad de líneas negras y el campo magnético en relación a la densidad de líneas rojas. Se muestra la evolución de la CME en 4 tiempos: 292, 304, 320 y 350 horas después de empezar a correr la simulación (Odstrcil et al., 2002)

Por otro lado, las propiedades de las CMEs se pueden ver influenciadas por la interacción con el SW y con el IMF. Una primera consecuencia de esta interacción es la aceleración de CMEs lentas y la desaceleración de las CMEs rápidas, homogeneizando la velocidad en el viento solar (e.g., Yashiro et al., 2004). Sheeley et al. (1999) sugiere la existencia de dos tipos de dinámica de CMEs: las graduales, que son lentas ($400 \sim 600 \text{ km s}^{-1}$) y están asociadas con prominencias; y las impulsivas, más rápidas ($> 750 \text{ km s}^{-1}$) y están asociadas con SF.

La aceleración de propagación de las CMEs se ha estudiado de forma estadística, por lo que Gallagher et al. (e.g. 2003), Zhang y Dere (2006) y Zhang et al. (2001) describen la cinemática de una CME a partir de observaciones de Transition Region and Coronal Explorer (TRACE), el Ultraviolet Coronagraph Spectrometer (UVCS) y el Large Angle and Spectroscopic Coronagraph (LASCO). Se reporta el perfil de

la aceleración de una CME como el mostrado en la Figura 2.4, donde se presenta una etapa de **iniciación** con aceleración casi nula, luego una etapa de **aceleración** dependiente del tiempo puesto que la velocidad no es lineal con respecto a la altura, seguida de una etapa de **propagación** en donde la aceleración se convierte en residual, disminuyendo hasta generar una velocidad casi constante de propagación. Bein et al. (2011) estudia una población de 95 CMEs y encuentra rangos de velocidad máxima, aceleración máxima y su duración, así como un rango para la altura inicial de las CMEs y la altura en la que ocurren la velocidad y aceleración máxima; lo anterior reportado en la Tabla 2.2. Además, Bein et al. (2011) encuentra que la aceleración máxima presenta una correlación negativa con el tiempo de su duración, por lo que a mayor aceleración menor será el tiempo en el que actúe.





Figura 2.4: Perfil de aceleración de una CME y de su Flare asociada, mostrados como sus velocidades en función del tiempo. Se muestran las tres fases de la dinámica de la CME y de la Flare (e.g., Zhang & Dere, 2006).

En Gallagher et al. (2003) se estudia el evento de CME ocurrido el 21 de abril de 2002, generado en NOAA 9906 a las 00:43 UT; se observó su iniciación y propagación. Tomando como punto de referencia su frente, se generó la gráfica mostrada en la Figura 2.5.

Tabla 2.2: Parámetros Estadísticos de CME Derivados

Parámetro	Mínimo	Máximo	Media Aritmética	Mediana
$v_{\max}$ (km s^{-1})	56	1279	526	460
$a_{\max}$ (m s^{-2})	19	6781	757	414
t_{acc} (minuto)	4.5	516	44.6	29.0
h_0 ($R_{\odot}$)	0.01	1.76	0.24	0.14
$h_{v\max}$ ($R_{\odot}$)	0.17	9.5	1.56	0.78
$h_{a\max}$ ($R_{\odot}$)	0.04	2.90	0.53	0.26

Notas. Los parámetros son: Velocidad máxima $v_{\max}$, aceleración máxima $a_{\max}$, duración de la fase de aceleración t_{acc} , altura h_0 donde el borde frontal de la CME pudo identificarse por primera vez, altura en la velocidad máxima $h_{v\max}$, y altura en la aceleración máxima $h_{a\max}$. El valor mínimo, valor máximo, media aritmética y mediana se derivan del conjunto completo de 95 eventos (Bein et al., 2011).



centering

Figura 2.5: Perfil de altura, velocidad y aceleración de la CME del 21 de abril de 2002 a las 00:43 UT, en función del tiempo. Así mismo, el flujo de rayos X debido a su Flare asociada, en función del tiempo. Los círculos rellenos son valores derivados de la gráfica de altura vs tiempo, los demás símbolos señalan las observaciones del

En la Figura 2.5 se muestra el perfil de velocidad esperado, coincidiendo con la Figura 2.4. Se puede identificar las fases de la dinámica de la CME, quedando en evidencia el comportamiento de la fase de propagación, en donde la aceleración se reduce y la velocidad se mantiene casi constante.

2.3. Clasificación

Una forma de clasificar las CMES es a través de su lugar de origen en la superficie solar, así como del intervalo de tiempo que hay entre dos CMES consecutivas, por lo que se encuentran las erupciones simultáneas, homólogas y gemelas. Las CMES simultáneas se les considera a aquellas que ocurren en diferentes regiones activas del Sol pero aproximadamente al mismo tiempo, además de ello tienen propiedades similares. En el artículo Pevtsov (2000) se realizó un estudio estadístico basado en datos de octubre de 1991 a diciembre de 1998, en el que se reporta que un tercio de todas las ARs presentan bucles transecuatoriales, lo que sugiere que las regiones activas de la superficie solar pueden estar interconectadas magnéticamente. Aunque se encuentren en hemisferios opuestos del Sol se pueden presentar inestabilidades que se propaguen entre regiones activas.

Las CMES homólogas se clasifican como las ocurridas consecutivamente y ocurren en una misma región activa pero con una diferencia de tiempo, que según Lugaz et al. (2017, p.10) es de alrededor de 15 horas. Además, se mencionan las CMES cuasi-homólogas que tienen un intervalo de ocurrencia de 15 a 18 horas entre la primera y la segunda CME. Además, hay casos en los que se registraron CMES gemelas, es decir, se produjeron en el mismo lugar pero con minutos de diferencia (e.g., Lugaz et al., 2017).

Las regiones activas presentan una rotación aproximada de $3,5^\circ$ en 6 horas, lo que llevaría a creer que las erupciones homólogas no ocurrirían en el intervalo de tiempo que hay, ya que la región activa se encuentra desplazada después de esas 6 horas. Pero debido a la escala espacial de las CMES la probabilidad de interacción aumenta, debido a que se puede considerar que las dos CMES se propagan en la misma dirección (e.g., Lugaz et al., 2005).

Las CMES gemelas ...

2.4. Comportamiento en el medio interplanetario

Las CMES en el medio interplanetario generan una modificación drástica de las características del viento solar y por ende del clima espacial, al arrastrar líneas de campo magnético a través de las superficies de Alfvén, las cuales son superficies tridimensionales en donde la velocidad del flujo de plasma es igual a la velocidad de Alfvén, ecuación (1.3).

Diferentes estudios han utilizado cuerdas de flujo para estudiar el comportamiento de una CME en el viento solar, por ejemplo Singh et al. (2025) indica un modelo que se basa en una cuerda de flujo que se propaga desde el Sol, llegando a concluir que el viento solar ambiente es el factor dominante que controla su velocidad y evolución cinemática en la heliosfera interna.

Otro trabajo es el de Mayank et al. (2023), en el que se utiliza el modelo de simulación SWASTi-CME que considera la interacción de una CME con el viento solar y con otras CMES, dando información sobre sus velocidades así como de su comportamiento a lo largo de su propagación y expansión en el medio interplanetario. Se siguen parámetros del viento solar rápido en la simulación, tales como la velocidad de $v_{fsw} = 650 \text{ km s}^{-1}$, con una densidad de $n_{fsw} = 200 \text{ cm}^{-3}$ y un campo magnético de $B_{fsw} = 300 \text{ nT}$. Además, menciona los parámetros utilizados para simular la CME, la cual lleva una densidad de $\rho_{CME} = 10^{-18} \text{ kg m}^{-3}$, una temperatura de $T_{CME} = 0,8 \text{ MegaKelvin}$ y un flujo de campo magnético de $\phi_{Mag} = 10^{12} \text{ Wb}$. También analiza el comportamiento de CMES consecutivas simuladas con base en parámetros medidos experimentalmente en eventos específicos, por lo que muestra cómo sería el comportamiento de la interacción entre CMES. En el mismo paper se menciona que la velocidad del viento solar influye en el comportamiento de la densidad de la CME y se estabilizará más rápido a medida que la irregularidad del viento solar aumente.

Además, Mayank et al. (2023) señala que cuando una CME se propaga expandiéndose en un medio no uniforme y denso, su volumen resultante será menor en comparación al caso en el que se propaga en un medio menos denso y uniforme. Así pues, entre más irregular sea el viento solar, más rápido la CME llegará a su estado estacionario.

También, una CME puede enfrentarse a una fuerza de arrastre que bien puede ser

negativa o positiva Mayank et al. (2023). La negativa es debida a que la CME empuja el viento solar presente en su camino, mientras que la positiva es debida a una fuerza de atracción por parte del viento solar sobre el frente de la CME, consecuencia de la diferencia de velocidades entre la CME y el viento solar. Por lo que, la fuerza de arrastre afecta la distribución de las propiedades de la CME, tales como su velocidad, su densidad, así como su tiempo de llegada a la Tierra, además de su morfología y dinámica.

Adicionalmente, las CMEs pueden presentar deflexión, interacción y rotación en el medio interplanetario. La deflexión consiste en una desviación sistemática en la propagación de la CME, siguiendo el gradiente de la densidad de energía magnética. De este modo, la deflexión está controlada por el campo magnético de fondo de tal forma que las CMEs se alejan de regiones con campo magnético abierto como el generado por los CHs, como lo reporta Gopalswamy et al. (e.g., 2009). La tasa de deflexión está correlacionada positivamente con la fuerza del gradiente de densidad de energía magnética, pero con una anticorrelación débil con la velocidad de la CME (e.g., Gui et al., 2011). En consecuencia, la geoefectividad de la CME puede aumentar si la deflexión es en dirección a la línea Sol-Tierra o disminuir si es en dirección opuesta. La interacción entre CMEs se tratará con más detalle en la Sección 3.

La rotación de la CME puede estar impulsada por la desconexión de uno de los puntos de apoyo de la cuerda de flujo al principio de la erupción (e.g., Vourlidas et al., 2011), aunque también se puede dar por la presencia de un campo magnético heliosférico (e.g., Yurchyshyn et al., 2009).

2.5. Detección y observación de CMEs

La observación y estudio de estos fenómenos es gracias a mediciones in situ, observaciones remotas y a simulaciones numéricas. Las CMEs observadas se han recopilado en catálogos de CMEs tales como el Coordinated Data Analysis Workshop (CDAW) o el Heliospheric Cataloguing, Analysis and Techniques Service (HELcats). El Generador de imágenes de Eyecciones de Masa Coronal (en inglés *Solar Mass Ejection Imager*), (SMEI) fue lanzado en 2003, siendo el primero de una nueva clase de instrumentos llamados Generadores de imágenes heliosféricas. El SMEI puede observar las diferentes etapas de evolución de una CME, desde su origen hasta su

propagación a 1 AU.

SOLAR PROBE PLUS SOHO con el instrumento CDS HINODE con el instrumento EIS SDO con el instrumento EVE

En Mayank et al. (2023), se muestra una simulación de una CME cuando interactúa con el viento solar, evidenciando el impacto de las condiciones del viento solar en la propagación y evolución de la CME, siguiendo parámetros dados por Mayank et al. (2022). Utiliza dos geometrías, una es un cono elíptico con origen el el Sol y la otra es a través de una línea de flujo magnético. Para el cono elíptico, se aproxima la forma de una CME como un tubo hueco que se expande, compuesto por dos conos truncados unidos por una sección central cilíndrica. Para una cuerda de flujo, se utiliza el modelo FRi3D para modelar la cuerda, la cual incorpora el campo magnético tridimensional relacionado a la CME siguiendo la forma de un croissant.




Figura 2.6: Imágenes de los coronógrafos LASCO-C2 (a1) y C3 (b1), del 18 de junio de 2015 en CR2165. Las imágenes a2 y b2 presentan los resultados de utilizar el modelo de cono elíptico (en azul), sobre la misma imagen a1 y b1. En el panel derecho se muestra la evolución de la altura (h), velocidad (V) y aceleración (a) de la CME en función del tiempo (puntos negros), además del ancho (R), la velocidad de expansión (v_e) y la aceleración de expansión (a_e) en función del tiempo (Mayank et al., 2023).

De la Figura 2.6 se puede ver que la velocidad de expansión (V_e) se mantiene al rededor de los 400 km s^{-1} durante toda la propagación, además se muestra que la aceleración de expansión disminuye una vez se haya superado la etapa de aceleración de la CME. Ahora bien, en la Figura 2.7 se muestran los datos medidos in situ

comparados con los datos recopilados por la simulación de una CME, evidenciando que la evolución de una CME a una distancia de 1 AU coincide en buena medida con los modelos utilizados.




Figura 2.7: Gráficas de velocidad radial (V_R), densidad, temperatura y campo magnético radial (B_r), tomados de OMNI (línea naranja) y de las simulaciones: Cono elíptico (línea verde) y Cuerda de flujo (línea azul). También, la línea punteada indica la llegada de la CME, que en el paper llaman CME6. (Mayank et al., 2023)

Otro trabajo de simulación de interacción de CMEs fue realizado por Lugaz et al. (2017), en donde simula la interacción de dos CMEs que en principio son idénticas, llevando velocidades iguales. Entonces, el CME secundario alcanza y sobre pasa al primer CME producido, debido a la interacción con el viento solar, el cual brinda una desaceleración al primer CME y una aceleración al segundo. Esta influencia en las aceleraciones es debida a los gradientes de presión que hay justo detrás del primer CME y al frente del segundo CME.

Se han observado CMEs de halo (e.g., R. A. Howard et al., 1982; Lamy et al., 2019), que consisten en un halo de brillo excedente que rodea completamente el disco ocultador de un coronógrafo, pareciendo propagarse hacia afuera en todas las direcciones radiales desde el Sol. Así pues, significa que la eyección se propaga a lo largo o cerca de la línea de visión del observador, dirigiéndose directamente hacia la Tierra o alejándose de ella. Las CMEs que se dirigen hacia la Tierra son críticas para el clima espacial, ya que suelen ser geoeffectivas y están vinculadas

a tormentas geomagnéticas y ondas de choque interplanetarias. Además, tienen velocidades que suelen oscilar entre 500 y 1100 km s⁻¹, superando el promedio de los eventos normales, junto con una tasa de ocurrencia del $\sim 4\%$ de todas las CMES, según Lamy et al. (e.g., 2019) y Webb y Howard (2012)

2.6. Influencia en el clima espacial

Las eyecciones de masa coronal perturban las condiciones del viento solar en el momento en que se generan en la corona solar hasta llegar a interactuar con los campos magnéticos de los planetas. En Lugaz et al. (e.g., 2017), se menciona que el paso de las CME individuales a una distancia de 1 AU tarda al rededor de un día, lo que indica que las perturbaciones de campo magnético pueden durar varias horas. Mientras que el paso de CMES que interactúan tarda más tiempo, lo que indicaría que la magnetosfera se enfrentaría, durante más tiempo, al fuerte viento solar arrastrado por el producto de la interacción de las CMES.

La interacción de las CMES con la magnetósfera de los planetas produce auroras boreales que son un indicativo de las tormentas geomagnéticas, por lo que es fácil ver que las CMES son la causa de dichas tormentas. En Carrington (1859) y Hodgson (1859), se reporta un repentino aumento del brillo del Sol el 1 de septiembre de 1859 seguido de una tormenta geomagnética 17 horas después; en Cliver (1994) se discute sobre su correlación, llegando a verificar la conexión entre ambos eventos. Las tormentas geomagnéticas corresponden a una distorsión del campo magnético de un planeta debido a un gran ingreso de energía y partículas energéticas provenientes del medio interplanetario hacia su magnetósfera a través de la interacción con una CME (e.g, T. Howard, 2014).

El flujo de campo magnético terrestre es de sur a norte, por lo que si una nube magnética con un flujo de campo magnético de norte a sur interactúa con la magnetósfera, se presentarán diferentes reconexiones magnéticas. Ésto influiría en la cantidad de líneas de campo magnético abiertas, por lo que habría líneas de campo expuestas que facilitarían el ingreso de plasma a la atmósfera terrestre y la generación de tormentas geomagnéticas. Así pues el componente hacia el sur de las nubes magnéticas o CMES interplanetarias es responsable de las tormentas (e.g., R. M. Wilson, 1987).

Las tormentas magnéticas pueden ser caracterizadas por el parámetro **DST** medido nanoTeslas (nT). Este parámetro permite determinar la intensidad de una tormenta geomagnética a través de la intensidad de la corriente anular (en inglés *Ring Current*), ésta es una corriente de partículas cargadas que circula en dirección oeste a una altura de entre 2 y 7 radios terrestres. La Ring Current es energizada por las tormentas geomagnéticas, lo cual permite clasificar dichas tormentas según el nivel de energización que le den a la Ring Current. Así pues, se puede clasificar, según Palacios et al. (e.g., 2018), en: Condiciones tranquilas o ambiente (0 a -30 nT), tormenta leve con poca actividad (-30 a -50 nT), tormenta moderada con posibles perturbaciones (-50 a -100 nT), tormenta intensa generando posibles daños a sistemas electrónicos (< -100 nT) y tormenta severa o extrema con un riesgo alto en la integridad de la electrónica en la superficie terrestre (< -200 nT). Según T. Howard (e.g., 2014), el evento Carrington en 1859 fue el evento de tormenta geomagnética más intenso registrado en la historia, teniendo un rango de **DST** de entre -1600 a -850 nT. Así pues, entre más negativa sea el DST, mayor es la tormenta geomagnética asociada, indicando al mismo tiempo la intensidad de la CME que generó dicha tormenta.

Otro parámetro para medir la intensidad de las perturbaciones geomagnéticas es el índice Kp, el cual cuantifica las perturbaciones en el campo magnético terrestre causadas principalmente por el viento solar y CMEs. El Kp se refiere a la variabilidad geomagnética medida en intervalos de 3 horas, los rangos en los que clasifica las tormentas geomagnéticas que, según Palacios et al. (e.g., 2018), son de 0 – 1 es muy tranquila, 2 – 3 es tranquila, 4 es activa, 5 es una tormenta geomagnética menor, 6 es una tormenta moderada, 7 es una tormenta fuerte, 8 es una tormenta severa y 9 es una tormenta extrema.

CAPÍTULO 3

Interacción CME - CME

*"Contempla las estrellas y aprende de ellas
la verdadera forma de honrar al Maestro.
En su silencio eterno, siguen su curso
según las leyes de Newton."*

-Albert Einstein

La interacción entre CMEs ha sido observada desde los años 2000 con ayuda del LASCO, además de tener mediciones in situ desde 1970s. Por ejemplo, Gopalswamy et al. (2001) muestra el primer estudio de la interacción de las CMEs con el experimento WAVES a bordo de la nave espacial Wind, usando señales de radio de longitudes de onda entre 21 y 280 metros. Menciona la detección de una ráfaga de tipo II estrecha en la banda de frecuencia baja, seguida de una repentina y ancha banda de radio amplificada que duró unos 36 minutos; esta ráfaga se relaciona con el choque de la CME rápida, el cual atravesó el núcleo de la CME lenta.

La interacción entre dos o más CMEs está asociada a:

- Reconexión magnética
- Intercambio de momentum
- Choque magnetosónico
- SEPs (interacción shock-shock)
- Ondas de radio inusuales (electrones acelerados)

3.1. Variación de las propiedades en la interacción

En la interacción entre CMEs, éstas pueden cambiar sus propiedades tales como su velocidad, su tamaño, su tasa de expansión, su dirección de propagación, su tiempo de llegada a la Tierra y su probabilidad de impacto con ésta última, así como el campo magnético interno en cada CME.

En Mishra et al. (e.g., 2017) se mencionan velocidades de propagación del borde o frente de varias CMEs seleccionadas, así como de la velocidad de sus centros de masa. Las CMEs seleccionadas son aquellas que presentan una interacción, por lo que el paper da información importante sobre las velocidades de las CMEs que interactúan. Además, clasifica la naturaleza de la colisión según las velocidades de expansión y de propagación de las CMEs, así como de otros parámetros. Entonces, es posible clasificar las interacciones en las categorías de perfectamente inelásticas, inelásticas, elásticas o superelásticas, usando el coeficiente de restitución que varía entre 0 y 5, calculado con ayuda de las velocidades observadas de los bordes principales y las velocidades de expansión de las CMEs antes y después de la colisión.

Los parámetros de las CMEs antes de la colisión que aumentan la probabilidad de producir una colisión superelástica (donde la energía cinética total de las CMEs aumenta después de la colisión, con un coeficiente de restitución mayor a 1) son la baja velocidad de propagación relativa entre los centroides de las CMEs, una mayor velocidad de expansión de la segunda CME producida con respecto a la primera CME. También menciona que la primera CME en emitirse por lo general se acelera, mientras que la segunda CME se desacelera.

Finalmente se recalca que la velocidad de expansión de la segunda CME lanzada, al ser mayor que la primera CME, tiene un papel crucial en aumentar la probabilidad de que la CME resultante de la interacción entre las CMEs tenga una energía cinética mayor que la total antes de la interacción.

Se considera términos como el coeficiente de restitución y la colisión inelástica vs. elástica vs. superelástica. Donde el coeficiente de restitución se entiende como el parámetro que clasifica la cantidad de rebote en una colisión y se define como:

$$e = \frac{v_{\text{después},2} - v_{\text{después},1}}{v_{\text{antes},1} - v_{\text{antes},2}} \quad (3.1)$$

En donde $v_{\text{después},2}$ y $v_{\text{después},1}$ son las velocidades de los cuerpos 2 y 1 después de

la colisión, mientras que $v_{\text{antes},1}$ y $v_{\text{antes},2}$ son las velocidades de los cuerpos 1 y 2 antes de la colisión. Véase que el numerador es la velocidad relativa después de la colisión y el denominador es la velocidad relativa antes de la colisión. Ahora bien, este coeficiente de restitución permite clasificar las interacciones CME-CME según su tipo de colisión, así:

- Con $e = 1$ es una colisión elástica que es una colisión ideal, es decir, sin pérdidas de energía.
- Con $e < 1$ es una colisión inelástica en donde hay pérdida de energía.
- Con $e > 1$ es una colisión superelástica lo que indica una ganancia de energía.

A lo largo de la propagación de las CMEs en interacción a lo largo del medio interplanetario Sol-Tierra, pueden tomar diferentes formas:

- Interacción únicamente de los dos choques de onda de las CMEs, pero sin interacción de la eyección.
- Una onda de choque de una CME secundaria interactúa con la eyección de masa de una CME anterior. En este caso la presencia de una onda de choque afecta la velocidad final de la CME resultante de la interacción entre CMEs, así pues si no hay presencia de una onda de choque la velocidad final será determinada por la CME más lenta, mientras que cuando si se encuentra una onda de choque la velocidad será definida principalmente por la CME más rápida.

Además, la onda de choque precedente a la primera CME se verá afectada al interactuar con las partes de esta primera CME, por lo que un choque se propaga más rápido dentro de una nube magnética, ya que allí la velocidad magnetosónica es elevada en su interior debido a la densidad del viento solar en esa región. Se puede dividir la interacción de la onda de choque secundaria con la CME primordial en 4 fases, según lo toma Lugaz et al., 2017:

- Cuando el choque se propaga a través de una región con una baja densidad de viento solar, por lo que se le permite ir más rápido.

- Cuando el choque entra en una nube magnética, disminuyendo su relación de compresión y aumentando su velocidad vista desde un marco en reposo; sin embargo, si el choque no es lo suficientemente rápido podría disiparse dentro de la nube magnética.
 - Cuando el choque llega a la capa densa de la CME y se desacelera.
 - Cuando ocurre la fusión de los dos choques, que según la magnetohidrodinámica, terminarán superponiéndose e intensificándose.
- Las eyecciones magnéticas sucesivas pueden interactuar y/o reconectarse, después de que el choque de la segunda CME liberada haya alcanzado a la primera, como lo toma Lugaz et al., 2005, la interacción del segundo choque con la primera CME se presenta en 4 fases.
- La primera fase es la preparación del escenario, cuando las dos CMEs son liberadas con un intervalo de tiempo de 10 horas entre cada una de las CMEs, en donde la primera CME genera perturbaciones en el viento solar para que luego la segunda CME o el choque de retaguardia pase por allí, encontrando un viento solar perturbado con menor densidad y mayor campo magnético. Justo cuando se libera la segunda CME, el choque de la primera CME está a 43.9 radios solares con una velocidad al rededor de los 625 Km/h y su nube magnética correspondiente está a 32.3 radios solares con una velocidad de 500 Km/s.

Además, la primera CME liberada presenta un incremento de masa debido al arrastre de masa coronal ambiental, eliminando parte de la masa de plasma de fondo. Por lo que su velocidad se verá afectada justo cuando empieza su ascenso junto con el viento solar, por lo que su velocidad viene dada a través de las relaciones de Rankine-Hugoniot, teniendo que:

$$V_{shock} = \frac{\rho_1 U_1 - \rho_0 U_0}{\rho_1 - \rho_0} \quad (3.2)$$

Donde U_1 es la velocidad del plasma medida aguas abajo del choque en el marco de referencia del mismo, al igual que U_0 es la velocidad del plasma aguas arriba medida desde el choque. Con el índice 0 refiriéndose a la parte aguas arriba (upstream) o en las regiones en donde aún no pasa el

choque y el índice 1 a las partes aguas abajo (downstream) o en donde ya pasó el choque. Lo que producirá finalmente, que el choque del segundo CME vaya más rápido (entre 150 y 200 km/s) a pesar de que tanto la primera como la segunda CME tienen la misma velocidad inicial, esto debido a que el primer choque se vio afectado por el arrastre de viento solar, aumentando el gradiente de presión hacia afuera y la velocidad de modo rápido para el segundo CME, llegando a que la segunda CME sobrepase a la primera lentamente.

- La segunda fase ocurre luego de 14 horas en donde el choque del segundo CME con una velocidad de 1150 km/s y un factor de compresión al rededor de 3 (con $r = \frac{\rho_1}{\rho_0} = 3$ significa que la densidad del plasma aguas abajo es 3 veces más grande que la densidad aguas arriba) alcanza a la nube magnética del primer CME, lo que genera una interacción nube magnética-choque durante 8 horas aproximadamente, el plasma de la nube magnética experimenta una transición de un plasma dominado por la presión (plasma a altas temperaturas) a uno dominado por el magnetismo (con una intensidad del campo magnético alta), esto según el parámetro β .

Donde la **velocidad Alfvénica** es la velocidad a la que se propagan las perturbaciones magnéticas en el plasma, mientras que la velocidad sónica es la velocidad a la que se propagan las perturbaciones de presión en el plasma, dada por:

$$V_{snica} = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} \quad (3.3)$$

Donde γ es la constante adiabática del gas, p es la presión del plasma y ρ es su densidad. Por lo que en Lugaz et al., 2005 se dice que cuando el segundo choque interactúa con la nube magnética del primer CME, se presenta un aumento de β lo que se traduce en una disminución de la temperatura tal que genera una presión térmica 100 veces menor a la presión magnética directamente en aguas arriba del choque, por lo que el campo magnético dominará en esa región. Por otro lado, también indica que la densidad aguas arriba es menor, por lo que el segundo choque se propagará en un medio 15 veces más tenue lo que permitirá

una aceleración del mismo hasta los 1572 km/s , además la velocidad Alfvénica se incrementa 8 veces, lo que significa que el campo magnético en conjunto con la densidad del plasma se reconfiguran de tal forma que ocurriera ese incremento, llegando a un campo magnético más intenso lo que lleva a la reducción de la relación de compresión del choque. La velocidad sónica se mantiene similar, lo que indica que las variaciones en la presión del plasma y en su densidad son directamente proporcionales, de tal forma que su razón se mantenga casi igual. Por otro lado, está el parámetro Mach de Alfvén, el cual permite ver si las perturbaciones magnéticas se mueven más o menos rápido que el mismo plasma, definido como:

$$M_A = \frac{V}{V_a} \quad (3.4)$$

Donde V es la velocidad característica del viento solar y V_A es la velocidad de Alfvén. En este caso el plasma aguas arriba es sub-Alfvénico localmente, es decir que tiene un número Mach menor a 1: $M_A < 1$, al rededor de 0.81, según Lugaz et al., 2005. Una vez que el choque interactúe con la nube magnética, presentará una desaceleración debido al aumento de la densidad del plasma aguas arriba, afectando la velocidad del choque V_{shock} , ya que ρ_0 será mayor por lo que la velocidad disminuirá.

- La tercera etapa ocurre cuando el choque de la segunda CME avanza hasta encontrarse con la vaina que es la estructura densa que recubre la nube magnética de la primera CME. Recordando que la nube magnética y la sheath están separadas por una discontinuidad, en donde se puede considerar sin magnetización, de tal forma que la presión del plasma es la que domina completamente, es decir que el parámetro β es mayor o igual a 2000, indicando que la presión térmica es 2000 veces más intensa que la presión magnética. Además, la velocidad del sonido en esta región es más grande que en la nube magnética, al rededor de 1,5 veces más rápida y la densidad del plasma 2 veces más grande que la densidad de la nube magnética. Ahora bien, como la velocidad del choque cambia debido a las densidades aguas arriba y aguas abajo, se presentará una desaceleración del choque, puesto que entra a una región con una densidad mayor lo

cual según la ecuación de V_{shock} , indica que la velocidad disminuirá de 850 a 700 km/s, aun así la velocidad del choque es suficiente como para rebasar al choque de la primera CME, todo esto mencionado en Lugaz et al., 2005.

- Para la última fase se tiene que los dos choques interactúan formando un nuevo choque que se propaga hacia el viento solar no perturbado, para luego llegar hasta la Tierra, seguido de la primera y segunda nube magnética. p.4 El choque resultante es más fuerte que los otros dos anteriores, ya que tiene una relación de compresión de 3.59 comparado con el 1.52 y 3.13 del segundo y del primer choque. Así pues, este nuevo choque generado calienta las regiones por donde va pasando al mismo tiempo que disminuye la densidad del plasma en las regiones aguas abajo del nuevo choque.

También se presenta la interacción entre las dos nubes magnéticas recordando que la primera ya interactuó con el choque de la segunda, por lo que la primera nube se comprimió y se aceleró antes de entrar en contacto con la segunda. Por otro lado, en Lugaz et al., 2005 se muestra una reconexión y un choque inverso asociado con la colisión de las dos nubes magnéticas. Cuando las dos nubes magnéticas colisionan ya ha pasado el segundo choque a través de la primera lo que significa que este modificó la velocidad de la nube magnética aguas abajo, lo que lleva a que se presente una zona de reconexión suave entre las dos nubes magnéticas. Esta zona de reconexión tiene un ancho entre 2 y 3 radios solares, con una velocidad en su frente similar a la velocidad aguas abajo del choque que acaba de pasar por la primera CME (esta velocidad empezará a disminuir a medida que el choque se aleje de ella), y una velocidad posterior similar a la velocidad en el frente de la segunda CME, lo que significa que la zona de reconexión presenta una compresión, ya que su parte trasera se mueve más rápido que su parte frontal. Además, la reconexión disminuye la velocidad Alfvénica en esa zona lo que llevaría a que la diferencia de velocidades frontales y posteriores de la zona de reconexión se volviera Super-Alfvénica localmente, lo que a su vez generaría un choque inverso de modo rápido. Este choque reduce la velocidad posterior de la zona de reconexión así como el frente de

la segunda nube magnética, además de aumentar la temperatura, la densidad y el campo magnético. En la propagación del choque inverso a lo largo de la segunda nube magnética, se desacelera perdiendo fuerza y efectividad hasta desaparecer en la parte posterior de la segunda nube magnética.

Ahora, la segunda nube magnética presenta una evolución en el tiempo, ya que debido a la colisión con la primera nube magnética presenta una desaceleración además de volver a desacelerarse posteriormente con la interacción con el choque inverso, mientras que la primera nube presenta una aceleración resultante de la interacción con el segundo choque p.9, cabe señalar que antes de esta interacción la primera nube se estaba desacelerando debido a su expansión

- Ni las CMEs ni sus choques llegan a interactuar. Estos casos afectan el flujo de SEPs y la propagación de la segunda CME, la cual sale de la misma región pero con una diferencia de tiempo considerable. Por lo que, el primer CME eliminó parte del viento solar que había en la trayectoria de la segunda CME lo que indicaría que la segunda CME no presentaría tanta desaceleración como la primera. Así pues, se evidenciaría que el tiempo de tránsito se reduce por una presencia de dos CMEs sin interacción, la primer CME desplaza el material frente a ella despejando el camino para que el segundo alcance una mayor velocidad al desplazarse por las regiones previamente despejadas.

3.2. Estructuras resultantes de la interacción

La estructura más simple resultante es una múltiple nube magnética, que consiste en una nube magnética precedida por otras. Una nube magnética está asociada con las CMEs, una nube magnética es una estructura coherente (que mantiene su estructura y forma en el tiempo), grande y compacta de campo magnético que viaja a través del medio interplanetario. Las características de una nube magnética consisten en:

- Tener un campo magnético intenso, mayor al del medio interplanetario
- Baja temperatura del plasma en comparación con el viento solar normal

- Baja beta del plasma, es decir que:

$$\beta = \frac{P_{\text{térmica}}}{P_{\text{magnética}}} \ll 1 \quad (3.5)$$

Lo que significa que el campo magnético domina sobre la presión térmica, ya que la presión magnética es mayor (la nube magnética es una estructura coherente) y la presión térmica es menor (el plasma es más frío). Donde $P_{\text{Térmica}} = nkT$, con n la densidad molar del plasma, k es la constante de Boltzmann y T es la temperatura del plasma. Por otro lado, la $P_{\text{Magnética}} = \frac{B^2}{2\mu_0}$ con B la intensidad del campo magnético y μ_0 es la permeabilidad del vacío. Recordando que el parámetro adimensional β permite comparar la presión térmica del plasma con la presión magnética del campo magnético contenido en el mismo, permitiendo identificar su estabilidad, así:

- $\beta \ll 1$: El campo magnético domina sobre la presión térmica
- $\beta = 1$: Ambas presiones son comparables
- $\beta \sim 1$: La presión térmica domina, por lo que el campo magnético tiene poca influencia

Otra estructura que se puede formar son las eyecciones complejas, en donde las nubes magnéticas no son distinguibles entre sí, lo que indica que tendrá un campo magnético complejo, a diferencia de una múltiple nube magnética. Otra estructura sería los eventos de larga duración, en donde las nubes magnéticas están muy separadas entre sí, lo que evita que se fusionen.

En Lugaz et al. (e.g., 2017) se menciona que el segundo choque es fundamental para que la interacción evolucione hasta tener características similares a múltiples nubes magnéticas, aumentando la geoeffectividad de las CMEs al interactuar con la magnetosfera terrestre. Además, permitiendo la homogeneización de la velocidad junto con el choque inverso que desacelera la segunda nube magnética. Todo en conjunto permite ver a 1 AU que las eyecciones complejas debidas a la interacción de las CME presentan velocidades homogéneas. Por otro lado, la interacción entre dos CMEs podría generar una tormenta geomagnética de doble inmersión que es aquella en la que el DST muestra dos descensos pronunciados separados en el tiempo, lo que sugiere dos fases de intensificación.

Además, Lugaz et al. (e.g, 2005) encuentra que las dos nubes magnéticas evolucionan hasta llegar a una forma similar a múltiples nubes magnéticas, presentando dos regiones con un campo magnético intenso separadas por una región de alta temperatura. También, se encuentra que la primera nube magnética está comprimida y la segunda está sobre-expandida.

3.3. Interacción CME-CME y los eventos de SEPs

Otro fenómeno que ocurre gracias a la interacción de CMEs es la generación de eventos SEPs por el choque magnetohidrodinámico (e.g., Sokolov et al., 2004), puesto que la mayoría de las CME productoras de SEPs se propagan a través del medio interplanetario cercano al Sol gravemente perturbado y distorsionado por las CME anteriores, además de enriquecido con partículas semilla aptas para convertirse en SEPs (e.g., Gopalswamy et al., 2004; Lugaz et al., 2005).

Las SEPs están relacionadas con dos fenómenos principales:

- Las Llamadas solares
- Las CMEs y sus ondas de choque

La forma de medir la intensidad de SEPs que presenta una erupción es a través de las unidades de flujo de partículas, definido como:

$$1\text{pfu} = 1 \text{ protón por } \text{cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{sr}^{-1} \quad (3.6)$$

Ahora, se cree que la aceleración de las SEPs ocurre dentro de los primeros 10 Radios solares, lo que hace que la interacción entre los choques de las CMEs sea menos probable de causar esta aceleración, puesto que la mayoría de las interacciones ocurren fuera de esos 10 radios solares.

La interacción entre dos ondas de choque dentro de un medio rico en partículas semilla y en turbulencias puede aumentar la energía máxima de las partículas. Además, el 60 % de las CMEs gemelas conducen a grandes eventos de SEPs, mientras que solo el 20 % de CMEs simples conducen a grandes eventos de SEPs, según Lugaz et al., 2017. Por otro lado, la geometría del frente del CME también puede afectar la producción de SEPs y la energía con la que se liberan.

Los electrones del plasma presentan una aceleración en la interacción CME-CME que es posible detectar a través de las señales de ondas electromagnéticas en el rango de las ondas de radio, esto es porque un electrón emite radiación cuando es acelerado. Así pues, cuando se miden o se detectan señales de radio se asocian con procesos de aceleración de partículas. Se ha encontrado que la emisión de señales de radio de tipo II coinciden con la interacción entre el frente de una CME secundaria y una primera CME ocurrida antes.

Cabe señalar los diferentes tipos de emisiones de ondas de radio debido a electrones acelerados, tenemos:

- Tipo I: Provenientes de emisiones casi continuas, con ráfagas breves y estrechas en frecuencia que se asocian a regiones activas solares con pequeños eventos de reconexión. Su duración va desde horas hasta días.
- Tipo II: Emisiones lentas producidas por ondas de choque en la corona solar o en el medio interplanetario, típicamente impulsadas por una CME rápida. Se interpretan como electrones acelerados en el frente de choque que excitan ondas de Langmuir relacionadas con la conversión a ondas de radio. Es una señal de que hay un frente de choque presente, útil para diagnosticar la velocidad de propagación de las CMEs.
- Tipo III: Provenientes de ráfagas muy rápidas de alta frecuencia a baja frecuencia generadas por haces de electrones acelerados que viajan por líneas de campo magnético abiertas o cuasi-abiertas hacia el espacio interplanetario. Además, asociadas a reconexiones magnéticas rápidas, como en llamaradas solares durando segundos.
- Tipo IV: Relacionada con la emisión de banda ancha más lenta y sostenida asociada a plasma atrapado en estructuras magnéticas grandes como lóbulos cerrados de CMEs durando minutos u horas.
- Tipo V: Es una emisión de fondo difusa, más suave y continua, que sigue a una ráfaga tipo III que dura al rededor de decenas de segundos, se cree que es generado por electrones remanentes más térmicos.

En Gonzalez-Esparza et al., 2004 se habla sobre un modelo magnetohidrodinámico en 1D y 2D que busca estudiar la interacción entre CMEs, lejos de la superficie solar para evitar las reconexiones magnéticas. Así pues, para hacer la simulación se emiten dos CMEs, la primera más lenta que la segunda de tal forma que en un momento la segunda pase a la primera y genere la interacción. Utilizan el código ZEUS-3-D, el cual resuelve las ecuaciones magnetohidrodinámicas ideales, es decir, que no son resistivas ni viscosas, pero tomando que la contribución magnética es mínima.

Ahora, generan las características del viento solar especificando su velocidad, densidad y temperatura en la frontera en donde se puede despreciar los efectos magnéticos, es decir, a 18 radios solares según el artículo, para luego dejar que evolucionara y llegara a un estado estacionario. En seguida, se lanzan las perturbaciones de tipo eyección las cuales presentan una velocidad y generan pequeños incrementos en densidad y temperatura.

Así pues, la simulación se puede generar en 1D o en 2D. Para 1D se inyectaron 2 CMEs con intervalo de 15 horas, generando datos a intervalos de 20, 40 y 70 horas después del primer lanzamiento (los resultados de la simulación se muestran en la figura 3.3), la primera CME con una velocidad de 450 km/s y la segunda a 800 km/s , en un viento solar con una velocidad de 400 km/s , además se tiene en cuenta las características del viento solar a una distancia de 0.083 AU, en donde se colocan condiciones de frontera (tanto para 1D como para 2D) así como a 1AU, mostradas en la tabla 3.1.

	Ro	1.0 AU	
		1-D	2-D
N [cm^{-3}]	990	6.4	6.1
T [10^5K]	4.5	0.49	0.48
V [km/s]	400	426	447

Figura 3.1: Características del ambiente del viento solar a 0.083AU y a 1AU

Por otro lado, las condiciones de las CMEs generadas en la simulación de 1D, se muestran en la tabla 3.2.

	V_e [km/s]	ΔT_e	ΔN_e	τ_e [h]	M_e [10^{16} g]	K_e [10^{31} ergs]
ejecta 1	450	1.2	1.2	5.0	3.1	3.14
ejecta 2	800	1.2	1.2	6.0	6.6	21.1

Figura 3.2: Características de las CMEs, con V_e las velocidades de las CMEs, incremento de la densidad $\Delta N_e = N_e/N_0$ y de la temperatura $\Delta T_e = T_e/T_0$, τ_e como la duración de la generación de la CME, M_e es la masa total y U_e es la energía cinética total.




Figura 3.3: Resultados de la simulación a 1D, con intervalos de tiempo diferentes, donde e1 y e2 son la primera y segunda CME, respectivamente; s1 y s2 son las ondas de choque de las CME 1 y 2, respectivamente.

Ya para 2D se tiene que las condiciones de las CMEs generadas son las mostradas en la tabla 3.4.

	U_e [km/s]	ΔT_e	ΔN_e	τ_e [h]	M_e [10^{16} g]	K_e [10^{31} ergs]
ejecta 1	600	1.2	1.2	4.0	0.51	0.92
ejecta 2	1600	1.2	1.2	4.0	2.86	36.6

Figura 3.4: Condiciones de las CME utilizadas en la simulación en 2D

Para esta simulación se tiene en cuenta la dirección de propagación de las CMEs, así como su tamaño angular. También, el intervalo de tiempo entre los lanzamientos de las 2 CMEs es de 15 horas. Los resultados de esta simulación se muestran en las figuras 3.5 y 3.6.




Figura 3.5: Simulación en 2D, las gráficas muestran el comportamiento de la velocidad, la densidad y la temperatura del viento solar en diferentes direcciones, 19 horas después del lanzamiento de la CME1




Figura 3.6: Similar a la figura 3.5 pero 29 horas después del lanzamiento de la CME1

Se evidencia que la complejidad de la simulación aumenta cuando se utilizan 2 dimensiones. Cabe señalar que se utiliza un modelo hidrodinámico, ya que la interacción ocurre en regiones en donde no hay re-conexión magnética. Además, el paper llega a la conclusión de que hay una transferencia de momentum entre las CMEs, en donde la CME2 con una velocidad mayor transfiere momentum a la CME1 a través de la onda de choque de la CME2 que comprime y acelera la CME1. Cuando llegan a 1AU, las dos CMEs llevan velocidades similares, pero la CME1 un poco más rápida que la CME2, además las ondas de choque se superponen y forman una única onda de choque más intensa.

Por otro lado, <empty citation> realiza una simulación en 2.5D, es decir que considera dos dimensiones espaciales y la tercera dimensión la considera parcialmente, lo que reduce el gasto computacional de la simulación, la cual se basa en un modelo magnetohidrodinámico. La simulación busca ver el comportamiento de las nubes magnéticas, su interacción con otras nubes magnéticas y la formación de nubes

múltiples en la heliosfera. Para correr la simulación primero se modela una nube magnética como una línea de flujo en 2.5D. Cabe señalar que la simulación se realiza en coordenadas esféricas. Una vez modeladas las dos líneas de flujo, se les permite propagarse la primera con una velocidad menor a la segunda y separadas un intervalo de 12 horas entre la primera y la segunda. El artículo reporta que la segunda CME tarde 18 horas en alcanzar a la primera CME, por lo que en ese momento interactúan y generan una nube magnética múltiple que llega hasta 1AU. Además, menciona que la segunda nube magnética se ve desacelerada debido a la interacción con la primera nube magnética, por lo que el tiempo de viaje de la nube magnética múltiple depende de la velocidad de la primera CME (lenta).

CAPÍTULO 4

Problema

"Los hombres viven en un planeta insignificante de una estrella trivial perdida en la inmensidad de una galaxia que no es más que una entre millones. Pero eso no nos hace insignificantes. Nos hace afortunados."

-Isaac Asimov

CAPÍTULO 5

Análisis de resultados

CAPÍTULO 6

Discusión

CAPÍTULO 7

Conclusiones y perspectivas

Bibliografía

- A&G Volume 62 Issue 3, Full Issue. (2021). *Astronomy & Geophysics*, 62(3). <https://doi.org/10.1093/astrogeo/atab061>
- Artemyev, A., Neishtadt, A., Vainchtein, D., Vasiliev, A., Vasko, I., & Zelenyi, L. (2018). Trapping (capture) into resonance and scattering on resonance: Summary of results for space plasma systems. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 65, 111-160. <https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.05.004>
- Asplund, M., Grevesse, N., Sauval, A. J., & Scott, P. (2009). The chemical composition of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 47(1), 481-522. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145222>
- Bahcall, J. N., Serenelli, A. M., & Basu, S. (2005). New solar opacities, abundances, helioseismology, and neutrino fluxes. *The Astrophysical Journal*, 621(1), L85-L88. <https://doi.org/10.1086/428929>
- Bahcall, J. N., & Ulrich, R. K. (1988). Solar models, neutrino experiments, and helioseismology. *Reviews of Modern Physics*, 60(2), 297-372. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.60.297>
- Bein, B. M., Berkebile-Stoiser, S., Veronig, A. M., Temmer, M., Muhr, N., Kienreich, I., Utz, D., & Vršnak, B. (2011). IMPULSIVE ACCELERATION OF CORONAL MASS EJECTIONS. i. STATISTICS AND CORONAL MASS EJECTION SOURCE REGION CHARACTERISTICS. *The Astrophysical Journal*, 738(2), 191. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/738/2/191>
- Biermann, L. (1951). Kometenschweife und solare Korpuskularstrahlung. *Zeitschrift für Astrophysik*, 29, 274.

- Browning, P. K., & Priest, E. R. (1986). The shape of buoyant coronal loops in a magnetic field and the eruption of coronal transients and prominences. *Solar Physics*, 106(2), 335-351. <https://doi.org/10.1007/bf00158500>
- Carlsson, M., De Pontieu, B., & Hansteen, V. H. (2019). New view of the solar chromosphere. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 189-226. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-081817-052044>
- Carrington, R. C. (1859). Description of a Singular Appearance seen in the Sun on September 1, 1859. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 20(1), 13-15. <https://doi.org/10.1093/mnras/20.1.13>
- Cermak, A. (2025, enero). - NASA Science. <https://science.nasa.gov/learn/heat/big-ideas/big-idea-3-1/>
- Christensen-Dalsgaard, J. (2002). Helioseismology. *Reviews of Modern Physics*, 74(4), 1073-1129. <https://doi.org/10.1103/revmodphys.74.1073>
- Cliver, E. W. (1994). Solar activity and geomagnetic storms: The corpuscular hypothesis. *Eos*, 75(52), 609-613. <https://doi.org/10.1029/94eo02060>
- Cowling, T. G. (1976, enero). *Magnetohydrodynamics*.
- Cranmer, S. R. (2009). Coronal holes. *Living Reviews in Solar Physics*, 6. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2009-3>
- Cranmer, S. R., & Winebarger, A. R. (2019). The properties of the Solar Corona and its connection to the solar wind. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 57(1), 157-187. <https://doi.org/10.1146/annurev-astro-091918-104416>
- Curd, P. (2010). *Anaxagoras of Clazomenae: Fragments and Testimonia : a Text and Translation with Notes and Essays*. University of Toronto Press. <https://books.google.com.ni/books?id=240MF0fzc8wC>
- Emslie, A. G., Dennis, B. R., Shih, A. Y., Chamberlin, P. C., Mewaldt, R. A., Moore, C. S., Share, G. H., Vourlidas, A., & Welsch, B. T. (2012). GLOBAL ENERGETICS OF THIRTY-EIGHT LARGE SOLAR ERUPTIVE EVENTS. *The Astrophysical Journal*, 759(1), 71. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/759/1/71>
- Feynman, J., & Hundhausen, A. J. (1994). Coronal mass ejections and major solar flares: The great active center of March 1989. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 99(A5), 8451-8464. <https://doi.org/10.1029/94ja00202>

- Fiorentini, G., Ricci, B., & Villante, F. L. (2004). Nuclear fusion in the Sun. *Progress of Theoretical Physics Supplement*, 154, 309-316. <https://doi.org/10.1143/ptps.154.309>
- Fisher, R., Garcia, C. J., & Seagraves, P. (1981). On the coronal transient-eruptive prominence of 1980 August 5. *The Astrophysical Journal*, 246, L161. <https://doi.org/10.1086/183575>
- Forbes, T. G. (2000). A review on the genesis of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 105(A10), 23153-23165. <https://doi.org/10.1029/2000ja000005>
- Gallagher, P. T., Lawrence, G. R., & Dennis, B. R. (2003). Rapid acceleration of a coronal mass ejection in the low corona and implications for propagation. *The Astrophysical Journal*, 588(1), L53-L56. <https://doi.org/10.1086/375504>
- Glatzmaier, G. A. (1985). Numerical simulations of stellar convective dynamos III. At the base of the convection zone. *Geophysical & Astrophysical Fluid Dynamics*, 31(1-2), 137-150. <https://doi.org/10.1080/03091928508219267>
- Gnevyshev, M. (1977). Essential features of the 11-year solar cycle. *Solar Physics*, 51(1). <https://doi.org/10.1007/bf00240455>
- Gonzalez-Esparza, A., Santillán, A., & Ferrer, J. (2004). A numerical study of the interaction between two ejecta in the interplanetary medium: one- and two-dimensional hydrodynamic simulations. *Annales Geophysicae*, 22(10), 3741-3749. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-3741-2004>
- Gopalswamy, N., Lara, A., Lepping, R. P., Kaiser, M. L., Berdichevsky, D., & St Cyr, O. C. (2000). Interplanetary acceleration of coronal mass ejections. *Geophysical Research Letters*, 27(2), 145-148. <https://doi.org/10.1029/1999gl003639>
- Gopalswamy, N., Mäkelä, P., Xie, H., Akiyama, S., & Yashiro, S. (2009). CME interactions with coronal holes and their interplanetary consequences. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 114(A3). <https://doi.org/10.1029/2008ja013686>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Kaiser, M. L., Howard, R. A., & Bougeret, J. (2001). Radio Signatures of Coronal mass ejection interaction: Coronal Mass ejection Cannibalism? *The Astrophysical Journal*, 548(1), L91-L94. <https://doi.org/10.1086/318939>

- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Krucker, S., Stenborg, G., & Howard, R. A. (2004). Intensity variation of large solar energetic particle events associated with coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 109(A12). <https://doi.org/10.1029/2004ja010602>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Liu, Y., Michalek, G., Vourlidas, A., Kaiser, M. L., & Howard, R. A. (2005). Coronal mass ejections and other extreme characteristics of the 2003 October–November solar eruptions. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 110(A9). <https://doi.org/10.1029/2004ja010958>
- Gopalswamy, N., Yashiro, S., Michalek, G., Xie, H., Mäkelä, P., Vourlidas, A., & Howard, R. (2010). A catalog of halo coronal mass ejections from SOHO. *Sun and Geosphere*, 5(1), 7-16.
- Gosling, J. T., Hildner, E., MacQueen, R. M., Munro, R. H., Poland, A. I., & Ross, C. L. (1976). The speeds of coronal mass ejection events. *Solar Physics*, 48(2), 389-397. <https://doi.org/10.1007/bf00152004>
- Gui, B., Shen, C., Wang, Y., Ye, P., Liu, J., Wang, S., & Zhao, X. (2011). Quantitative analysis of CME deflections in the Corona. *Solar Physics*, 271(1-2), 111-139. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9791-9>
- Hansen, R. T., Garcia, C. J., Groganard, R. J.-m., & Sheridan, K. V. (1971). A Coronal Disturbance Observed Simultaneously with a White-Light Coronameter and the 80 MHz Culgoora Radioheliograph. *Publications of the Astronomical Society of Australia*, 2(1), 57-60. <https://doi.org/10.1017/s1323358000012856>
- Hathaway, D. H. (2015). The solar cycle. *Living Reviews in Solar Physics*, 12(1). <https://doi.org/10.1007/lrsp-2015-4>
- Hathaway, D. H., Wilson, R. M., & Reichmann, E. J. (1994). The shape of the sunspot cycle. *Solar Physics*, 151(1), 177-190. <https://doi.org/10.1007/bf00654090>
- Hodgson, R. (1859). On a curious Appearance seen in the Sun. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 20(1), 15-16. <https://doi.org/10.1093/mnras/20.1.15a>
- Howard, R. A., Michels, D. J., Sheeley, N. R. J., & Koomen, M. J. (1982). The observation of a coronal transient directed at earth. *The Astrophysical Journal*, 263, L101. <https://doi.org/10.1086/183932>
- Howard, T. (2014). *Space Weather and Coronal Mass Ejections*. SpringerBriefs in Astronomy. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7975-8>

- Hughes, D. W., Rosner, R., & Weiss, N. O. (2007, mayo). *The Solar Tachocline*. Cambridge University Press.
- Hughes, S. (2024). A new look at orbits. *Physics Education*, 59(2), 023002. <https://doi.org/10.1088/1361-6552/ad1b21>
- Judge, P. (2020). *The Sun: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Kahler, S. W. (1992). Solar flares and coronal mass ejections. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 30(1), 113-141. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.30.090192.000553>
- Kahler, S. W., Hildner, E., & Van Hollebeke, M. A. I. (1978). Prompt solar proton events and coronal mass ejections. *Solar Physics*, 57(2), 429-443. <https://doi.org/10.1007/bf00160116>
- Kahler, S. W., McGuire, R. E., Reames, D. V., Von Rosenvinge, T. T., Sheeley, N. R., Howard, R. A., Michels, D. J., & Koomen, M. J. (1983). The correlation of coronal mass ejections with energetic flare proton events. *International Cosmic Ray Conference*, 4, 6-. <https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=19850040711>
- Kopal, Z. (1966, enero). *Hydrostatic equilibrium*. https://doi.org/10.1007/978-94-011-7545-6_{_}7
- Kossobokov, V., Mouël, J.-L. L., & Courtillot, V. (2011). On Solar Flares and Cycle 23. *Solar Physics*, 276(1-2), 383-394. <https://doi.org/10.1007/s11207-011-9860-0>
- Lamy, P. L., Floyd, O., Boclet, B., Wojak, J., Gilardy, H., & Barlyaeva, T. (2019). Coronal Mass Ejections over Solar Cycles 23 and 24. *Space Science Reviews*, 215(5). <https://doi.org/10.1007/s11214-019-0605-y>
- Leighton, R. B. (1963). The solar granulation. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 1(1), 19-40. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.01.090163.000315>
- Longcope, D. (2020, marzo). Solar Flares. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190871994.013.20>
- Low, B. C. (1996). Solar activity and the corona. *Solar Physics*, 167(1-2), 217-265. <https://doi.org/10.1007/bf00146338>
- Low, B. (1994). Coronal mass ejections and magnetic helicity. *Solar Dynamic Phenomena and Solar Wind Consequences, the Third SOHO Workshop*, 373, 123.

- Lugaz, N., Manchester, W. B., IV, & Gombosi, T. I. (2005). Numerical Simulation of the Interaction of Two Coronal Mass Ejections from Sun to Earth. *The Astrophysical Journal*, 634(1), 651-662. <https://doi.org/10.1086/491782>
- Lugaz, N., Temmer, M., Wang, Y., & Farrugia, C. J. (2017). The interaction of successive coronal mass ejections: a review. *Solar Physics*, 292(4). <https://doi.org/10.1007/s11207-017-1091-6>
- Lyman, J. S. (1939). The dissipation of planetary filaments. *The Astrophysical Journal*, 90, 675. <https://doi.org/10.1086/144138>
- Mayank, P., Vaidya, B., & Chakrabarty, D. (2022). SWASTI-SW: Space Weather Adaptive Simulation Framework for Solar Wind and its relevance to the Aditya-L1 Mission. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 262(1), 23. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ac8551>
- Mayank, P., Vaidya, B., Mishra, W., & Chakrabarty, D. (2023). SWASTi-CME: A Physics-based Model to Study Coronal Mass Ejection Evolution and Its Interaction with Solar Wind. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 270(1), 10. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/ad08c7>
- McComas, D. J., Elliott, H. A., Schwadron, N. A., Gosling, J. T., Skoug, R. M., & Goldstein, B. E. (2003). The three-dimensional solar wind around solar maximum. *Geophysical Research Letters*, 30(10). <https://doi.org/10.1029/2003gl017136>
- Mishra, W., Wang, Y., Srivastava, N., & Shen, C. (2017). Assessing the nature of collisions of coronal mass ejections in the inner heliosphere. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 232(1), 5. <https://doi.org/10.3847/1538-4365/aa8139>
- Odstreil, D., Linker, J. A., Lionello, R., Mikic, Z., Riley, P., Pizzo, V. J., & Luhmann, J. G. (2002). Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 107(A12). <https://doi.org/10.1029/2002ja009334>
- Ossendrijver, M. (2003). The solar dynamo. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 11(4), 287-367. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0019-3>
- Palacios, J., Guerrero, A., Cid, C., Saiz, E., & Cerrato, Y. (2018). Defining scale thresholds for geomagnetic storms through statistics. *Natural Hazards and*

- Earth System Sciences Discussions*, 2018, 1-17. <https://doi.org/10.5194/nhess-2018-92>
- Parker, E. N. (1958). Dynamics of the interplanetary gas and magnetic fields. *The Astrophysical Journal*, 128, 664. <https://doi.org/10.1086/146579>
- Pevtsov, A. A. (2000). Transequatorial Loops in the Solar Corona. *The Astrophysical Journal*, 531(1), 553. <https://doi.org/10.1086/308467>
- Photographs and Drawings of the Corona. (1879). *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 41, 575.
- Pitjeva, E. V., Pitjev, N. P., Pitjeva, E. V., & Pitjev, N. P. (2012). Changes in the Sun's mass and gravitational constant estimated using modern observations of planets and spacecraft. *Solar System Research*, 46(1), 78-87. <https://doi.org/10.1134/s0038094612010054>
- Riley, P., & Crooker, N. U. (2004). Kinematic treatment of coronal mass ejection evolution in the solar Wind. *The Astrophysical Journal*, 600(2), 1035-1042. <https://doi.org/10.1086/379974>
- Robbrecht, E., Berghmans, D., & Van Der Linden, R. A. M. (2009). AUTOMATED LASCO CME CATALOG FOR SOLAR CYCLE 23: ARE CMEs SCALE INVARIANT? *The Astrophysical Journal*, 691(2), 1222-1234. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/691/2/1222>
- Rozelot, J., Kosovichev, A., & Kilcik, A. (2018). How big is the Sun: Solar diameter changes over time. *Cornell University*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.1804.06930>
- Schou, J., Antia, H. M., Basu, S., Bogart, R. S., Bush, R. I., Chitre, S. M., Christensen-Dalsgaard, J., Di Mauro, M. P., Dziembowski, W. A., Eff-Darwich, A., Gough, D. O., Haber, D. A., Hoeksema, J. T., Howe, R., Korzennik, S. G., Kosovichev, A. G., Larsen, R. M., Pijpers, F. P., Scherrer, P. H., ... Toomre, J. (1998). Helioseismic studies of differential rotation in the solar envelope by the solar oscillations Investigation using the Michelson Doppler Imager. *The Astrophysical Journal*, 505(1), 390-417. <https://doi.org/10.1086/306146>
- Schrijver, C. J. (2008). Driving major solar flares and eruptions: A review. *Advances in Space Research*, 43(5), 739-755. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2008.11.004>
- Schwenn, R. (2007). Solar wind sources and their variations over the solar cycle. *Space Science Reviews*, 124(1-4), 51-76. <https://doi.org/10.1007/s11214-006-9099-5>

- Sheeley, N. R., Walters, J. H., Wang, Y.-m., & Howard, R. A. (1999). Continuous tracking of coronal outflows: Two kinds of coronal mass ejections. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 104(A11), 24739-24767. <https://doi.org/10.1029/1999ja900308>
- Singh, T., Hegde, D. V., Kim, T. K., & Pogorelov, N. V. (2025). Magnetohydrodynamic Simulation of a Coronal Mass Ejection Observed during the Near-radial Alignment of Solar Orbiter and Earth. *The Astrophysical Journal*, 981(1), 53. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/adb1ac>
- Sokolov, I. V., Roussev, I. I., Gombosi, T. I., Lee, M. A., Kóta, J., Forbes, T. G., Manchester, W. B., & Sakai, J. I. (2004). A New Field Line Advection Model for Solar Particle Acceleration. *Astrophysical Journal Letters*, 616(2), L171-L174. <https://doi.org/10.1086/426812>
- Solanki, S. K. (2003). Sunspots: An overview. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 11(2-3), 153-286. <https://doi.org/10.1007/s00159-003-0018-4>
- Sonett, C. P., Colburn, D. S., Davis, L., Smith, E. J., & Coleman, P. J. (1964). Evidence for a Collision-Free Magnetohydrodynamic Shock in interplanetary Space. *Physical Review Letters*, 13(5), 153-156. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.13.153>
- Spiegel, E. A., & Zahn, J.-P. (1992). The solar tachocline. *Astronomy and Astrophysics*, 265(1), 106-114. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992A&A...265..106S/abstract>
- Stakhiv, M., Landi, E., Lepri, S. T., Oran, R., & Zurbuchen, T. H. (2015). ON THE ORIGIN OF MID-LATITUDE FAST WIND: CHALLENGING THE TWO-STATE SOLAR WIND PARADIGM. *The Astrophysical Journal*, 801(2), 100. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/801/2/100>
- Standish, E. M. (2004). The Astronomical Unit now. *Proceedings of the International Astronomical Union*, 2004(IAUC196), 163-179. <https://doi.org/10.1017/s1743921305001365>
- Stein, R. F. (2012). Solar Surface Magneto-Convection. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-4>
- Stix, M. (2002, enero). *The Sun*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56042-2>
- Stone, E. C., Cummings, A. C., McDonald, F. B., Heikkila, B. C., Lal, N., & Webber, W. R. (2013). Voyager 1 observes Low-Energy galactic cosmic rays

- in a region depleted of heliospheric ions. *Science*, 341(6142), 150-153. <https://doi.org/10.1126/science.1236408>
- Strugarek, A., Belucz, B., Brun, A. S., Dikpati, M., & Guerrero, G. (2023). Dynamics of the Tachocline. *Space Science Reviews*, 219(8), 87. <https://doi.org/10.1007/s11214-023-01027-0>
- Subramanian, S. P., Shanmugaraju, A., & Vrřnak, B. (2016). Comparison of ICME parameters using drag based model for interacting and non-interacting CMEs. *Central European astrophysical bulletin*, 40, 177-195. <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016CEAB...40..177P/abstract>
- Sweet, P. A. (1969). Mechanisms of Solar Flares. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 7, 149. <https://doi.org/10.1146/annurev.aa.07.090169.001053>
- Thompson, M. J. (2004). Helioseismology and the Sun's interior. *Astronomy & Geophysics*, 45(4), 4.21-4.25. <https://doi.org/10.1046/j.1468-4004.2003.45421.x>
- Thompson, M. J., Christensen-Dalsgaard, J., Miesch, M. S., & Toomre, J. (2003). The internal rotation of the sun. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 41(1), 599-643. <https://doi.org/10.1146/annurev.astro.41.011802.094848>
- Tousey, R. (1973). The solar corona. *Space research conference*, 2, 713-730.
- Vaquero, J., & Vázquez, M. (2009, mayo). *The Sun recorded through history*. Springer.
- Vourlidas, A., Colaninno, R., Nieves-Chinchilla, T., & Stenborg, G. (2011). THE FIRST OBSERVATION OF a RAPIDLY ROTATING CORONAL MASS EJECTION IN THE MIDDLE CORONA. *The Astrophysical Journal Letters*, 733(2), L23. <https://doi.org/10.1088/2041-8205/733/2/L23>
- Vourlidas, A., Howard, R. A., Esfandiari, E., Patsourakos, S., Yashiro, S., & Michalek, G. (2010). COMPREHENSIVE ANALYSIS OF CORONAL MASS EJECTION MASS AND ENERGY PROPERTIES OVER a FULL SOLAR CYCLE. *The Astrophysical Journal*, 722(2), 1522-1538. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/722/2/1522>
- Vrřnak, B., Žic, T., Vrbanec, D., Temmer, M., Rollett, T., Möstl, C., Veronig, A., Čalogović, J., Dumbović, M., Lulić, S., Moon, Y.-j., & Shanmugaraju, A. (2012). Propagation of interplanetary coronal mass ejections: the Drag-Based Model. *Solar Physics*, 285(1-2), 295-315. <https://doi.org/10.1007/s11207-012-0035-4>

- Webb, D. F. (1991). The solar cycle variation of the rates of CMEs and related activity. *Advances in Space Research*, 11(1), 37-40. [https://doi.org/10.1016/0273-1177\(91\)90086-y](https://doi.org/10.1016/0273-1177(91)90086-y)
- Webb, D. F., & Howard, R. A. (1994). The solar cycle variation of coronal mass ejections and the solar wind mass flux. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 99(A3), 4201-4220. <https://doi.org/10.1029/93ja02742>
- Webb, D. F., & Howard, T. A. (2012). Coronal mass ejections: observations. *Living Reviews in Solar Physics*, 9. <https://doi.org/10.12942/lrsp-2012-3>
- Wilson, P. R. (1969). Temperature fluctuations in the solar photosphere. *Solar Physics*, 6(3), 364-380. <https://doi.org/10.1007/bf00146471>
- Wilson, R. M. (1987). Geomagnetic response to magnetic clouds. *Planetary and Space Science*, 35(3), 329-335. [https://doi.org/10.1016/0032-0633\(87\)90159-0](https://doi.org/10.1016/0032-0633(87)90159-0)
- Yashiro, S., Gopalswamy, N., Michalek, G., St Cyr, O. C., Plunkett, S. P., Rich, N. B., & Howard, R. A. (2004). A catalog of white light coronal mass ejections observed by the SOHO spacecraft. *Journal of Geophysical Research Atmospheres*, 109(A7). <https://doi.org/10.1029/2003ja010282>
- Yurchyshyn, V., Abramenko, V., & Tripathi, D. (2009). ROTATION OF WHITE-LIGHT CORONAL MASS EJECTION STRUCTURES AS INFERRED FROM LASCO CORONAGRAPH. *The Astrophysical Journal*, 705(1), 426-435. <https://doi.org/10.1088/0004-637x/705/1/426>
- Zhang, J., & Dere, K. P. (2006). A statistical study of main and residual accelerations of coronal mass ejections. *The Astrophysical Journal*, 649(2), 1100-1109. <https://doi.org/10.1086/506903>
- Zhang, J., Dere, K. P., Howard, R. A., Kundu, M. R., & White, S. M. (2001). On the Temporal Relationship between Coronal Mass Ejections and Flares. *The Astrophysical Journal*, 559(1), 452-462. <https://doi.org/10.1086/322405>

Índice Alfabético

Astronomical Unit, [18](#)

campo magnético interplanetario, [35](#)

ciclo solar, [28](#)

Coronal Hole, [34](#)

Coronal Mass Ejection, [17](#), [28](#), [32](#), [35](#),
[47–49](#), [52–57](#), [59–71](#), [73](#), [74](#)

efecto fotoeléctrico, [22](#)

granulación, [24](#)

Heliosfera, [18](#)

heliosismología, [27](#)

magnetihidrodinámica, [28](#)

reacciones nucleares, [20](#)

rotación de Carrington, [30](#)

rotación diferencial, [27](#)

Solar Flare, [17](#), [28](#), [35](#)

Solar Wind, [34](#)

Sunspots, [17](#), [28](#)

supergranulación, [25](#)