



Simulado Complementar

Cruzando os 2 resumos de Anatomia I

20 questões (10 múltipla escolha, 5 de associar colunas, 5 de Verdadeiro/Falso) montadas comparando o resumo de 9 capítulos (Generalidades até Músculos e Nervos do Tórax, com o Coração em capítulo único) e o resumo de 12 capítulos (que separa e aprofunda Mediastino/Pericárdio, Configuração do Coração, Aparelho Valvular e Sistema de Condução/Vascularização). Onde um material tinha um detalhe que o outro não tinha, ele entrou aqui.

Como usar este simulado

- Responda todas as 20 questões antes de conferir o gabarito (começa numa página separada, no fim do documento).
- Nas questões de Verdadeiro/Falso, além de marcar V ou F, escreva a justificativa nas que você marcar como Falsas.
- Nas questões de associar colunas, escreva ao lado de cada termo a letra da definição correspondente.

Parte 1 — Múltipla Escolha (10 questões)

Marque a alternativa correta.

1. ARTROLOGIA

Qual tipo de articulação sinovial (diartrose) permite apenas movimento de rotação em torno de um único eixo, sendo seu exemplo clássico a articulação atlantoaxial (C1-C2)?

- A) Trocoide (Pivô)
- B) Esferoide (Enartrose)
- C) Gínglimo (Dobradiça)
- D) Selar

2. MIOLOGIA

Qual tipo de contração muscular gera tensão SEM alterar o comprimento do músculo, diferente da contração que gera movimento?

- A) Contração isotônica
- B) Contração isométrica
- C) Contração tetânica
- D) Contração excêntrica pura

3. ESQUELETO TORÁCICO

O Ângulo de Louis (ângulo esternal/de Ludwig), na junção manúbrio-corpo do esterno, é um marco anatômico importante porque:

- A) Marca a articulação da 2ª costela, divide o mediastino em superior/inferior e projeta a bifurcação traqueal (carina)
- B) Marca exclusivamente a inserção do diafragma
- C) Separa apenas os dois pulmões entre si
- D) Marca a articulação da 1ª costela, única com carrilha articular

4. COLUNA VERTEBRAL

O tubérculo carotídeo (de Chassaignac), ponto de referência clínico para compressão manual da artéria carótida em hemostasia de sangramentos cervicais, está localizado em qual vértebra?

- A) C2 (Áxis)
- B) C6
- C) C7 (vértebra proeminente)
- D) T1

5. DIAFRAGMA

Por qual hiato o nervo frênico atravessa o diafragma, e em qual nível vertebral — a clássica pegadinha de prova?

- A) Hiato esofágico, T10
- B) Forame da veia cava inferior, T8
- C) Hiato aórtico, T12
- D) O nervo frênico não atravessa o diafragma

6. CORAÇÃO — CIRCUITO SANGUÍNEO

Depois de atravessar a válvula tricúspide, o sangue no coração direito segue diretamente para qual estrutura?

- A) Tronco pulmonar
- B) Átrio esquerdo
- C) Ventrículo direito
- D) Válvula pulmonar

7. CORAÇÃO — CIRCULAÇÕES

Em relação à oxigenação do sangue, o que diferencia os vasos pulmonares (artérias e veias pulmonares) do padrão geral de vasos do corpo?

- A) As artérias pulmonares levam sangue desoxigenado e as veias pulmonares levam sangue oxigenado — o oposto do padrão geral
- B) As artérias pulmonares levam sangue oxigenado, exatamente como todas as outras artérias do corpo
- C) Não existe nenhuma exceção — toda artéria do corpo, sem exceção, leva sangue oxigenado
- D) As veias pulmonares levam sangue desoxigenado, exatamente como as demais veias do corpo

8. MEDIASTINO E PERICÁRDIO

Qual recesso do pericárdio seroso, situado entre a raiz arterial (aorta/tronco pulmonar) e o átrio esquerdo, tem relevância cirúrgica por permitir o clampeamento simultâneo das 2 grandes artérias?

- A) Recesso Retrocava de Allison
- B) Seio Oblíquo de Haller
- C) Seio Transverso de Theile
- D) Recesso Pré-aórtico

9. CONFIGURAÇÃO DO CORAÇÃO

O Triângulo de Koch — delimitado pelo tendão de Todaro, pelo orifício do seio coronário (válvula de Tebésio) e pela valva septal da tricúspide — é referência cirúrgica de altíssima relevância porque contém qual estrutura?

- A) O Nó Sinoatrial (NSA)
- B) O Nó Atrioventricular (NAV)
- C) O Feixe de His já ramificado nos 2 ramos
- D) A válvula mitral

10. APARELHO VALVULAR

Qual é a diferença estrutural crucial entre as válvulas atrioventriculares (tricúspide e mitral) e as válvulas arteriais/semilunares (pulmonar e aórtica)?

- A) As válvulas arteriais têm 4 valvas cada, enquanto as AV têm só 2
- B) As válvulas arteriais NÃO possuem cordas tendíneas nem músculos papilares, diferente das AV
- C) Só as válvulas arteriais possuem anel fibroso
- D) As válvulas AV não têm comissuras, enquanto as arteriais têm 3 cada

Parte 2 — Associar Colunas (5 questões)

Escreva, ao lado de cada termo da coluna da esquerda, a letra correspondente da definição na coluna da direita.

1. OSTEOLOGIA

Associe cada tipo de osso (classificação por forma) ao seu exemplo.

- | | |
|---------------------------|--|
| Ossos Longos (____) | A) Ossos do carpo (cuboidais) |
| Ossos Curtos (____) | B) Crânio e escápula (delgados, protegem órgãos) |
| Ossos Planos (____) | C) Patela/rótula (dentro de tendões) |
| Ossos Sesamoides (____) | D) Fêmur (diáfise + epífises) |

2. DIAFRAGMA

Associe cada hiato/estrutura do diafragma ao seu nível vertebral ou característica principal.

- | | |
|--|--|
| Forame da Veia Cava Inferior (____) | A) Nível T10 — esôfago + 2 nervos vagos (funciona como esfíncter muscular) |
| Hiato Esofágico (____) | B) Nível T12 — aorta + ducto torácico (musculofibroso) |
| Hiato Aórtico (____) | C) Local mais comum de hérnia diafragmática congênita, geralmente à esquerda |
| Triângulo Lumbocostal (Bochdalek) (____) | D) Nível T8 — VCI + ramo do nervo frênico direito (maior orifício, fibroso) |

3. CORAÇÃO — ESTRUTURAS VASCULARES

Associe cada estrutura vascular relacionada ao coração à sua descrição.

- | | |
|--------------------------------|--|
| Triângulo de Sédillot (____) | A) Principal coletor da drenagem venosa do miocárdio, desemboca no átrio direito |
| Seio Coronário (____) | B) Drena o tórax posterior direito, desemboca em arco na VCS, na altura de T4 |
| Veia Ázigos (____) | C) Drena o lado esquerdo inferior da parede torácica, cruza a linha média (~T9) até a ázigos |
| Veia Hemiázigos (____) | D) Entre as cabeças do ECM e a clavícula — local de escolha pra punção da veia jugular interna |

4. APARELHO VALVULAR

Associe cada válvula cardíaca à sua composição de valvas/cúspides.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Válvula Tricúspide (____) | A) 2 valvas — anterior/maior, posterior/menor |
| Válvula Mitral (Bicúspide) (____) | B) 3 valvas semilunares, sem cordas tendíneas nem papilares |
| Válvula Pulmonar (____) | C) 3 valvas semilunares, próxima aos Seios de Valsalva (origem das coronárias) |
| Válvula Aórtica (____) | D) 3 valvas — anterior (maior), posterior, septal |

5. MEDIASTINO

Associe cada face/limite do mediastino à sua estrutura correspondente.

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Face Anterior (____) | A) Coluna vertebral |
| Face Posterior (____) | B) Orifício torácico superior |
| Face Superior (____) | C) Diafragma |
| Face Inferior (____) | D) Esterno |

Parte 3 — Verdadeiro ou Falso (5 questões)

Marque V ou F. Se marcar Falso, justifique na linha abaixo.

1. CORAÇÃO — ESPESSURA VENTRICULAR

O ventrículo esquerdo tem parede muscular mais espessa que o direito porque é ele quem inicia a circulação pulmonar, de alta pressão.

2. CORAÇÃO — CIRCULAÇÃO FETAL

O forame oval é uma comunicação interatrial fisiológica presente na vida fetal, que se fecha após o nascimento e dá origem à fossa oval.

3. APARELHO VALVULAR

As válvulas semilunares (pulmonar e aórtica) possuem cordas tendíneas e músculos papilares, exatamente como as válvulas atrioventriculares.

4.

DIAFRAGMA

V

F

Em ordem crescente de nível vertebral, os 3 hiatos do diafragma são: hiato esofágico (T8), forame da veia cava inferior (T10) e hiato aórtico (T12).

5.

DIAFRAGMA — HÉRNIAS

V

F

A hérnia diafragmática de Bochdalek, que ocorre no triângulo lombocostal posterolateral, é congênita e mais comum à esquerda, já que o fígado protege relativamente o lado direito.

Gabarito Comentado

Respostas e justificativas — confira só depois de responder tudo

Parte 1 — Múltipla Escolha

1. ARTROLOGIA

Resposta: A) Trocoide (Pivô)

A articulação trocoide (pivô) é uniaxial e permite apenas rotação — o exemplo clássico é a atlantoaxial (C1-C2), que permite o giro da cabeça.

2. MIOLOGIA

Resposta: B) Contração isométrica

A contração isométrica gera tensão sem mudar o comprimento do músculo (ex.: sustentar um peso parado). A isotônica muda o comprimento e gera movimento.

3. ESQUELETO TORÁCICO

Resposta: A) Marca a articulação da 2ª costela, divide o mediastino em superior/inferior e projeta a bifurcação traqueal (carina)

O Ângulo de Louis marca a 2ª costela, divide o mediastino superior do inferior, e projeta a bifurcação traqueal (carina), o início do arco aórtico e a entrada da VCS no coração.

4. COLUNA VERTEBRAL

Resposta: B) C6

O tubérculo carotídeo (Chassaignac) está na vértebra C6 — é o ponto-chave para compressão manual da artéria carótida.

5. DIAFRAGMA

Resposta: B) Forame da veia cava inferior, T8

Pegadinha clássica: o nervo frênico (ramo direito) atravessa o diafragma pelo Forame da VCI (T8) — e NÃO pelo hiato esofágico (T10), como muita gente assume por ele passar 'perto' do esôfago no trajeto cervical/torácico.

6. CORAÇÃO — CIRCUITO SANGUÍNEO

Resposta: C) Ventrículo direito

Sequência: VCS/VCI + seio coronário → AD → válvula tricúspide → VD → válvula pulmonar → tronco pulmonar → artérias pulmonares → pulmões.

7. CORAÇÃO — CIRCULAÇÕES

Resposta: A) As artérias pulmonares levam sangue desoxigenado e as veias pulmonares levam sangue oxigenado — o oposto do padrão geral

Exceção importante: artérias pulmonares levam sangue DESoxigenado (rumo aos pulmões pra trocar gases) e veias pulmonares levam sangue oxigenado (de volta ao AE) — o oposto do padrão geral, em que artéria = sangue oxigenado e veia = sangue pobre em O₂.

8. MEDIASTINO E PERICÁRDIO

Resposta: C) Seio Transverso de Theile

O Seio Transverso de Theile, entre a raiz arterial e o átrio esquerdo, é o mais cobrado — sua utilidade cirúrgica é permitir o clampeamento das 2 grandes artérias (aorta ascendente e tronco pulmonar) de uma vez só.

9. CONFIGURAÇÃO DO CORAÇÃO

Resposta: B) O Nó Atrioventricular (NAV)

O Triângulo de Koch contém o Nó Atrioventricular (NAV) — por isso é referência cirúrgica de altíssima relevância, especialmente em procedimentos de ablação.

10. APARELHO VALVULAR

Resposta: B) As válvulas arteriais NÃO possuem cordas tendíneas nem músculos papilares, diferente das AV

Diferença crucial: as válvulas arteriais (semilunares, pulmonar e aórtica) NÃO possuem cordas tendíneas nem músculos papilares — diferente das válvulas AV (tricúspide e mitral), que têm ambos.

Parte 2 — Associar Colunas

1. OSTEOLOGIA

Ossos Longos → D) Fêmur (diáfise + epífises)

Ossos Curtos → A) Ossos do carpo (cuboidais)

Ossos Planos → B) Crânio e escápula (delgados, protegem órgãos)

Ossos Sesamoides → C) Patela/rótula (dentro de tendões)

2. DIAFRAGMA

Forame da Veia Cava Inferior → D) Nível T8 — VCI + ramo do nervo frênico direito (maior orifício, fibroso)

Hiato Esofágico → A) Nível T10 — esôfago + 2 nervos vagos (funciona como esfíncter muscular)

Hiato Aórtico → B) Nível T12 — aorta + ducto torácico (musculofibroso)

Triângulo Lumbocostal (Bochdalek) → C) Local mais comum de hérnia diafragmática congênita, geralmente à esquerda

3. CORAÇÃO — ESTRUTURAS VASCULARES

Triângulo de Sédillot → D) Entre as cabeças do ECM e a clavícula — local de escolha pra punção da veia jugular interna

Seio Coronário → A) Principal coletor da drenagem venosa do miocárdio, desemboca no átrio direito

Veia Ázigos → B) Drena o tórax posterior direito, desemboca em arco na VCS, na altura de T4

Veia Hemiázigos → C) Drena o lado esquerdo inferior da parede torácica, cruza a linha média (~T9) até a ázigos

4. APARELHO VALVULAR

Válvula Tricúspide → D) 3 valvas — anterior (maior), posterior, septal

Válvula Mitral (Bicúspide) → A) 2 valvas — anterior/maior, posterior/menor

Válvula Pulmonar → B) 3 valvas semilunares, sem cordas tendíneas nem papilares

Válvula Aórtica → C) 3 valvas semilunares, próxima aos Seios de Valsalva (origem das coronárias)

5. MEDIASTINO

Face Anterior → D) Esterno

Face Posterior → A) Coluna vertebral

Face Superior → B) Orifício torácico superior

Face Inferior → C) Diafragma

Parte 3 — Verdadeiro ou Falso

1. CORAÇÃO — ESPESSURA VENTRICULAR

FALSO

Falso. O VE inicia a circulação SISTÊMICA (grande circulação), que é a de ALTA pressão — é ela, não a pulmonar, que exige uma parede muito mais espessa pra bombear sangue a todo o corpo. A circulação pulmonar (iniciada pelo VD) é, na verdade, de baixa pressão.

2. CORAÇÃO — CIRCULAÇÃO FETAL

VERDADEIRO

Verdadeiro. O forame oval permite a passagem de sangue entre os átrios na vida fetal (desviando parcialmente a circulação pulmonar, ainda não funcional); após o nascimento, ele se fecha e se torna a fossa oval.

3. APARELHO VALVULAR

FALSO

Falso. As válvulas arteriais (semilunares) NÃO possuem cordas tendíneas nem músculos papilares — essa é justamente a diferença estrutural crucial em relação às válvulas atrioventriculares (tricúspide e mitral), que têm ambos.

4. DIAFRAGMA

FALSO

Falso. A ordem correta, decorada como '8-10-12', é: Forame da VCI (T8) primeiro, depois Hiato Esofágico (T10), e por último Hiato Aórtico (T12) — a afirmação trocou os dois primeiros hiatos entre si.

5. DIAFRAGMA — HÉRNIAS

VERDADEIRO

Verdadeiro. A hérnia de Bochdalek é congênita, ocorre no triângulo lumbocostal (posterolateral), e é mais comum à esquerda — o fígado, do lado direito, oferece alguma proteção contra esse defeito de fechamento do forame pleuroperitoneal.