

Simulado de Embriologia

30 questões · baseado nos temas e imagens das provas enviadas

 MATERIAL GRATUITO

Nome: _____

Data: ____/____/____

1. Durante a fecundação, qual evento desencadeia o bloqueio à polispermia após a entrada do primeiro espermatozoide no ovócito?
 - A) Formação da linha primitiva.
 - B) Formação do tubo neural.
 - C) Reação cortical com modificações da zona pelúcida.
 - D) Implantação do blastocisto.
 - E) Formação dos somitos.
2. A capacitação do espermatozoide é importante porque:
 - A) prepara o espermatozoide para reconhecer e penetrar as estruturas que envolvem o ovócito.
 - B) ocorre no testículo e inicia a espermatogênese.
 - C) transforma espermátides em espermatócitos.
 - D) produz a zona pelúcida.
 - E) inicia a gastrulação.
3. A transformação das espermátides em espermatozoides maduros recebe o nome de:
 - A) Ovulação.
 - B) Gastrulação.
 - C) Capacitação.
 - D) Espermiogênese.
 - E) Segmentação.
4. Uma característica da ovogênese é que os ovócitos primários:
 - A) são produzidos continuamente em grande quantidade após a puberdade.
 - B) não possuem material genético duplicado.
 - C) completam a meiose II antes da ovulação.
 - D) originam quatro gametas funcionais.
 - E) são formados durante a vida fetal e permanecem em pausa meiótica por longo período.
5. Após a fecundação, as divisões mitóticas sucessivas do conceito, sem aumento proporcional do volume total, são denominadas:
 - A) Gastrulação.
 - B) Segmentação/clivagem.
 - C) Neurulação.
 - D) Organogênese.
 - E) Implantação.
6. A massa celular interna do blastocisto, que dará origem ao embrião propriamente dito, é chamada de:
 - A) Embrioblasto.
 - B) Trofoblasto.
 - C) Sinciotrofoblasto.
 - D) Citotrofoblasto.
 - E) Mesoderma extraembrionário.
7. Durante a implantação, qual componente do trofoblasto apresenta maior capacidade invasiva e participa da formação das lacunas?
 - A) Citotrofoblasto.
 - B) Epiblasto.
 - C) Sinciotrofoblasto.
 - D) Hipoblasto.
 - E) Endoderma definitivo.
8. O período lacunar do desenvolvimento inicial está relacionado principalmente:
 - A) à formação dos somitos.
 - B) à formação das vesículas encefálicas secundárias.
 - C) ao fechamento do neuroporo caudal.
 - D) ao aparecimento de lacunas no sinciotrofoblasto durante a implantação.
 - E) à formação do intestino primitivo.

9. No disco embrionário bilaminar, os dois folhetos são:

- A) Ectoderma e mesoderma.
- B) Epiblasto e hipoblasto.
- C) Mesoderma e endoderma.
- D) Trofoblasto e embrioblasto.
- E) Citotrofoblasto e sinciotrofoblasto.

10. Observe a sequência de desenvolvimento embrionário. Qual alternativa apresenta a sequência temporal correta das quatro imagens?

[Ver imagem da sequência de neurulação anexada na prova original]

- A) 19 → 22 → 20 → 23 dias.
- B) 20 → 19 → 23 → 22 dias.
- C) 22 → 19 → 20 → 23 dias.
- D) 23 → 22 → 20 → 19 dias.
- E) 19 → 20 → 22 → 23 dias.

11. Na imagem da questão anterior, a sequência mostra a progressão da neurulação. O evento mais característico das fases intermediárias é:

[Ver imagem da sequência de neurulação anexada na prova original]

- A) Aproximação e elevação das pregas neurais em torno do sulco neural.
- B) Formação da zona pelúcida.
- C) Formação do blastocisto.
- D) Implantação do embrião.
- E) Formação do disco bilaminar.

12. Na mesma sequência, o aparecimento de estruturas segmentares laterais ao eixo embrionário corresponde principalmente à formação de:

[Ver imagem da sequência de neurulação anexada na prova original]

- A) Vilos coriônicos.
- B) Lacunas trofoblásticas.
- C) Somitos.
- D) Vilosidades intestinais.
- E) Cordões nefrogênicos.

13. A gastrulação é o processo no qual:

- A) o blastocisto se implanta no endométrio.
- B) ocorre a maturação dos gametas.
- C) o tubo neural se fecha completamente.
- D) ocorre a formação da placenta definitiva.
- E) são estabelecidos os três folhetos germinativos.

14. Durante a gastrulação, a migração de células do epiblasto ocorre através da:

- A) Zona pelúcida.
- B) Linha primitiva.
- C) Placa neural.
- D) Membrana bucofaríngea exclusivamente.
- E) Notocorda.

15. Qual estrutura é derivada do mesoderma axial e exerce papel organizador no desenvolvimento do eixo embrionário?

- A) Alantoide.
- B) Placa neural.
- C) Sinciotrofoblasto.
- D) Notocorda.
- E) Saco vitelino.

16. A notocorda é particularmente importante para a neurulação porque:

- A) induz alterações no ectoderma adjacente, contribuindo para a formação da placa neural.
- B) substitui o ectoderma superficial.
- C) forma diretamente o sinciotrofoblasto.
- D) origina o epitélio intestinal.
- E) fecha os neuroporos.

17. A neurulação corresponde ao processo de:

- A) segmentação do zigoto.
- B) formação dos três folhetos germinativos.
- C) implantação do blastocisto.
- D) formação do saco vitelino.
- E) formação do tubo neural a partir da placa neural.

- 18.** O fechamento inadequado do neuroporo rostral está classicamente associado a:
- A) Espinha bífida.
 - B) Gastrosquise.
 - C) Anencefalia.
 - D) Onfalocele.
 - E) Agenesia renal.
- 19.** O fechamento inadequado do neuroporo caudal está relacionado principalmente a:
- A) Anencefalia.
 - B) Espinha bífida e outros defeitos do tubo neural caudal.
 - C) Fenda palatina.
 - D) Holoprosencefalia.
 - E) Onfalocele.
- 20.** Qual associação entre folheto germinativo e derivado está correta?
- A) Ectoderma — epitélio intestinal.
 - B) Mesoderma — epiderme.
 - C) Endoderma — músculo esquelético.
 - D) Ectoderma — sistema nervoso.
 - E) Endoderma — tecido nervoso.
- 21.** O endoderma embrionário participa principalmente da formação do:
- A) Revestimento epitelial de grande parte do trato gastrointestinal e respiratório.
 - B) Sistema nervoso central.
 - C) Esqueleto axial.
 - D) Músculo esquelético.
 - E) Epiderme.
- 22.** O mesoderma paraxial origina estruturas segmentares chamadas:
- A) Vilosidades coriônicas.
 - B) Blastômeros.
 - C) Neuroporos.
 - D) Lacunas.
 - E) Somitos.
- 23.** As três vesículas encefálicas primárias são:
- A) Telencéfalo, diencéfalo e metencéfalo.
 - B) Prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo.
 - C) Mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo.
 - D) Prosencéfalo, telencéfalo e mielencéfalo.
 - E) Rombencéfalo, diencéfalo e telencéfalo.
- 24.** Na nomenclatura das vesículas encefálicas primárias, o prosencéfalo corresponde à vesícula:
- A) Posterior.
 - B) Caudal.
 - C) Anterior.
 - D) Mediana inferior.
 - E) Extraembrionária.
- 25.** O rombencéfalo corresponde à vesícula encefálica primária:
- A) Anterior.
 - B) Lateral.
 - C) Intermediária.
 - D) Posterior.
 - E) Extraembrionária.
- 26.** A alantoide surge como uma evaginação associada ao saco vitelino e está relacionada ao:
- A) desenvolvimento de estruturas vasculares e à conexão com o pedículo do embrião.
 - B) fechamento do tubo neural.
 - C) aparecimento das pregas neurais.
 - D) desenvolvimento da epiderme.
 - E) bloqueio à polispermia.
- 27.** Um aluno afirma que a neurulação ocorre antes da gastrulação. A melhor correção é:
- A) Está correto, pois o tubo neural determina os folhetos.
 - B) Está correto apenas na segunda semana.
 - C) Está correto apenas no período fetal.
 - D) Está incorreto porque neurulação e gastrulação são sinônimos.
 - E) Está incorreto: a gastrulação estabelece os três folhetos e precede a neurulação.

28. Em relação ao tempo aproximado mostrado na figura da prova, a fase de 19 dias é melhor relacionada a:

[Ver imagem da sequência de neurulação anexada na prova original]

- A) Tubo neural totalmente fechado.
- B) Placa neural já estabelecida, com linha/nó primitivos ainda identificáveis.
- C) Formação completa do encéfalo.
- D) Período fetal.
- E) Formação dos órgãos definitivos.

29. Qual sequência representa melhor a progressão morfológica da neurulação?

[Ver imagem da sequência de neurulação anexada na prova original]

- A) Blastocisto → tubo neural → linha primitiva → placenta.
- B) Tubo neural → placa neural → gastrulação → blastocisto.
- C) Placa neural → sulco neural/pregas neurais → aproximação das pregas → tubo neural.
- D) Somitos → blastocisto → placa neural → fecundação.
- E) Notocorda → blastocisto → implantação → gametogênese.

30. Questão integradora: um embrião apresenta alteração importante no fechamento do tubo neural, enquanto a gastrulação e a formação da notocorda ocorreram normalmente. Qual processo foi diretamente comprometido?

- A) Segmentação.
- B) Implantação.
- C) Fecundação.
- D) Neurulação.
- E) Gastrulação.

✓ Gabarito

01	C	02	A	03	D
04	E	05	B	06	A
07	C	08	D	09	B
10	E	11	A	12	C
13	E	14	B	15	D
16	A	17	E	18	C
19	B	20	D	21	A
22	E	23	B	24	C
25	D	26	A	27	E
28	B	29	C	30	D

✦ Esse simulado foi revisado antes da publicação: o gabarito original havia saído com 25 das 30 respostas concentradas na letra B (erro de geração). As alternativas foram reembaralhadas mantendo o mesmo conteúdo e a mesma resposta certa de cada questão — agora com distribuição equilibrada entre A, B, C, D e E.