



I. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: (16P)

1. ¿Cuál de los siguientes estrechamientos fisiológicos del esófago NO corresponde a una relación anatómica externa?

- a) Estrechamiento cricofaríngeo
- b) Estrechamiento por el arco aórtico
- c) Estrechamiento por el bronquio principal izquierdo
- d) Estrechamiento diafragmático

2. Un paciente pierde la sensibilidad de la mucosa laríngea situada por encima de las cuerdas vocales. ¿Qué nervio está lesionado?

- a) Nervio laríngeo recurrente
- b) Rama interna del nervio laríngeo superior
- c) Nervio glossofaríngeo
- d) Nervio hipogloso

3. Una neumonía se encuentra confinada a un único segmento broncopulmonar. ¿Cuál característica anatómica permite esta limitación?

- a) Cada segmento posee irrigación arterial independiente y bronquio segmentario propio
- b) La pleura visceral divide los segmentos
- c) La arteria pulmonar irriga un solo segmento x
- d) Los lóbulos son completamente independientes x

4. Un paciente presenta un carcinoma esofágico localizado en el tercio medio del esófago. El tumor invade una estructura vecina produciendo disfonía (alteración de la voz) ¿Cuál estructura fue comprometida?

- a) Nervio frénico
- b) Nervio laríngeo recurrente izquierdo
- c) Conducto torácico
- d) Vena cava superior

5. ¿Qué nervio inerva al músculo cricotiroides?

- a) Nervio laríngeo recurrente
- b) Nervio laríngeo superior (rama externa)
- c) Nervio vago
- d) Nervio frénico
- e) Nervio laríngeo superior (rama interna)

6. ¿Qué segmento broncopulmonar recibe con más frecuencia cuerpos extraños aspirados?

- a) Lóbulo superior izquierdo
- b) Segmento apical derecho
- c) Segmento basal izquierdo
- d) Segmento superior del lóbulo inferior derecho

7. Dentro de la vaina carotídea se encuentran:

- a) Arteria carótida común, vena yugular interna y nervio vago
- b) Tráquea, esófago y carótida y nervio vago
- c) Tiroides, yugular y tráquea y nervio vago
- d) Nervio frénico, carótida y esófago y nervio vago
- e) Arteria carótida común, vena yugular externa y nervio vago

8. Durante una cirugía de tiroides, el cirujano lesiona accidentalmente un nervio que corre muy próximo a la arteria tiroidea inferior. Después de la operación el paciente presenta voz ronca persistente. ¿Qué nervio fue lesionado?

- a) Nervio laríngeo recurrente
- b) Nervio accesorio
- c) Nervio hipogloso
- d) Nervio frénico

9. Músculos que se insertan en la línea oblicua del tiroides:

- a) Músculo esternotiroideo, músculo tirohioideo, constrictor inferior de la faringe
- b) Músculo esternotiroideo, músculo tirohioideo, constrictor superior de la faringe
- c) Músculo esternotiroideo, músculo tirohioideo, elevador inferior de la faringe
- d) Músculo esternotiroideo, músculo tirohioideo, elevador superior de la faringe

10. Sobre el Glomus Carotideo es correcto afirmar:

- a) Es un quimiorreceptor
- b) Es un baroreceptor
- c) Es una dilatación de la vena carotidea
- d) Es una dilatación del nervio carotideo

11. Sobre el plexo cervical superficial marque lo correcto:

- a) Este encargado de la inervación motora del cuello
- b) Este encargado de la inervación sensitiva del cuello
- c) Este encargado de la inervación vegetativa del cuello
- d) Está formado por las raíces C3 C4 C5

12. Marca la afirmación correcta:

- a) El conducto torácico desemboca en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo de Pirogoff
- b) El conducto torácico desemboca en el ángulo yugulo-subclavio derecho de Pirogoff
- c) La tráquea tiene relación anteriormente con el esófago
- d) El nervio vago se origina en las raíces cervicales C3-C4-C5

13. El asa de Galeno es:

- a) Es una anastomosis entre el nervio laríngeo superior y el laríngeo inferior
- b) Es una anastomosis entre la arteria laríngeo superior y el laríngeo inferior
- c) Es una anastomosis entre el nervio laríngeo superior y el laríngeo externo
- d) Es una anastomosis entre la arteria laríngeo superior y el laríngeo externo

14. La amígdala faríngea se encuentra en:

- a) Cara anterior de la orofaringe
- b) Cara superior de la nasofaringe
- c) Cara anterior de la nasofaringe
- d) Cara lateral de la orofaringe

15. El único de los músculos infrahioideos que NO es inervado por el asa cervical es:

- a) Esternotiroideo
- b) Tirohioideo
- c) Esternocleidohioideo
- d) Omohioideo

16. Sobre el hiato escalénico es correcto decir:

- a) Está formado por el escaleno anterior y medio, por el pasan la vena subclavia y el plexo braquial
- b) Está formado por el escaleno anterior y medio, por el pasan la vena subclavia y el plexo cervical
- c) Está formado por el escaleno anterior y posterior, por el pasan la arteria subclavia y el plexo braquial
- d) Está formado por el escaleno anterior y medio, por el pasan la arteria subclavia y el plexo braquial



14. Cuál es el límite superior e inferior del cuello hacia atrás: 1p

- a) Protuberancia occipital externa/línea acromioclavicular que pasa por la apóf. espinosa de C7
- b) Protuberancia occipital externa/línea acromioclavicular que pasa por la escotadura yugular del esternón.
- c) Protuberancia occipital interna/línea acromioclavicular que pasa por la apóf. espinosa de C7
- d) Protuberancia occipital interna/línea acromioclavicular que pasa por la escotadura yugular del esternón.

15. Cuál es la inervación que recibe el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio: 1p

- a) V par (trigémico)
- b) VII par (facial)
- c) XI par (espinal)
- d) XII par (hipogloso).

II. CITA LO SOLICITADO: 3P

16. Son las ramas terminales de la arteria carótida externa 1p

- a) _____
- b) _____
- c) _____

17. Describa la formación del Asa de Galeno 1p

18. Sobre el conducto torácico, contesto 1p

- a) Donde se forma _____
- b) Donde desemboca: _____

III. MENCIONA LAS RAMAS COLATERALES DEL PLEXO CERVICAL PROFUNDO: 1P

.....

.....

.....

.....

IV. REALIZA UN ESQUEMA SOBRE LA SEGMENTACIÓN PULMONAR LADO IZQUIERDO