45299


EFICO Alpha 790 — PĂSTRĂV

Declaraţie		3 mm	4,5 mm	6 mm	8 mm
Proteină brută	%	43-46	39-42	37-40	37-40
Lipide brute	%	26-29	28-31	29-32	29-32
Carbohidrați (NFE)	%	11,6-17,6	13,3-19,3	13,8-19,8	13,8-19,8
Celuloză brută	%	0,9-2,7	1,2-3,2	1,3-3,3	1,3-3,3
Cenușă	%	5,1-7,1	4,8-6,8	4,4-6,4	4,4-6,4
Fosfor total (P)	%	0,9	0,9	0,9	0,9
Energie brută	MJ/kg	23,4-25,4	23,7-25,7	23,8-25,8	23,8-25,8
Energie digestibilă BioMar *	MJ/kg	20,6	20,8	20,9	20,9
Energie digestibilă clasică **	MJ/kg	21,3	21,5	21,7	21,7
Conținut standard de azot (N)	%	7,2	6,6	6,2	6,2
Număr de peleți per kg (orientativ) ***		48700	14800	6050	2600

* Energie digestibilă BioMar calculată numai pe bază de proteine, lipide și amidon
** Energie digestibilă clasică calculată pe bază de proteine, lipide și carbohidrați NFE
*** Valorile pot varia ± 10% în funcție de lot și în baza datelor disponibile

Indicatori de impact asupra mediului


Datele se bazează pe consumul mediu de materii prime pe 24 de luni.



Citiți mai multe: www.biomar.com/en/global/sustainability/impact-parameters

Valorile ecologice

Informațiile de pe grafic se aplică pentru peleții de 4,5 mm.



Valorile indicate în fișa tehnică pot varia în funcție de fabrica de producție și variațiile naturale ale materiilor prime. Consultați eticheta pentru informații suplimentare, valorile curente și lista de ingrediente. Eticheta se găsește pe produs, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.

Formula furajului se bazează pe Conceptul de Performanță BioMar. Vă invităm să vizitați site-ul nostru pentru mai multe informații despre Conceptul de Performanță. Pentru informații suplimentare cu privire la produs, vă rugăm să consultați site-ul nostru sau să contactați reprezentantul de vânzări.

Ghid de hrănire orientativ (kg de furaj pentru 100 kg de pește, pe zi)

Dimensiunea peștilo	Dimensiunea peletei	Temperatura (° C)								
grame	mm	4 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C
50 - 60	3,0	0,49	0,74	0,98	1,21	1,40	1,52	1,55	1,45	1,18
60 - 80	3,0	0,49	0,73	0,97	1,19	1,38	1,50	1,53	1,43	1,16
80 - 100	3,0	0,48	0,72	0,95	1,17	1,35	1,47	1,50	1,41	1,14
100 - 200	4,5	0,45	0,68	0,91	1,11	1,29	1,40	1,43	1,34	1,08
200 - 300	4,5	0,42	0,64	0,85	1,04	1,20	1,31	1,33	1,25	1,01
300 - 450	4,5	0,40	0,60	0,79	0,97	1,12	1,22	1,24	1,17	0,95
450 - 600	6,0	0,37	0,56	0,75	0,92	1,06	1,15	1,17	1,10	0,89
600 - 800	6,0	0,35	0,52	0,69	0,85	0,98	1,07	1,09	1,02	0,83
800 - 1000	6,0	0,32	0,48	0,64	0,78	0,91	0,99	1,00	0,94	0,76
1000 - 1400	8,0	0,33	0,50	0,66	0,82	0,94	1,02	1,04	0,98	0,79
1400 - 2000	8,0	0,28	0,42	0,56	0,68	0,79	0,86	0,88	0,82	0,67
2000 - 3000	8,0	0,21	0,32	0,42	0,52	0,60	0,66	0,67	0,63	0,51

Hrănirea trebuie adaptată strategiei de producție alese și condițiilor curente de creștere. Datele sunt setate pentru a ajunge la un nivel minim al FCR în condiții optime (oxigen, starea de sănătate, ...) și nu iau în considerare eventualele pierderi de furaj datorate configurației fermei. Pentru a obține o creștere maximă, se poate adminstra o cantitate mai mare de furaj. Contactați reprezentantul local BioMar pentru sfaturi suplimentare.

Se recomandă depozitarea furajului într-un loc uscat și răcoros, protejat de ploaie, lumina directă a soarelui și dăunători.
A se consuma de preferință înainte de: consultați eticheta.

BioMar A/S · Mylius-Erichsensvej 35 · 7330 Brande · Danemarca · Tel: +45 97 18 07 22 · info@biomar.dk · www.biomar.dk