
44659


INICIO Plus G		PĂSTRĂV		
Declaraţie		**0,4 mm**	**0,6 mm**	**1 mm**
Proteină brută	%	60	60	60
Lipide brute	%	10	10	10
Carbohidrați (NFE)	%	12,1	12,1	12,1
Celuloză brută	%	0,3	0,3	0,3
Cenușă	%	11,9	11,9	11,9
Fosfor total (P)	%	1,6	1,6	1,6
Energie brută	MJ/kg	20,3	20,3	20,3
Energie digestibilă BioMar *	MJ/kg	17,7	17,7	17,7
Energie digestibilă clasică **	MJ/kg	18,3	18,3	18,3
Conținut standard de azot (N)	%	9,6	9,6	9,6
Număr de peleți per kg (orientativ) ***		---	---	---

* Energie digestibilă BioMar calculată numai pe bază de proteine, lipide și amidon
** Energie digestibilă clasică calculată pe bază de proteine, lipide și carbohidrați NFE
*** Valorile pot varia ± 10% în funcție de lot și în baza datelor disponibile

Distribuția energiei digestibile și valorile ecologice

Informațiile cu privire la distribuția energiei digestibile și valorile ecologice se aplică pentru peleții de 0,6 mm.





Valorile indicate în fișa tehnică pot varia în funcție de fabrica de producție și variațiile naturale ale materiilor prime. Consultați eticheta pentru informații suplimentare, valorile curente și lista de ingrediente. Eticheta se găsește pe produs, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului. Produsul conține probiotice.

Pentru informații suplimentare cu privire la produs, vă rugăm să consultați site-ul nostru sau să contactați reprezentantul de vânzări.

Ghid de hrănire orientativ (kg de furaj pentru 100 kg de pește, pe zi)

Dimensiunea peștilor grame	Dimensiunea peletei mm	Temperatura (° C) 4 °C	6 °C	8 °C	10 °C	12 °C	14 °C	16 °C	18 °C	20 °C
0,1 - 0,2	0,4	1,22	1,84	2,44	2,99	3,46	3,77	3,84	3,60	2,92
0,2 - 0,4	0,6	1,14	1,72	2,28	2,80	3,24	3,52	3,59	3,37	2,73
0,4 - 1,5	1,0	1,01	1,52	2,02	2,48	2,87	3,12	3,18	2,98	2,42

Masa de furajare este indicativă și, în special pentru primele zile de hrănire, se recomandă să monitorizați îndeaproape comportamentul de înot și hrănire a puietului, pentru a evita supra furajarea și, prin urmare, pentru a reduce risipa de hrană. După prima perioadă de hrănire, nivelul de hrănire poate fi crescut treptat. Nivelurile de hrănire obținute depind de condițiile din fermă. Contactați reprezentantul local BioMar pentru sfaturi suplimentare.

Se recomandă depozitarea furajului într-un loc uscat și răcoros, protejat de ploaie, lumina directă a soarelui și dăunători.
A se consuma de preferință înainte de: consultați eticheta.

BioMar A/S · Mylius-Erichsensvej 35 · 7330 Brande · Danemarca · Tel: +45 97 18 07 22 · info@biomar.dk · www.biomar.dk