

Weak lensing measurements of the masses of ultra diffuse galaxies in nearby galaxy clusters

Cristóbal Sifón^{1,2}, Remco F. J. van der Burg³, Adam Muzzin⁴, Henk Hoekstra² and Ricardo Herbonnet²

¹Department of Astrophysical Sciences, Peyton Hall, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA

²Leiden Observatory, Leiden University, PO Box 9513, NL-2300 RA Leiden, The Netherlands

³Laboratoire AIM, IRFU/Service d'Astrophysique - CEA/DSM - CNRS - Université Paris Diderot, Bât. 709, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France

⁴York University

May 30, 2016

Abstract

The recent discovery of thousands of ultra diffuse galaxies (UDGs) in nearby galaxy clusters Koda et al. (2015); van Dokkum et al. (2015); van der Burg et al. (2016) has opened a new window into the process of galaxy formation and evolution.

More text and a couple cool figures

8205/807/1/L2

ApJL,

<http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ApJ...807L...2K807, L2>

van Dokkum P. G., Abraham R., Merritt A., Zhang J., Geha M., Conroy C., 2015, <http://dx.doi.org/10.1088/2041-8205/798/2/L45> ApJL, <http://adsabs.harvard.edu/abs/2015ApJ...798L..45V798, L45>

References

Koda J., Yagi M., Yamanoi H., Komiyama Y., 2015, <http://dx.doi.org/10.1088/2041->

van der Burg R. F. J., Muzzin A., Hoekstra H., 2016, <http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/201628222> A&A, <http://adsabs.harvard.edu/abs/2016A>