

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ**  
**“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”**  
**ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ**  
**КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ**

«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

\_\_\_\_\_  
(підпис)  
**М. В. Грайворонський**

“ \_\_\_\_\_ ” (ініціали, прізвище) 2017 р.

**Дипломна робота**

освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

за спеціальністю 8.04030101 «Прикладна математика»

на тему «Тема»

Виконав студент 6 курсу групи ФІ-51м

Кригін Валерій Михайлович

Керівник к.т.н., Барановський Олексій Миколайович

Рецензент ,

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Засвідчую, що у цій дипломній роботі  
немає запозичень з праць інших авторів  
без відповідних посилань.

Студент \_\_\_\_\_

## **РЕФЕРАТ**

### **КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА**

## **ABSTRACT**

## **KEYWORDS**

## **РЕФЕРАТ**

**СЛОВА**

## ЗМІСТ

Вступ . . . . .	6
1 Теоретичні відомості . . . . .	7
1.1 Задача . . . . .	7
1.1.1 Bin . . . . .	7
1.1.2 Parameters difference . . . . .	7
1.1.3 Models difference . . . . .	8
1.1.4 Gaussian parameters difference . . . . .	8
1.2 Розв'язок . . . . .	9
1.2.1 Bin . . . . .	9
1.2.2 Gaussian parameters difference . . . . .	10
2 Практичні результати . . . . .	11
3 Охорона праці . . . . .	12
Висновки . . . . .	13

## ВСТУП

**Актуальність роботи.**

*Об'єкт дослідження —*

*Предмет дослідження —*

**Мета дослідження.**

Завдання наступні:

- 1) Вивчити;
- 2) Розробити.

**Практичне значення одержаних результатів.**

# 1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

## 1.1 Задача

$$R(q) = \sum_{t \in T} \sum_{x \in X} \mathbb{P}(x, q(t)) \cdot W(x, q(t))$$

$$q^* = \arg \min_q R$$

$$\mathbb{P}(x \mid t) = \prod_{i \in I} \frac{\exp \left\{ -\frac{(t_i - f_i(x))^2}{2 \cdot \sigma^2} \right\}}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot \sigma^2}}$$

### 1.1.1 Bin

$$W(x, x') = \mathbb{1}(x = x')$$

$$q^*(t) = \arg \max_x \mathbb{P}(x \mid t)$$

### 1.1.2 Parameters difference

$$W(x, x') = \|x - x'\| = \sum_{p \in P} (x_p - x'_p)^2$$

$$q^*(t) = \sum_{x \in X} x \cdot \mathbb{P}(x \mid t)$$

### 1.1.3 Models difference

$$M_v(k) = \sum_{p \in P} \alpha_p^v \cdot k_p, \quad v \in V$$

$$\begin{aligned} W(x, x') &= \|M(x) - M(x')\| = \sum_{v \in V} [M_v(x) - M_v(x')]^2 = \\ &= \sum_{v \in V} \sum_{p \in P} [\alpha_p^v \cdot (x_p - x'_p)]^2 = \sum_{p \in P} \left\{ (x_p - x'_p)^2 \cdot \sum_{v \in V} (\alpha_p^v)^2 \right\} = \\ &= \left| \beta_p^2 = \sum_{v \in V} (\alpha_p^v)^2 \right| = \sum_{p \in P} \beta_p^2 \cdot (x_p - x'_p)^2 \end{aligned}$$

$$q^*(t) = M^{-1} \left( \sum_{x \in X} M(x) \cdot \mathbb{P}(x | t) \right)$$

### 1.1.4 Gaussian parameters difference

$$\mathbb{P}(x | t) = \prod_{i \in I} \frac{\exp \left\{ -\frac{(t_i - f_i(x))^2}{2 \cdot \sigma^2} \right\}}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot \sigma^2}} \cdot \prod_{p \in P} \frac{\exp \left( -\frac{x_p^2}{2} \right)}{\sqrt{2 \cdot \pi}}$$

$$c = (2 \cdot \pi)^{\frac{|I|+|P|}{2}} \cdot \sigma^{|I|}$$

$$\mathbb{P}(x | t) = c \cdot \exp \left\{ -\frac{\|t - f(x)\|^2}{2 \cdot \sigma^2} \right\} \cdot \exp \left\{ -\frac{\|x\|^2}{2} \right\}$$

$$W(x, x') = \|x - x'\|^2 = \sum_{p \in P} (x_p - x'_p)^2$$



$$c(t) = c \cdot \exp \left\{ -\frac{\|t\|}{2 \cdot \sigma^2} \right\}$$

$$q^*(t) = c(t) \cdot \sum_{x \in X} x \cdot e^{-\|x\|} \cdot \exp \frac{\langle f(x), t - \frac{f(x)}{2} \rangle}{\sigma^2}$$

## 1.2 Розв'язок

### 1.2.1 Bin

$$\ln \mathbb{P}(x \mid t) = \sum_{i \in I} \left\{ -\frac{(t_i - f_i(x))^2}{2 \cdot \sigma^2} - \frac{\ln 2 + \ln \pi + 2 \cdot \ln \sigma}{2} \right\} \rightarrow \max$$

$$\sum_{i \in I} (t_i - f_i(x))^2 \rightarrow \min$$

$$\sum_{i \in I} (t_i - f_i(x))^2 = \sum_{i \in F} (t_i - f_i(x))^2 + \sum_{i \in I \setminus F} (t_i - f_i(x))^2$$

$$\overline{\sigma_F^2} = \frac{\sum_{i \in F} (t_i - f_i(x))^2}{|F| - 1} \Rightarrow \overline{\sigma_F^2} \sim \frac{\sum_{i \in I} (t_i - f_i(x))^2}{|I| - 1}$$

$$\sum_{i \in I} (t_i - f_i(x))^2 \sim (|I| - 1) \cdot \overline{\sigma_F^2} \rightarrow \min$$

$$\overline{\sigma_F^2} = \frac{\sum_{i \in F} (t_i - f_i(x))^2}{|F| - 1} \rightarrow \min$$

### 1.2.2 Gaussian parameters difference

$$q'(t) = \sum_{x \in X} x \cdot e^{-\|x\|} \cdot \exp \frac{\langle f(x), t - \frac{f(x)}{2} \rangle}{\sigma^2}$$

$$N = |X| \cdot |I| - 1$$

$$\overline{\sigma^2} = \sum_{x \in X} \frac{\|f(x) - t\|}{N}$$

$$\exp \frac{\langle f(x), t - \frac{f(x)}{2} \rangle}{\sigma^2} = \exp \frac{-N \cdot (\|f(x) - t\| + \|t\|)}{2 \cdot \sum_{x' \in X} \|f(x') - t\|}$$

$$q''(t) = \sum_{x \in X} x \cdot \exp \left\{ -\frac{\|f(x') - t\|}{2 \cdot \overline{\sigma^2}} - \|x\| \right\}$$

## **2 ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ**

### **3 ОХОРОНА ПРАЦІ**

## **ВИСНОВКИ**

В результаті виконання роботи вдалося.